

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Was hat diese Fischart für eine Beschuppung?



Antwort:

- ✓ a) Rundschuppen
- b) keine Schuppen
- c) Kammschuppen

Frage:

Diese Fischart zeichnet sich durch eine Besonderheit aus. Welche ist das?




Antwort:

- a) ein anadromer Wanderfisch
- ✓ b) ein katadromer Wanderfisch
- c) ein Standfisch

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Wie nennt sich eine Zuchtform dieses Fisches?



Antwort:

- a) Goldfisch
- ✓ b) Goldorfe
- c) Goldschleie

Frage:

Welches Mindestmaß hat dieser karpfenartige Fisch laut SächsFischVO?



Antwort:

- a) 30cm
- ✓ b) 20cm
- c) 15cm

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Das Weibchen ist in der Laichzeit mit einer Legeröhre ausgestattet.
Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?



Antwort:

- a) Elritze
- b) Schneider
- ✓ c) Bitterling

Frage:

Zu welcher Familie gehört dieser Fisch?




Antwort:

- ✓ a) Cypriniden
- b) Coregonen
- c) Salmoniden

Frage:

Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?



Antwort:

- a) Schuppenkarpfen
- b) Karausche
- ✓ c) Giebel

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Um welche Fischart handelt es sich bei dem abgebildeten Fisch?



Antwort:

- a) Barbe
- b) Bachschmerle
- ✓ c) Gründling

Frage:

Eine Fischart besitzt die Fähigkeit zur Darmatmung. Wie heißt dieser abgebildete Fisch?




Antwort:

- a) Steinbeißer
- ✓ b) Schlammpeitzger
- c) Gründling

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Ein karpfenartiger Fisch hat laut aktueller SächsFischVO nur in Fließgewässern ein Mindestmaß.
Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?



Antwort:

- a) Plötze
- ✓ b) Rotfeder
- c) Güster

Frage:

Welches Mindestmaß hat dieser abgebildete Fisch laut aktueller SächsFischVO?




Antwort:

- a) kein Mindestmaß
- ✓ b) 20 cm, nur beim Fang in Fließgewässern
- c) 25 cm, nur beim Fang in Fließgewässern

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Wie heißt der abgebildete Fisch der laut aktueller SächsFischVO ganzjährig geschont ist?




Antwort:

- a) Blei
- b) Zährte
- ✓ c) Zope

Frage:

Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?

Sie verfügt über ein sehr großes Maul und eine konkave Afterflosse. Die Art lebt frühzeitig räuberisch.




Antwort:

- ✓ a) Rapfen
- b) Hasel
- c) Zander

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?
Sie ist auch Leitfisch einer Fließgewässerregion.



Antwort:

- a) Äsche
- ✓ b) Barbe
- c) Blei

Frage:

Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?
Sie ist leicht mit anderen Fischarten zu verwechseln.




Antwort.

- ✓ a) Rotaugen
- b) Aland
- c) Rotfeder

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?
Bei Berührung fallen die Schuppen leicht ab.



Antwort:

- a) Moderlieschen
- b) Elritze
- ✓ c) Ukelei

Frage:

Welcher heimische Krebs ist hier abgebildet?



Antwort:

- ✓ a) Edelkrebs
- b) Signalkrebs
- c) Kamberkrebs

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Alle in den Antworten genannten Fische besitzen 6 Barteln.
Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?



Antwort:

- a) Steinbeißer
- b) Bachschmerle
- ✓ c) Europäischer Wels

Frage:

Alle in den Antworten genannten Fische besitzen 6 Barteln.
Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?



Antwort:

- a) Europäischer Wels
- ✓ b) Bachschmerle
- c) Steinbeißer

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?

Sie gehört zur Familie der Lachsartigen. Die Knochenplatten am Kiemendeckel berühren sich in einem Punkt.



Antwort:

- a) Atlantischer Lachs
- ✓ b) Bachforelle
- c) Äsche

Frage:

Welche Fischart wird hier abgebildet?




Antwort:

- ✓ a) Bachneunauge
- b) Europäischer Aal
- c) Schlammpeitzger

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Ein kleiner karpfenartiger Fisch hat ein oberständiges Maul und eine unvollständige Seitenlinie.
Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?



Antwort:

- a) Elritze
- b) Ukelei
- ✓ c) Moderlieschen

Frage:

Der Rogen dieses Fisches ist in der Laichzeit ungenießbar!
Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?



Antwort:

- a) Döbel
- ✓ b) Barbe
- c) Quappe

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?

Der abgebildete Fisch hat einen dunklen Fleck am Ende der ersten Rückenflosse.



Antwort:

- ✓ a) Flussbarsch
- b) Zander
- c) Kaulbarsch

Frage:

Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?

Es existieren zwei Rückenflossen, die mit einander verbunden sind.




Antwort:

- a) Forellenbarsch
- b) Flussbarsch
- ✓ c) Kaulbarsch

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?



Antwort:

- a) Europäischer Wels
- ✓ b) Zwergwels
- c) Schlammpeitzger

Frage:

Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?
Beachte die Fettflosse.



Antwort:


- a) Große Maräne
- ✓ b) Äsche
- c) Bachsaibling

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?

Die Afterflosse ist leicht konvex. Im Alter lebt der Fisch räuberisch.



Antwort:

- a) Nase
- b) Aland
- ✓ c) Döbel

Frage:

Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?

Sie laicht im Winter („Winterlaicher“).



Antwort:

- a) Wels
- ✓ b) Quappe
- c) Schlammpeitzger

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?

Ihre Rückenflosse ist konvex. Das Schuppenkleid scheint messing- bis bronzefarben.



Antwort:

- a) Giebel
- b) Schuppenkarpfen
- ✓ c) Karausche

Frage:

Die Bauchflossen sind beim Männchen größer und weisen eine charakteristische Löffelform auf.

Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?




Antwort:

- ✓ a) Schleie
- b) Plötze
- c) Rotfeder

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Der hier abgebildete Fisch ist laut aktueller SächsFischVO ganzjährig geschont.
Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?



Antwort:

- a) dreistachliger Stichling
- b) Groppe
- ✓ c) Neunstachliger Stichling

Frage:

Alle drei in der Antwort genannten Fischarten besitzen am Kiemendeckel einen spitz auslaufenden Dorn.
Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?



Antwort:


- a) Flussbarsch
- ✓ b) Groppe
- c) Kaulbarsch

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?

Die Männchen haben eine rote Laichfärbung und betreiben echte Brutpflege.




Antwort:

- a) Bachsaibling
- b) Goldfisch
- ✓ c) Dreistachliger Stichling

Frage:

Welche Besonderheit zeigt sich bei der hier abgebildeten Fischart?




Antwort:

- a) Kammschuppen
- ✓ b) keine Schuppen, dafür Knochenplatten
- c) Rundschuppen

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Welcher Raubfisch wird hier abgebildet?




Antwort:

- a) Rapfen
- b) Barsch
- ✓ c) Zander

Frage:

Das Männchen betreibt Brutpflege. Es bewacht das Laichnest.
Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?



Antwort:

- a) Neunstachliger Stichling
- ✓ b) Zander
- c) Groppe

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Der hier abgebildete Fisch besitzt zwei voneinander getrennte Rückenflossen.
Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?



Antwort:

- a) Flussbarsch
- b) Zander
- ✓ c) Quappe

Frage:

Der hier abgebildete Fisch hat Augen, deren Pupillen nach vorne zugespitzt sind.
Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?




Antwort:

- a) Maräne
- ✓ b) Äsche
- c) Lachsforelle

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Wie nennt man die hier abgebildete Fischart, die in Sachsen als Neozoon (neue Fischart) in der Elbe vorkommt?



Antwort:

- a) Groppe
- ✓ b) Schwarzmundgrundel
- c) Zackenbarsch

Frage:

Wie heißt die hier abgebildete Muschel, die in Symbiose mit der Bachforelle lebt?



Antwort:

- a) Chinesische Teichmuschel
- b) Gemeine Teichmuschel
- ✓ c) Flussperlmuschel

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Die hier abgebildete Teichmuschel lebt in Symbiose mit einer Fischart.




Welche Fischart ist das?

Antwort:

- a) Schneider
- ✓ b) Bitterling
- c) Ukelei

Frage:

Den hier abgebildeten Fisch nennt man Nordseeschnäpel oder Große Maräne.
Zur welcher Familie gehört dieser?



Antwort:

- a) Salmoniden
- ✓ b) Coregonen
- c) Cypriniden

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Der hier abgebildete Fisch hat eine weit nach hinten versetzte Rückenflosse.
Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?



Antwort:

- a) Hecht
- ✓ b) Atlantischer Stör
- c) Schlammpeitzger

Frage:

Wie nennt man die hier abgebildete Fischart, bei der sich sechs kurze Barteln an der Oberlippe befinden?



Antwort:

- ✓ a) Steinbeißer
- b) Gründling
- c) Schlammpeitzger

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Wie nennt man die hier abgebildete Kleinfischart, deren nach unten gebogene Seitenlinie beidseitig von einer Punktreihe gesäumt wird?



Antwort:

- ✓ a) Schneider
- b) Moderlieschen
- c) Bitterling

Frage:

Wie nennt man die hier abgebildete aus Nordamerika stammende Fischart?




Antwort:

- a) Atlantischer Lachs
- ✓ b) Regenbogenforelle
- c) Äsche

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?



Antwort:

- ✓ a) Bachsaibling
- b) Bachforelle
- c) Seeforelle

Frage:

Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?

Es handelt sich um einen Schwarmfisch, der auch ein Indikator für gute Gewässerqualität ist.



Antwort:

- a) Moderlieschen
- ✓ b) Elritze
- c) Ukelei

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?



Antwort:

- a) Wels
- ✓ b) Hecht
- c) Rapfen

Frage:

Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?
Sie bevorzugt schnell fließenden Gewässerabschnitte.




Antwort:

- a) Blei
- b) Güster
- ✓ c) Hasel

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?
Sie ist Leitfisch einer Fließgewässerregion.



Antwort:

- ✓ a) Blei
- b) Güster
- c) Zope

Frage:

Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?
Ihr Augendurchmesser ist im Verhältnis zur Maulspalte größer oder gleich groß.



Antwort:

- a) Blei
- ✓ b) Güster
- c) Döbel

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?

Sie besitzt ein stark unterständiges dunkles Maul und ist ganzjährig laut SächsFischVO geschont.



Antwort:

- a) Hasel
- b) Nase
- ✓ c) Zährte

Frage:

Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?

Die Unterlippe ist hornig, scharfkantig und die Oberlippe wulstig?



Antwort:

- ✓ a) Nase
- b) Zährte
- c) Aland

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Wie nennt man den hier abgebildeten anadromen Wanderfisch?




Antwort:

- a) Regenbogenforelle
- ✓ b) Atlantischer Lachs
- c) Seeforelle

Frage:

Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?
Artcharakteristisch ist, dass sich die Nähte der Knochenplatten auf dem Kiemendeckel in einem Punkt verbinden.



Antwort:

- a) Atlantischer Lachs
- b) Äsche
- ✓ c) Seeforelle

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Welches Mindestmaß gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?



Antwort:

- a) 45 cm
- ✓ b) 50 cm
- c) 60 cm

Frage:

Welches Mindestmaß gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?



Antwort:

- a) 28 cm
- b) 30 cm
- ✓ c) 35 cm

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Welche Schonzeit gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?



Antwort:

- a) 1. Januar bis 30. April
- b) 1. Januar bis 31. Mai
- ✓ c) 1. Januar bis 15. Juni

Frage:

Welches Mindestmaß gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?



Antwort:

- a) 25 cm
- ✓ b) 28 cm
- c) 30 cm

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Welche Schonzeit gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?



Antwort:

- ✓ a) 1. Oktober bis 30. April
- b) 1. Oktober bis 31. Dezember
- c) 1. Oktober bis 31. Mai

Frage:

Welche Schonzeit gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?




Antwort:

- a) 1. Oktober bis 31. Mai
- ✓ b) ganzjährig
- c) es gibt keine Schonzeit

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Welches Mindestmaß gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?




Antwort:

- a) 25 cm
- ✓ b) 28 cm
- c) 35 cm

Frage:

Welche Schonzeit gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?




Antwort:

- a) 1. Oktober bis 31. Dezember
- ✓ b) 1. Oktober bis 30. April
- c) 1. Oktober bis 31. Mai

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Welches Mindestmaß gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?



Antwort:

- a) 30 cm
- b) 40 cm
- ✓ c) 50 cm

Frage:

Welche Schonzeit gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?



Antwort:

- a) 1. Januar bis 15. Juni
- b) 1. Februar bis 30. Juni
- ✓ c) 15. April bis 30. Juni

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Welche Schonzeit gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?
Der weibliche Fisch ist in der Laichzeit mit einer Legeröhre ausgestattet.




Antwort:

- ✓ a) ganzjährig geschont
- b) 1. Februar bis 30. Juni
- c) 15. April bis 30. Juni

Frage:

Welche Schonzeit gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?



Antwort:

- a) keine Schonzeit
- ✓ b) ganzjährig geschont
- c) Schonzeit nur während der Laichzeit (April bis Juni)

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Welche Schonzeit gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?



Antwort:

- ✓ a) ganzjährig geschont
- b) keine Schonzeit
- c) 1. Februar bis 30. Juni

Frage:

Welche Schonzeit gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?
Sie ist ein Indikator für gute Wasserqualität und betreibt echte Brutpflege.



Antwort:

- a) keine Schonzeit
- b) 1. Oktober bis 30. April
- ✓ c) ganzjährig geschont

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Welches Mindestmaß gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?



Antwort:

- ✓ a) 50 cm und geschont vom 1. Februar bis 30. April
- b) 45 cm und geschont vom 1. Februar bis 31. Mai
- c) 55 cm und geschont vom 1. Februar bis 30. Juni

Frage:

Welches Mindestmaß gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?




Antwort:

- a) kein Mindestmaß
- ✓ b) 15 cm
- c) 20 cm

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Welche Schonzeit gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?



Antwort:

- a) 1. Februar bis 30. April
- ✓ b) 1. Februar bis 30. Juni
- c) 15. April bis 30. Juni

Frage:

Welches Mindestmaß gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?




Antwort:

- a) 15 cm
- b) 35 cm
- ✓ c) 40 cm

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Welches Mindestmaß gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?
Die Innenhaut der Bauchhöhle (Peritoneum) ist schwärzlich gefärbt.



Antwort:

- ✓ a) kein Mindestmaß
- b) 15 cm
- c) 40 cm

Frage:

Welches Mindestmaß gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?



Antwort:

- a) 40 cm
- b) 50 cm
- ✓ c) 60 cm

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Welche Schonzeit gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?



Antwort:

- a) ganzjährig geschont
- ✓ b) 1. Oktober bis 30. April
- c) 1. Oktober bis 31. Mai

Frage:

Diese abgebildete Fischart darf mit einer Hegene beangelt werden.

Welche Schonzeit hat die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?




Antwort:

- ✓ a) 1. Oktober bis 31. Dezember
- b) 1. Oktober bis 30. April
- c) 1. Februar bis 30. Juni

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Welches Mindestmaß ist für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO vorgesehen?



Antwort:

- a) 28 cm
- ✓ b) 30 cm
- c) 35 cm

Frage:

Der hier abgebildete Fisch ist laut § 2 (1) Nr. 21 SächsFischVO in allen Gewässern außer der Elbe ganzjährig geschont. Welches Mindestmaß gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO in der Elbe?



Antwort:


- a) 30 cm
- b) 35 cm
- ✓ c) 40 cm

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

✓

Frage:

Der hier abgebildete Fisch hat laut § 2 (1) Nr. 21 SächsFischVO in der Elbe ein Mindestmaß von 40 cm. Welche Schonzeit ist zu beachten?



Antwort:

- a) 1. Januar bis 31. März
- ✓ b) 1. Januar bis 15. Juni
- c) 1. Februar bis 30. Juni

Frage:

Der hier abgebildete Fisch hat laut § 2 (1) Nr. 25 SächsFischVO in der Elbe, der Vereinigten Mulde und der Weißen Elster ein Mindestmaß von 30 cm. Welche Schonzeit ist zu beachten?



Antwort:

- ✓ a) 1. Januar bis 31. März
- b) 1. Januar bis 31. Mai
- c) 1. Januar bis 15. Juni

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Der hier abgebildete Fisch ist laut § 2 (1) Nr. 25 SächsFischVO mit Ausnahme dreier Flüsse ganzjährig geschont. Welches Mindestmaß gilt für die Elbe, die Vereinigten Mulde und die Weißen Elster?



Antwort:

- ✓ a) 30 cm
- b) 35 cm
- c) 40 cm

Frage:

Welches Mindestmaß hat der hier abgebildete karpfenartige Fisch, der im Alter vorwiegend räuberisch lebt, laut SächsFischVO?




Antwort:

- a) 35 cm
- ✓ b) 40 cm
- c) 50 cm

Frage:

Welches Mindestmaß hat der hier abgebildete Fisch laut SächsFischVO?



Antwort:

- ✓ a) 25 cm
- b) 28 cm
- c) 30 cm

Frage:

Welche Schonzeit hat der hier abgebildete Fisch laut SächsFischVO?



Antwort:

- a) keine Schonzeit
- ✓ b) 1. Oktober bis 30. April
- c) 1. Oktober bis 31. Mai

Frage:

Welche Schonzeit hat der hier abgebildete Fisch laut SächsFischVO?



Antwort:

- a) keine Schonzeit
- ✓ b) ganzjährig geschont
- c) 1. Januar bis 15.Juni

Frage:

Welches Mindestmaß hat der hier abgebildete Fisch laut SächsFischVO?



Antwort:

- a) 20 cm
- ✓ b) 25 cm
- c) 28 cm

Frage:

Der hier abgebildete Fisch hat 6 Barteln an der Oberlippe und die Färbung ist marmoriert. Was hat dieser Fisch für eine Schonzeit laut SächsFischVO?




Antwort:

- ✓ a) ganzjährig geschont
- b) keine Schonzeit
- c) 15. April bis 30. Juni

Frage:

Der hier abgebildete Fisch hat 6 kurze Barteln an der Oberlippe. Was hat dieser Fisch für eine Schonzeit laut SächsFischVO?




Antwort:

- a) keine Schonzeit
- ✓ b) ganzjährig geschont
- c) 1. Februar bis 30. Juni

Frage:

Welche Schonzeit hat der hier abgebildete Fisch laut SächsFischVO?



Antwort:

- a) 15. April bis 30. Juni
- b) keine Schonzeit
- ✓ c) ganzjährig geschont

Frage:

Welche Schonzeit hat der hier abgebildete Fisch laut SächsFischVO?
Auffällig ist die hier weit nach hinten versetzte Rückenflosse.



Antwort:

- a) 1. Februar bis 30. April
- b) 1. Februar bis 31. Mai
- ✓ c) ganzjährig geschont

Frage:

Welches Mindestmaß hat der hier abgebildete Fisch? Es ist der größte bei uns lebender Raubfisch.



Antwort:

- a) 60 cm
- b) 80 cm
- ✓ c) nicht im § 2 (1) SächsFischVO genannt, somit kein Mindestmaß

Frage:

Welche Schonzeit hat der hier abgebildete Fisch laut SächsFischVO? Der Schnauzenbug ist nasenartig vorstehend, kegelförmig, verdickt und dunkel.




Antwort:

- ✓ a) ganzjährig geschont
- b) keine Schonzeit
- c) 1. Oktober bis 31. Dezember

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Welches Mindestmaß hat der hier abgebildete Fisch laut SächsFischVO?




Antwort:

- a) 45 cm
- ✓ b) 50 cm
- c) 60 cm

Frage:

Welche Schonzeit hat der hier abgebildete Fisch laut SächsFischVO?




Antwort:

- a) 1. Januar bis 15. Juni
- b) 1. Februar bis 30. April
- ✓ c) 1. Februar bis 31. Mai

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Frage:

Welche Schonzeit hat der hier abgebildete Fisch laut SächsFischVO?
Er hat eine sehr lange Afterflosse.



Antwort:

- ✓ a) ganzjährig geschont
- b) keine Schonzeit nur ein Mindestmaß von 25 cm
- c) 1. Oktober bis 30. April

Frage:

Welche Schonzeit hat der hier abgebildete Krebs (Astacus astacus) laut SächsFischVO?



Antwort:

- a) keine Schonzeit
- ✓ b) ganzjährig geschont
- c) nur während der Häutung geschont

Welche Fischart wird hier abgebildet?



- ✓ a) Äsche
- b) Große Maräne
- c) Bachsaibling

Bei der abgebildeten Fischart handelt es sich um *Coregonus albula* (L.).

Nenne Sie die korrekte deutsche Bezeichnung.



- ✓ a) Kleine Maräne
- b) Große Maräne
- c) Stint

Um welchen ursprünglich in Europa nicht heimischen Salmoniden handelt es sich hier?



- a) Tigerforelle
- ✓ b) Regenbogenforelle
- c) Bachsaibling

Welcher anadrome Wanderfisch wird hier abgebildet?



- a) Meerforelle
- ✓ b) Atlantischer Lachs
- c) Seeforelle

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Meerforelle, Bachforelle und Seeforelle gehören einer Art an.
Welche Form ist hier zu sehen?




- a) Meerforelle
- ✓ b) Bachforelle
- c) Seeforelle

Welche Fischart ist hier zu sehen?



- a) Seesaibling
- b) Bachforelle
- ✓ c) Bachsaibling

Die hier abgebildete Fischart kommt als stationäre aber auch als wandernde Form mit unterschiedlicher Namensgebung vor. Um welche handelt es sich?



- a) Döbel, Dickkopf
- ✓ b) Nordseeschnäpel, Große Maräne
- c) Zährte, Rußnase

Diese Salmonidenart hat vom 1. Oktober bis 30. April Schonzeit. Welche Fischart mit zugehörigem Mindestmaß ist in der Abbildung dargestellt?



- a) Bachforelle, Mindestmaß 28 cm
- b) Regenbogenforelle, Mindestmaß 25 cm
- ✓ c) Meerforelle, Mindestmaß 60 cm

Die dargestellte Fischart hat in Sachsen kein natürliches Vorkommen.
Um welche Fischart handelt es sich?



- a) Bachsaibling
- ✓ b) Seesaibling
- c) Regenbogenforelle

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Ein oberständiges Maul besitzen Moderlieschen, Ukelei und Kleine Maräne. Welche Art wird hier gezeigt?



- a) Moderlieschen
- ✓ b) Ukelei
- c) Kleine Maräne


Abgebildet ist hier ein für Sachsen sehr seltener, früher vorkommender Fisch.

Um welche Art handelt es sich?



- a) Zope
- ✓ b) Maifisch
- c) Schneider

Welche Salmonidenart ist hier zu sehen?




- a) Regenbogenforelle
- b) Bachforelle
- ✓ c) Bachsaibling

Welche Schonzeit gilt für die abgebildete Fischart?



- a) 1. Oktober bis 30. April
- ✓ b) 1. Januar bis 15. Juni
- c) 1. Januar bis 30. April

Welche der drei Beschreibungen bezieht sich auf das dargestellte Tier?



- a) Aal, katadromer Wanderfisch
- ✓ b) Flussneunauge, anadromes Rundmaul
- c) Steinbeißer, stationärer Bodenbewohner

Folgende Fische sind Bartelträger, welche Art ist hier zu sehen?



- a) Gründling
- ✓ b) Barbe
- c) Schmerle

Einen ganzjährigen Schutzstatus besitzt die abgebildete Fischart, welche ist es?



- a) Schmerle
- b) Steinbeißer
- ✓ c) Schlammpeitzger

Bei der dargestellten Fischart nimmt das Männchen zur Laichzeit ein prächtiges Laichkleid an, welche ist es?



- a) Elritze
- ✓ b) Bitterling
- c) Rotaugen

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Die abgebildete Fischart bevorzugt sauerstoffreiche Fließgewässer mit kiesigem Untergrund, wie heißt sie?



- a) Quappe
- ✓ b) Groppe
- c) Schmerle

Welcher räuberisch lebende Bartelträger ist hier dargestellt?



- a) Europäischer Wels
- ✓ b) Quappe
- c) Zwergwels

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Die Flossenstellung kann ein wichtiges Kriterium zur Arterkennung sein. Um welche Cyprinidenart handelt es sich bei der abgebildeten?



- a) Rotfeder
- ✓ b) Aland
- c) Rotaugen

Die dargestellte Fischart bildet im männlichen Geschlecht zur Fortpflanzungszeit einen Laichauschlag aus, welche ist es?



- a) Rotaugen
- b) Blei
- ✓ c) Güster

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Das silbriggraue Schuppenkleid ist für alle aufgeführten Cyprinidenarten charakteristisch.
Um welche handelt es sich bei der abgebildeten?



- ✓ a) Hasel
- b) Rotaugen
- c) Döbel

Die typische Maulstellung vieler Fischarten deutet auf die überwiegende Ernährungsweise hin.
Welche Fischart ist hier dargestellt.



- a) Nordseeschnäpel
- ✓ b) Nase
- c) Barbe

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Eine bodenorientierte Lebensweise ist für die genannten Fischarten typisch. Welche Art wird hier gezeigt?




- a) Schmerle
- b) Gründling
- ✓ c) Steinbeißer

Der korpulente, massige Körper ist allen genannten Fischarten gemein, welcher Karpfenartige ist hier abgebildet?



- a) Schuppenkarpfen
- ✓ b) Giebel
- c) Karausche

Die hier abgebildete Fischart ist häufig in anderer Farbvariante in Gartenteichen zu finden, welche ist gemeint?




- a) Giebel
- b) Plötze
- ✓ c) Aland

Um welche räuberisch lebende Cyprinidenart handelt es sich hier?



- a) Döbel
- b) Barbe
- ✓ c) Rapfen

Welche Fischart ist hier abgebildet?



- a) Hasel
- ✓ b) Döbel
- c) Aland

Welchen grünelnden Fisch zeigt die Abbildung?



- a) Karausche
- ✓ b) Schleie
- c) Giebel

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Anhand der Seitenlinie ist der abgebildete Kleinfisch eindeutig zu bestimmen, um welchen handelt es sich?



- ✓ a) Moderlieschen
- b) Ukelei
- c) Schneider

Eine vergleichbare Körperform ist vielen Cypriniden gemein, welche Art ist abgebildet?



- a) Rotfeder
- ✓ b) Rotaugen
- c) Güster

Anflugsnahrung steht beim abgebildeten Cypriniden unter anderem auch auf dem Speiseplan. Welche Fischart ist es?



- a) Güster
- b) Rotaugen
- ✓ c) Rotfeder

Drei bevorzugt am Boden lebende Bartelträger mit ähnlichem Körperbau finden wir in Sachsen. Welche Fischart ist hier abgebildet?



- a) Schlammpeitzger
- ✓ b) Schmerle
- c) Steinbeißer

Fragenpool Sachkundeprüfung-Fischereischein
08.06.2018

Bei vielen Fischarten lassen sich Rückschlüsse auf Ernährungsweise und Lebensraum auf Grund der typischen Maulform machen. Welche Fischart ist hier dargestellt?



- ✓ a) Gründling
- b) Schmerle
- c) Barbe

Dieser nichtheimische, eingeschleppte Kleinfisch tritt oft in Massen auf. Um welche Art handelt es sich?




- a) Moderlieschen
- ✓ b) Blaubandgründling
- c) Ukelei

Welcher Percide ist hier abgebildet?




- a) Forellenbarsch
- b) Zander
- ✓ c) Kaulbarsch

Um welchen Planktonfiltrierer handelt es sich hier?



- ✓ a) Marmorkarpfen
- b) Graskarpfen
- c) Silberkarpfen

Die Form der Rückenflosse ist charakteristisch für diesen Cypriniden, welcher ist gemeint?



- a) Giebel
- b) Schuppenkarpfen
- ✓ c) Karausche

Welcher bunt gefärbte Kleinfisch, der auch in Gartenteichen gehalten wird, ist hier abgebildet?



- a) Bitterling
- ✓ b) Sonnenbarsch
- c) Neunstachliger Stichling

Sachgebiet: Allgemeine Fischkunde

1.821 Alle drei in der Antwort genannten Fischarten besitzen am Kiemendeckel einen spitz auslaufenden Dorn. Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?

- ☐ Flussbarsch
- ☒ Groppe
- ☐ Kaulbarsch

1.806 Alle in den Antworten genannten Fische besitzen 6 Barteln. Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?

- ☐ Steinbeißer
- ☐ Bachschmerle
- ☒ Europäischer Wels

29 An der Kiemenoberfläche wird:

- ☐ vom Blut Sauerstoff abgegeben und Kohlendioxid aufgenommen
- ☒ vom Blut Sauerstoff aufgenommen und Kohlendioxid abgegeben
- ☐ vom Blut Sauerstoff und Kohlendioxid aufgenommen

56 An welchen Teilen des Fischkörpers kann man das ungefähre Alter des Fisches feststellen?

- ☐ an der Stärke der Haut und an der Anzahl der Flossenstrahlen
- ☐ an der Anzahl der Kiemenbögen und an der Länge derselben
- ☒ an den Schuppen

1.863 Anflugnahrung steht beim abgebildeten Cypriniden unter anderem auch auf dem Speiseplan. Welche Fischart ist es?

- ☐ Güster
- ☐ Rotaugen
- ☒ Rotfeder

1.861 Anhand der Seitenlinie ist der abgebildete Kleinfisch eindeutig zu bestimmen, um welchen handelt es sich?

- ☒ Moderlieschen
- ☐ Ukelei
- ☐ Schneider

68 Auf welchem Organ parasitiert die Karpfenlaus ?

- ☐ auf der Leber
- ☐ an der Leibeshöhle
- ☒ auf der Haut

1.631 Augen sind wichtig für den Beutefang. Bei welcher Fischart haben die Augen eine besondere Bedeutung?

- ☐ Wels
- ☐ Aal
- ☒ Hecht

1.865 Bei vielen Fischarten lassen sich Rückschlüsse auf Ernährungsweise und Lebensraum auf Grund der typischen Maulform machen. Welche Fischart ist hier dargestellt?

- ☒ Gründling
- ☐ Schmerle
- ☐ Barbe

985 Bei welchen Fischen dauert die embryonale Entwicklung von Ei bis zur Larve am längsten?

- ☒ Salmoniden
- ☐ Cypriniden
- ☐ Perciden

984 Bei welchen Fischen zieht man u. a. die Bartfäden zur Artenbestimmung heran?

- ☒ Cypriniden
- ☐ Salmoniden
- ☐ Perciden

320 Bei welcher Fischart ist das Maul unterständig?

- ☐ Bachforelle
- ☐ Hecht
- ☒ Nase

Sachgebiet: Allgemeine Fischkunde

1.012 Beim Verlust von Schuppen, kommt es beim Fisch:

- ☒ zur Bildung neuer Schuppen
- ☐ zu einer vernarbten, dauerhaft schuppenfreien Stelle
- ☐ zum unausweichlichen Tod des Fisches

1.632 Besitzen Fische Geruchsorgane?

- ☒ ja, zwischen Maulspitze und Augen befinden sich kleine Öffnungen, die so genannten Riechgruben
- ☐ ja, alle Fische haben aber nur eine Nasenöffnung
- ☐ nein, Fische besitzen keine speziellen Geruchsorgane

1.720 Cypriniden und Salmoniden sind allgemein durch ein klar erkennbares äußeres Merkmal leicht zu unterscheiden. Um welches Merkmal handelt es sich?

- ☐ die Seitenlinie
- ☐ die lange Afterflosse
- ☒ die Fettflosse

1.825 Das Männchen betreibt Brutpflege. Es bewacht das Laichnest. Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?

- ☐ Neunstacheliger Stichling
- ☒ Zander
- ☐ Groppe

1.853 Das silbriggraue Schuppenkleid ist für alle aufgeführten Cyprinidenarten charakteristisch. Um welche handelt es sich bei der abgebildeten?

- ☒ Hasel
- ☐ Rotaugen
- ☐ Döbel

1.785 Den hier abgebildeten Fisch nennt man Nordseeschnäpel oder Große Maräne. Zu welcher Familie gehört dieser?

- ☐ Salmoniden
- ☒ Coregonen
- ☐ Cypriniden

331 Der Fischkörper wird in drei Körperbereiche unterteilt. Das sind:

- ☒ Kopf, Rumpf und Schwanz
- ☐ Flossen, Rücken und Schuppen
- ☐ Maul, Kiemen und Seitenlinie

1.826 Der hier abgebildete Fisch besitzt zwei voneinander getrennte Rückenflossen. Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?

- ☐ Flussbarsch
- ☐ Zander
- ☒ Quappe

1.827 Der hier abgebildete Fisch hat Augen, deren Pupillen nach vorne zugespitzt sind. Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?

- ☐ Maräne
- ☒ Äsche
- ☐ Lachsforelle

1.786 Der hier abgebildete Fisch hat eine weit nach hinten versetzte Rückenflosse. Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?

- ☐ Hecht
- ☒ Atlantischer Stör
- ☐ Schlammpeitzger

1.820 Der hier abgebildete Fisch ist laut aktueller SächsFischVO ganzjährig geschont. Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?

- ☐ Dreistacheliger Stichling
- ☐ Groppe
- ☒ Neunstacheliger Stichling

Sachgebiet: Allgemeine Fischkunde

1.856 Der korpulente, massige Körper ist allen genannten Fischarten gemein, welcher Karpfenartige ist hier abgebildet?

- ☐ Schuppenkarpfen
- ☒ Giebel
- ☐ Karausche

987 Der Riemenbandwurm braucht als 1. Zwischenwirt:

- ☐ Schlamm Schnecken
- ☒ Ruderfußkrebse oder Hüpferlinge
- ☐ juvenile Hechte

1.811 Der Rogen dieses Fisches ist in der Laichzeit ungenießbar! Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?

- ☐ Döbel
- ☒ Barbe
- ☐ Quappe

1.849 Die abgebildete Fischart bevorzugt sauerstoffreiche Fließgewässer mit kiesigem Untergrund, wie heißt sie?

- ☐ Quappe
- ☒ Groppe
- ☐ Schmerle

1.819 Die Bauchflossen sind beim Männchen größer und weisen eine charakteristische Löffelform auf. Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?

- ☒ Schleie
- ☐ Plötze
- ☐ Rotfeder

1.852 Die dargestellte Fischart bildet im männlichen Geschlecht zur Fortpflanzungszeit einen Laichauschlag aus, welche ist es?

- ☐ Rotaugen
- ☐ Blei
- ☒ Güster

988 Die Eier von Hecht, Wels und Karpfen kleben bis zum Schlüpfen der Brut an Wasserpflanzen. Da diese Fische die Eier an eine Unterlage heften, nennen wir sie:

- ☒ Substratlaicher
- ☐ Freiwasserlaicher
- ☐ Sommerlaicher

1.851 Die Flossenstellung kann ein wichtiges Kriterium zur Arterkennung sein. Um welche Cyprinidenart handelt es sich bei der abgebildeten?

- ☐ Rotfeder
- ☒ Aland
- ☐ Rotaugen

1.869 Die Form der Rückenflosse ist charakteristisch für diesen Cypriniden, welcher ist gemeint?

- ☐ Giebel
- ☐ Schuppenkarpfen
- ☒ Karausche

989 Die Körperfärbung der Fische ist für ihre Tarnung von großer Wichtigkeit. Hier zeigen unsere Knochenfische weitgehend ähnliche Merkmale:

- ☐ die Oberseite (Rücken) ist hell, die Unterseite (Bauch) ist dunkel
- ☒ die Oberseite (Rücken) ist dunkel, die Unterseite (Bauch) ist hell
- ☐ Fische sind meist an den Seiten hell und auf dem Bauch und Rücken dunkel

1.633 Die Krebspest wird hervorgerufen durch:

- ☐ Einschleppung der Wasserpest (Wasserpflanze) in Gewässer mit Edelkrebsbeständen
- ☐ ein Bakterium
- ☒ einen Pilz

990 Die Rundmäuler bilden eine uralte Tierklasse. Durch welche Ordnung sind sie im Süßwasser vertreten?

- ☐ durch die Knochenfische
- ☒ durch die Neunaugen
- ☐ durch die Schmelzschrupper

Sachgebiet: Allgemeine Fischkunde

1.834 Die typische Maulstellung vieler Fischarten deutet auf die überwiegende Ernährungsweise hin. Welche Fischart ist hier dargestellt?

- ☐ Nordseeschnäpel
☒ Nase
☐ Barbe

335 Drei Grundfarben machen die Färbung des Fischkörpers aus. Es sind die Grundfarben:

- ☐ blau, grün, gelb
☒ schwarz, rot, gelb
☐ rot, blau, orange

1.798 Ein karpfenartiger Fisch hat laut aktueller SächsFischVO nur in Fließgewässern ein Mindestmaß. Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?

- ☐ Plötze
☒ Rotfeder
☐ Güster

1.810 Ein kleiner karpfenartiger Fisch hat ein oberständiges Maul und eine unvollständige Seitenlinie. Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?

- ☐ Elritze
☐ Ukelei
☒ Modellsieschen

1.842 Ein oberständiges Maul besitzen Modellsieschen, Ukelei und Kleine Maräne. Welche Art wird hier gezeigt?

- ☐ Modellsieschen
☒ Ukelei
☐ Kleine Maräne

1.797 Eine Fischart besitzt die Fähigkeit zur Darmatmung. Wie heißt dieser abgebildete Fisch?

- ☐ Steinbeißer
☒ Schlammpeitzger
☐ Gründling

1.862 Eine vergleichbare Körperform ist vielen Cypriniden gemein, welche Art ist abgebildet?

- ☐ Rotfeder
☒ Rotaugen
☐ Güster

1.634 Empfinden Fische Temperaturschwankungen?

- ☐ nein, Fische sind sehr widerstandsfähig gegenüber Temperaturschwankungen
☐ ja, aber nur bei Temperaturen über +4°C
☒ ja, Fische sind empfindsam gegenüber plötzlichen Temperaturschwankungen, diese können sogar tödlich sein

992 Fische können sich farblich recht schnell ihrer Umgebung anpassen. Diese Anpassung vollzieht sich:

- ☐ nur durch die Stärke des Lichteinfalls
☐ nur über Hormonsteuerung
☒ über das Auge und das Nervensystem

511 Fische mit Kamm- und Rundschuppen soll man nicht zusammen halten. Warum nicht?

- ☐ artspezifische Krankheiten
☐ Sauerstoffmangel
☒ Gefahr der Verletzung

1.846 Folgende Fische sind Bartelträger, welche Art ist hier zu sehen?

- ☐ Gründling
☒ Barbe
☐ Schmerle

993 Für welche Fische ist Laichausschlag charakteristisch?

- ☒ Cypriniden
☐ Salmoniden
☐ Perciden

Sachgebiet: Allgemeine Fischkunde

- 994** Hechteier benötigen zur Entwicklung ca. 120 Tagesgrade bis zum Schlupf. Wann schlüpft die Brut bei einer gleichmäßigen Wassertemperatur von 10°C?
- ☐ 15 Tage nach der Eiablage
 - ☒ 12 Tage nach der Eiablage
 - ☐ 10 Tage nach der Eiablage
- 1.011** Im Rachen der Cypriniden befinden sich zwei gegenüberstehende Knochenbögen. Zur Nahrungszerkleinerung nutzen Cypriniden:
- ☐ Pflugscharbeine
 - ☐ Kieferbögen
 - ☒ Schlundzähne
- 1.635** In welchen Altersstadien unserer Fische ist die prozentuale Gewichtszunahme am größten?
- ☒ bei Jungfischen
 - ☐ bei adulten Fischen
 - ☐ Fische wachsen in allen Altersstadien gleichmäßig
- 1.636** In welchen Gewässern können Fischkrankheiten auftreten?
- ☐ nur in Gewässern ohne Wasserzufluss
 - ☐ nur in abwasserbelasteten Gewässern
 - ☒ in allen stehenden und fließenden Gewässern
- 996** In welcher fischereibiologischen Region sind die meisten Fischarten anzutreffen?
- ☒ Bleiregion
 - ☐ Forellenregion
 - ☐ Äschenregion
- 1.637** Ist bei Fischen die Entwicklung der Eier von der Temperatur abhängig?
- ☒ ja, bei allen Fischen
 - ☐ nein, die Entwicklung ist nur vom Sauerstoffgehalt abhängig
 - ☐ nur bei den Cypriniden
- 1.639** Kann die Wetterlage oder ein Wetterumschwung Auswirkungen auf das Verhalten eines Fisches haben?
- ☐ nein, Fische reagieren nicht auf Wetterveränderungen
 - ☒ ja, wechselnder Luftdruck zeigt Auswirkungen auf die Schwimmblase und kann damit das Verhalten der Fische beeinflussen
 - ☐ ja, besonders Fische ohne Schwimmblase zeigen starke Veränderungen im Verhalten und in der Körperfärbung
- 1.033** keine Schwimmblase haben?
- ☐ Hechte, Zander, Barsche
 - ☒ Groppen, Neunaugen, Makrelen
 - ☐ Karpfen, Forellen
- 1.640** Können an einer Virusinfektion erkrankte Fische zu Krankheiten beim Menschen führen?
- ☐ ja, bei Hautkontakt mit den erkrankten Fischen
 - ☒ nein, Fischviren sind auf den Menschen nicht übertragbar
 - ☐ ja, beim Verspeisen erkrankter Fische
- 1.533** Können bakterielle Erkrankungen der Fische auf den Menschen übertragen werden ?
- ☐ ja, dies trifft generell auf alle Fischerkrankungen zu
 - ☐ nein, es findet keine Übertragung bakterieller Erkrankungen statt
 - ☒ ja, in einzelnen Fällen können Bakterien übertragen werden
- 1.641** Können Fische Farben erkennen?
- ☐ nein, Fische erkennen keine Farben
 - ☐ ja, aber nur zur Laichzeit
 - ☒ ja, sie können Farben sehen und unterscheiden
- 730** Können Fische Geräusche wahrnehmen?
- ☐ nur Jungfische
 - ☒ ja, sehr gut
 - ☐ nur in Verbindung mit Lichteindrücken

Sachgebiet: Allgemeine Fischkunde

1.642 Können Fische selbst schmecken?

- ☐ nein, Fische besitzen keinen Geschmackssinn
 - ☐ ja, Fische schmecken aber nur mit den Geschmacksknospen auf der Zunge
 - ☒ ja, die Geschmacksknospen befinden sich am gesamten Körper, überwiegend am Kopf, dem Maul und den Barteln
-

1.643 Können Fischkrankheiten durch mitgebrachte Köderfische auf ein Gewässer übertragen werden?

- ☒ ja
 - ☐ nein
 - ☐ nein, nicht wenn der Köderfisch bereits tot ist
-

1.638 Können sich im Wasser befindende Fische aus dem Wasser heraussehen ?

- ☒ ja, aber nur mit begrenztem Sichtfeld
 - ☐ ja, ohne Einschränkung
 - ☐ nein
-

1.005 Lachse und lachsverwandte Fische gehören zur Familie der:

- ☒ Salmonidae
 - ☐ Cyprinidae
 - ☐ Percidae
-

1.644 Milchner einiger Salmoniden zeigen zur Laichzeit unter anderem eine deutliche körperliche Veränderung. Welche?

- ☐ am Körper bildet sich Laichausschlag
 - ☐ die Augen vergrößern sich deutlich
 - ☒ der Unterkiefer bildet sich zu einem Laichhaken um
-

1.004 Mit welchem Organ atmen Flusskrebse ?

- ☐ Lunge
 - ☐ Darm
 - ☒ Kiemen
-

1.006 Muss man die Lage des Gehirns des Fisches genau kennen?

- ☐ nein, weil diese Kenntnis keinen praktischen Nutzen besitzt
 - ☒ ja, weil diese Kenntnis erst ein Abschlagen laut Tierschutzgesetz und Tierschutzschlachtverordnung ermöglicht
 - ☐ nein, weil Betäubungsarten ohne Schlag auf das Hirn wirkungsvoller sind
-

1.007 Nach einer bestimmten Entwicklungszeit schlüpfen aus den Fischeiern Larven. Wie lange dauert diese?

- ☐ die Entwicklungszeit dauert bei Fischen rund 21 Tage
 - ☒ die Entwicklungszeit lässt sich je nach Fischart in Tagesgraden berechnen
 - ☐ die Entwicklung vom Ei bis zum Schlupf der Larve dauert nie länger als zehn Tage
-

35 Neunaugen gehören zu den:

- ☐ störrartigen Fischen
 - ☐ Knochenfischen
 - ☒ Rundmäulern
-

1.645 Rückenflossen mit Hartstrahlen kommen bei welchen Fischen vor?

- ☒ Perciden
 - ☐ Salmoniden
 - ☐ Cypriniden
-

1.008 Salmoniden haben eine Fettflosse. Welche Aussage ist richtig?

- ☒ sie ist immer strahlenlos
 - ☐ sie hat Weichstrahlen
 - ☐ sie hat Hartstrahlen
-

1.010 Suchen Sie die richtige Antwort aus!

- ☐ Cypriniden haben 2 Fettflossen und eine zweiteilige Schwimmblase
- ☐ Cypriniden haben keine Fettflosse und eine einteilige Schwimmblase
- ☒ Cypriniden haben keine Fettflossen und eine zweiteilige Schwimmblase

Sachgebiet: Allgemeine Fischkunde

1.796 Um welche Fischart handelt es sich bei dem abgebildeten Fisch?

- ☐ Barbe
- ☐ Bachschmerle
- ☒ Gründling

1.858 Um welche räuberisch lebende Cyprinidenart handelt es sich hier?

- ☐ Döbel
- ☐ Barbe
- ☒ Rapfen

1.868 Um welchen Planktonfiltrierer handelt es sich hier?

- ☒ Marmorkarpfen
- ☐ Graskarpfen
- ☐ Silberkarpfen

1.835 Um welchen ursprünglich in Europa nicht heimischen Salmoniden handelt es sich hier?

- ☐ Tigerforelle
- ☒ Regenbogenforelle
- ☐ Bachsaibling

1.646 Vervollständigen Sie richtig: Die Schuppen auf dem Fischkörper ...

- ☐ haben keine Bedeutung
- ☒ sind bedeckt von der Oberhaut
- ☐ sind bedeckt von der Lederhaut

1.014 Wann haben Fische einen erhöhten Sauerstoffbedarf?

- ☐ nie, denn der Sauerstoffbedarf ist immer gleich groß
- ☒ bei hoher Wassertemperatur
- ☐ bei niedriger Wassertemperatur

1.015 Wann kann der Angler vom Fisch schlecht gesehen werden?

- ☐ wenn der Angler am Ufer entlang geht
- ☐ wenn der Winkel Fisch-Wasseroberfläche-Angler recht steil (spitz) ist
- ☒ wenn der Winkel Fisch-Wasseroberfläche-Angler recht flach (stumpf) ist

1.016 Warum können Makrelen nicht im Süßwasser leben?

- ☒ weil ihr Stoffwechsel an den Salzgehalt des Meeres angepasst ist
- ☐ im Süßwasser stehen keine geeigneten Nahrungsquellen zur Verfügung
- ☐ der Sauerstoffgehalt im Süßwasser ist zu gering

1.017 Warum werden Fische als wechselwarme Tiere bezeichnet?

- ☒ weil sich ihre Körpertemperatur der jeweiligen Wassertemperatur angleicht
- ☐ weil sie ihre Körpertemperatur unabhängig von der Wassertemperatur wechseln können
- ☐ weil trotz wechselnder Wassertemperatur, ihre Körpertemperatur immer konstant bleibt

1.018 Was bedeuten die in der Durchsicht dunkel erscheinenden Ringe und Bögen in Fischschuppen?

- ☒ altersbedingte Wachstumsringe
- ☐ krankheitsbedingte Veränderungen
- ☐ natürliche Maserung

1.019 Was bedeutet es, wenn die Fische mit dem Maul über die Wasseroberfläche drängen?

- ☐ das Wasser ist zu kalt
- ☒ es könnte eine Sauerstoffmangel-Situation vorliegen
- ☐ es liegt ein Nahrungsmangel vor, weshalb verstärkt Futter an der Wasseroberfläche gesucht wird

821 Was befähigt Fische zum Hören?

- ☐ die Schleimhaut
- ☒ ein inneres Hörorgan
- ☐ die Kiemendeckel

Sachgebiet: Allgemeine Fischkunde

1.020 Was bezeichnet man als Laichausschlag?

- ☒ die bei vielen Cypriniden perlartigen Ausstülpungen der Haut im Kopfbereich
 - ☐ bakterielle Infektion der Oberhaut durch sinkende Kondition in der Laichzeit
 - ☐ äußerliche Kennzeichen die zeigen, dass der Fisch bereits abgelaicht hat
-

1.647 Was bezeichnet man als Laichgrube?

- ☐ einen Teich, der mit laichreifen Fische besetzt wird, in dem diese dann ablaichen
 - ☐ eine spezielle Gerätschaft zum Fang laichreifer Fische
 - ☒ eine vom Fisch angelegte Vertiefung im Gewässergrund zur Laichablage
-

512 Was bezeichnet man als Rogen?

- ☒ die Geschlechtsprodukte des weiblichen Fisches
 - ☐ die Geschlechtsprodukte des männlichen Fisches
 - ☐ Fischlarven
-

1.023 Was geschieht häufig nach einer Verletzung der Oberhaut?

- ☒ eine Verpilzung der Wunde
 - ☐ der Fisch verstirbt unmittelbar an der Verletzung
 - ☐ die Wunde schließt sich sofort wieder
-

1.648 Was ist ein Laichhaken?

- ☐ hakenartige Ausbildung der Bauchflossen während der Laichzeit
 - ☒ hakenartige Ausbildung des Unterkiefers bei Milchneern einiger Salmoniden während der Laichzeit
 - ☐ ein bestimmtes Bewegungsmuster, das Salmoniden beim Laichvorgang ausüben
-

52 Was kann man mit Hilfe der Schuppen feststellen?

- ☒ das Alter der Fische
 - ☐ das Geschlecht
 - ☐ Freßgewohnheiten
-

1.026 Was nehmen Jungfische als Hauptnahrung auf?

- ☐ Sprock
 - ☐ kleinste Muscheln und Schnecken
 - ☒ tierisches Plankton
-

1.649 Was sind Barteln ?

- ☒ Geschmacks- und Tastorgane
 - ☐ Gleichgewichtsorgane
 - ☐ evolutionäre Rudimente ohne Funktion und Bedeutung
-

1.028 Was sind Kammschuppen ?

- ☐ große Schuppen im Kopf- und Rückenbereich
 - ☒ Schuppen mit gezähntem Rand
 - ☐ Schuppen mit gewölbter Oberfläche
-

71 Was sind kehlständige Bauchflossen?

- ☒ Bauchflossen vor den Brustflossen
 - ☐ Bauchflossen hinter den Brustflossen
 - ☐ Bauchflossen auf Höhe der Brustflossen
-

1.031 Was versteht man unter dem Begriff Milchneer ?

- ☐ einen Vertreter aus der Ordnung der Milchfische
 - ☒ einen männlichen Fisch nach Erreichen der Geschlechtsreife
 - ☐ ein Lebensstadium in der Entwicklung des Fisches
-

1.029 Was versteht man unter dem Begriff Rogner ?

- ☒ einen weiblichen Fisch nach Erreichen der Geschlechtsreife
 - ☐ eine bestimmte Fischart
 - ☐ eine süddeutsche Karpfenrasse
-

Sachgebiet: Allgemeine Fischkunde

1.025 Was versteht man unter einer Laichwanderung?

- ☐ das Fortspülen des Laiches mit der Strömung
- ☒ die Wanderung von Fischen zu einem geeigneten Laichplatz
- ☐ die Wanderung der Fische nach Beendigung der Laichzeit

1.030 Was versteht man unter Parasitismus?

- ☒ Interaktion zwischen zwei Organismen, mit einseitigem Nutzen. In dieser Parasit - Wirt Beziehung entzieht der Parasit dem Wirt Nährstoffe, ohne ihn dadurch direkt zu töten.
- ☐ Interaktion zwischen zwei Organismen, mit gegenseitigem Nutzen. In dieser Parasit - Wirt Beziehung kommt es zu einem Austausch von Nährstoffen.
- ☐ Interaktion zwischen zwei Organismen, ohne gegenseitigen Nutzen. In dieser Parasit - Wirt Beziehung kommt es zu keinem Austausch von Nährstoffen.

162 Was versteht man unter Reusenzähnen?

- ☐ netzartige Anordnung von Zähnen im Gaumen des Hechtes
- ☐ zahntartige Pflöcke zum sicheren Befestigen der Reusen in Fließgewässern
- ☒ siebartige Dornen im Kiemenbogen zum Rausfiltern von Nahrung

45 Was versteht man unter Schuppensträube?

- ☐ Verletzung
- ☒ Symptom einer Fischkrankheit
- ☐ zur Abwehr aufgestellte Schuppen

1.022 Welche Art von Schwimmblase haben Cypriniden ?

- ☐ eine einteilige Schwimmblase
- ☐ eine zweiteilige Schwimmblase ohne Verbindung zum Schlund
- ☒ eine zweiteilige Schwimmblase mit Verbindung zum Vorderdarm

1.036 Welche Aufgabe erfüllen Rücken- und Afterflossen heimischer Fische?

- ☐ Fortbewegung
- ☐ Steuerung
- ☒ Stabilisation

1.034 Welche Aufgabe hat die Niere des erwachsenen Fisches ?

- ☒ sie dient der Ausscheidung flüssiger Stoffwechselendprodukte
- ☐ sie regelt nur den Hormonhaushalt
- ☐ sie bildet ausschließlich Verdauungstoffe

1.035 Welche Aufgabe hat die Schleimhaut?

- ☒ Schutz gegen äußere Einflüsse und Verringerung des Reibungswiderstandes beim Schwimmen
- ☐ sie trägt zur Färbung des Fisches bei und ist damit für dessen Tarnung verantwortlich
- ☐ sie dient der Verankerung der Schuppen und gibt ihnen damit Halt

723 Welche Aufgaben erfüllen die paarigen Flossen in erster Linie?

- ☒ Steuerung und Bremsen
- ☐ Antrieb
- ☐ keine

1.037 Welche Aufgaben hat das Seitenlinienorgan?

- ☐ Aufnahme von Lichtreizen
- ☐ Aufnahme hormoneller Reize
- ☒ Aufnahme von Strömungsreizen

724 Welche aufgeführte Flosse ist beim Fisch paarig vorhanden?

- ☐ die Schwanzflosse
- ☐ die Fettflosse
- ☒ die Brustflosse

Sachgebiet: Allgemeine Fischkunde

1.038 Welche Aussage über das Schonmaß ist richtig?

- ☐ es soll sicherstellen, dass Fische nur ab einer für den Verzehr verwertbaren Größe gefangen werden.
- ☒ es soll sicherstellen, dass Fische bis zum Erreichen des Schonmaßes mindestens einmal abgelacht haben
- ☐ es soll sicherstellen, dass für die Berufsfischerei immer genügend Fisch im Gewässer verbleibt

1.032 Welche Aussage über den Fischbestand in unseren Gewässern ist richtig?

- ☒ in den meisten Gewässern gibt es mehr Friedfische als Raubfische
- ☐ in den meisten Gewässern gibt es mehr Raubfische als Friedfische
- ☐ in unseren Gewässern gibt es in der Regel gleiche Anteile von Raubfischen und Friedfischen

1.039 Welche Aussage über die Sauerstoffanreicherung des Fischblutes ist richtig ?

- ☐ das Fischblut wird in den Nieren mit Sauerstoff angereichert
- ☐ im Herz findet die Sauerstoffanreicherung des Fischblutes statt
- ☒ die Sauerstoffanreicherung des Fischblutes erfolgt in den Kiemen

1.040 Welche Bedeutung haben Wasserflöhe, Hüpferlinge und andere Zooplankter für die Fische?

- ☐ sie sind Nahrungskonkurrenten
- ☐ sie sind wichtige Sauerstoffproduzenten
- ☒ sie sind wertvolle Fischnahrung

1.041 Welche Bedeutung hat der Dottersack für die geschlüpfte Fischlarve?

- ☐ er verhindert, dass sie von der Strömung fortgeschwemmt wird
- ☒ er dient der Ernährung
- ☐ er dient dem Auftrieb zur Füllung der Schwimmblase

1.046 Welche der aufgeführten Parasiten sind Endoparasiten?

- ☐ Hakensaugwürmer
- ☒ Bandwürmer
- ☐ Karpfenlaus

1.049 Welche Farbe hat die Leber gesunder Süßwasserfische (außer Hecht und Quappe)?

- ☐ weißlich bis gelblich
- ☐ grünlich
- ☒ hellbraun bis rotbraun

1.050 Welche Farbe ist bei manchen Fischen in der Laichzeit besonders kräftig ausgeprägt?

- ☐ gelb
- ☐ grün
- ☒ rot

1.859 Welche Fischart ist hier abgebildet?

- ☐ Hasel
- ☒ Döbel
- ☐ Aland

1.838 Welche Fischart ist hier zu sehen?

- ☐ Seesaibling
- ☐ Bachforelle
- ☒ Bachsaibling

1.044 Welche Fischart laicht von Mai - Juli?

- ☐ Bachforelle
- ☒ Wels
- ☐ Quappe

1.830 Welche Fischart wird hier abgebildet?

- ☒ Äsche
- ☐ Große Maräne
- ☐ Bachsaibling

Sachgebiet: Allgemeine Fischkunde

1.809 Welche Fischart wird hier abgebildet?

- ☒ Bachneunauge
☐ Europäischer Aal
☐ Schlammpeitzger
-

1.048 Welche Fische bekommen starken Laichausschlag?

- ☐ Forelle, Saibling
☒ Plötze, Blei
☐ Barsch, Zander
-

545 Welche Fische bezeichnet man als Wanderfische?

- ☐ Fische die nachts tiefe Gewässerteile aufsuchen
☐ Fische die am Tag tiefe Gewässerteile aufsuchen
☒ Fische die zum Laichen weit entfernte Gewässer aufsuchen
-

696 Welche Fische erkranken vorwiegend an der sog. Fleckenseuche?

- ☒ Hechte und Aale
☐ Forellen und Saiblinge
☐ Barsche und Zander
-

1.051 Welche Fische haben eine Fettflosse?

- ☐ Perciden
☒ Salmoniden
☐ Cypriniden
-

697 Welche Fische haben für den Menschen besonders schleimhautreizendes Blut?

- ☐ Zander und Quappe
☐ Maräne und Stör
☒ Aal und Wels
-

1.724 Welche Fische haben Kammschuppen ?

- ☐ Karpfenartige
☐ Welse
☒ Barschartige
-

1.052 Welche Fische haben keinen Magen ?

- ☐ Perciden
☒ Cypriniden
☐ Salmoniden
-

983 Welche Fische lassen sich durch die unterschiedliche Bezeichnung des Pflugscharbeins unterscheiden?

- ☒ Forellen (Salmoniden)
☐ Karpfen (Cypriniden)
☐ Barschen (Perciden)
-

64 Welche Fische leben bevorzugt in der Forellenregion?

- ☒ Salmoniden
☐ Wels und Kaulbarsch
☐ Döbel und Schleie
-

1.054 Welche Fische werden als Friedfische bezeichnet?

- ☐ Fische, deren Hauptnahrung aus Friedfischen besteht
☒ Fische, deren Hauptnahrung aus pflanzlichem und tierischem Plankton besteht
☐ Fische, die in Schwärmen vorkommen
-

1.064 Welche Fischnährtiere leben im Gewässerboden?

- ☐ Hüpfertinge
☒ Schlammröhrenwürmer
☐ Steinfliegenlarven
-

Sachgebiet: Allgemeine Fischkunde

34 Welche Funktion erfüllt die Schwanzflosse des Fisches vorrangig?

- ☐ Steuerungsfunktion
- ☐ Bremsfunktion
- ☒ Antriebsfunktion

1.055 Welche Funktion hat die Fettflosse?

- ☒ die Funktion ist bisher nicht bekannt
- ☐ sie dient der Fortpflanzung
- ☐ sie dient der Stabilisation

1.630 Welche Funktion hat die Oberhaut des Fisches?

- ☐ sie macht den Fisch schlüpfzig zum Schutz vor Raubfischen
- ☒ sie verringert den Reibungswiderstand, schützt vor äußeren Umwelteinflüssen
- ☐ sie bietet dem Fisch die Möglichkeit zur Farbvariation, Schutz vor Räubern

1.629 Welche Funktion hat die Schwimmblase ?

- ☐ sie dient der Verdauung
- ☐ sie dient der Atmung in Form des Gasaustauschs
- ☒ sie dient als Auftriebskörper

1.058 Welche Gruppe unserer heimischen Fischfauna ist die Artenreichste?

- ☐ Salmoniden
- ☐ Perciden
- ☒ Cypriniden

1.042 Welche Merkmale treffen auf heimische Cypriniden zu ?

- ☐ Kopf mit Schuppen, bezahnte Kiefer, einkammrige Schwimmblase, Schlundzähne vorhanden
- ☒ Kopf schuppenlos, Kiefer unbezahnt, Schlundzähne vorhanden, Schwimmblase zweikammrig
- ☐ Fettflosse vorhanden, Kiemenreusendornen sehr zahlreich, Pflugscharbein bezahnt, Kopf schuppenlos

1.650 Welche Parasiten sind Ektoparasiten ?

- ☒ Fischegel
- ☐ Bandwürmer
- ☐ Fadenwürmer

1.844 Welche Salmonidenart ist hier zu sehen?

- ☐ Regenbogenforelle
- ☐ Bachforelle
- ☒ Bachsaibling

50 Welche Temperatur hat das Blut der Fische?

- ☐ ca. 35-37° C
- ☒ ca. die der Wassertemperatur
- ☐ ca. 10-13° C

1.651 Welche Tiere sind Fischparasiten?

- ☐ Ruderwanzen
- ☒ Fischegel
- ☐ Artemia

110 Welche Vögel können bei verstärktem Auftreten Fischbestände erheblich dezimieren?

- ☐ Schwäne
- ☐ Wildgänse
- ☒ Kormorane

1.860 Welchen gründelnden Fisch zeigt die Abbildung?

- ☐ Karausche
- ☒ Schleie
- ☐ Giebel

Sachgebiet: Allgemeine Fischkunde

1.059 Welchen Schuppentyp hat die Mehrzahl der heimischen Süßwasserfische?

- ☐ Schmelzschuppen
- ☐ Kammschuppen
- ☒ Rundschuppen

1.836 Welcher anadrome Wanderfisch wird hier abgebildet?

- ☐ Meerforelle
- ☒ Atlantischer Lachs
- ☐ Seeforelle

1.870 Welcher bunt gefärbte Kleinfisch, der auch in Gartenteichen gehalten wird, ist hier abgebildet?

- ☐ Bitterling
- ☒ Sonnenbarsch
- ☐ Neunstacheliger Stichling

76 Welcher der aufgeführten Fische laicht im Winter?

- ☐ Blei
- ☒ Quappe
- ☐ Wels

1.047 Welcher Fisch laicht in den Wintermonaten?

- ☒ Forelle
- ☐ Karpfen
- ☐ Rotaugen (Plötze)

1.805 Welcher heimische Krebs ist hier abgebildet?

- ☒ Edelkrebs
- ☐ Signalkrebs
- ☐ Kamberkrebs

1.867 Welcher Percide ist hier abgebildet?

- ☐ Forellenbarsch
- ☐ Zander
- ☒ Kaulbarsch

1.850 Welcher räuberisch lebende Bartelträger ist hier dargestellt?

- ☐ Europäischer Wels
- ☒ Quappe
- ☐ Zwergwels

1.824 Welcher Raubfisch wird hier abgebildet?

- ☐ Rapfen
- ☐ Barsch
- ☒ Zander

40 Welcher Umweltfaktor beeinflusst vorrangig die Temperatur des Fischblutes ?

- ☐ ausreichende Nahrungsaufnahme
- ☐ schnelle oder langsame Fortbewegung im Wasser
- ☒ die Wassertemperatur

1.652 Welcher Verdacht besteht, wenn sich in der Leibeshöhle des Karpfens eine starke Flüssigkeitsansammlung befindet?

- ☐ der Fisch leidet an einer Kiemenerkrankung
- ☒ der Fisch hat eine Infektion der inneren Organe
- ☐ es besteht kein Krankheitsverdacht

1.653 Welches Merkmal ist typisch für barschartige Fische?

- ☒ die erste Rückenflosse hat kräftige Hartstrahlen
- ☐ die zweite Rückenflosse hat kräftige Hartstrahlen
- ☐ es ist insgesamt nur eine weichstachelige Rückenflosse vorhanden

Sachgebiet: Allgemeine Fischkunde

1.063 Welches Organ befällt der Parasit Ergasilus sieboldi ?

- ☐ die Schwimmblase
- ☐ die Leber
- ☒ die Kiemen

310 Wer wird in der Regel jünger geschlechtsreif - Milchner oder Rogner?

- ☒ Milchner
- ☐ Rogner
- ☐ Beide gleichzeitig

1.065 Weshalb ist beim Schlachten des Fisches eine flache Messerführung im Inneren der Bauchhöhle angeraten?

- ☐ um die Tötung durch sicheren Herzstich zu beschleunigen
- ☐ um das Ausbluten zu gewährleisten
- ☒ um die Gallenblase nicht zu zerstören

1.654 Wie äußert sich die Ichthyophthiriose (Weißpünktchenkrankheit)?

- ☐ durch Glotzaugen
- ☐ durch weiße Punkte auf der Leber
- ☒ durch weiße Punkte auf dem ganzen Körper

1.066 Wie heißt das zentrale Stützsystem der Fische?

- ☐ Mittelgräte
- ☐ Hauptgräte
- ☒ Wirbelsäule

1.655 Wie können Fische ihre Sauerstoffaufnahme steigern?

- ☐ durch aktive Flossenbewegung
- ☒ durch Steigerung der Atemfrequenz
- ☐ durch Steigerung der Nahrungsaufnahme

1.068 Wie können Fischkrankheiten auf andere Fischbestände übertragen werden ?

- ☐ ausschließlich durch die Nahrungsaufnahme
- ☒ durch Wasser, erkrankte Fische, Fischnährtiere sowie Fischereigerät
- ☐ nur durch direkten Kontakt mit erkrankten Fischen

1.832 Wie nennt man den hier abgebildeten anadromen Wanderfisch?

- ☐ Regenbogenforelle
- ☒ Atlantischer Lachs
- ☐ Seeforelle

1.789 Wie nennt man die hier abgebildete aus Nordamerika stammende Fischart?

- ☐ Atlantischer Lachs
- ☒ Regenbogenforelle
- ☐ Äsche

1.790 Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?

- ☒ Bachsaibling
- ☐ Bachforelle
- ☐ Seeforelle

1.795 Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?

- ☐ Schuppenkarpfen
- ☐ Karausche
- ☒ Giebel

1.761 Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?

- ☐ Wels
- ☒ Hecht
- ☐ Rapfen

Sachgebiet: Allgemeine Fischkunde

1.814 Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?

- ☐ Europäischer Wels
- ☒ Zergwels
- ☐ Schlammpeitzger

1.815 Wie nennt man die hier abgebildete Fischart? Beachte die Rückenflosse.

- ☐ Große Maräne
- ☒ Äsche
- ☐ Bachsaibling

1.804 Wie nennt man die hier abgebildete Fischart? Bei Berührung fallen die Schuppen leicht ab.

- ☐ Moderlieschen
- ☐ Elritze
- ☒ Ukelei

1.812 Wie nennt man die hier abgebildete Fischart? Der abgebildete Fisch hat einen dunklen Fleck am Ende der ersten Rückenflosse.

- ☒ Flussbarsch
- ☐ Zander
- ☐ Kaulbarsch

1.816 Wie nennt man die hier abgebildete Fischart? Die Afterflosse ist leicht konvex. Im Alter lebt der Fisch räuberisch.

- ☐ Nase
- ☐ Aland
- ☒ Döbel

1.822 Wie nennt man die hier abgebildete Fischart? Die Männchen haben eine rote Laichfärbung und betreiben echte Brutpflege.

- ☐ Bachsaibling
- ☐ Goldfisch
- ☒ Dreistacheliger Stichling

1.813 Wie nennt man die hier abgebildete Fischart? Es existieren zwei Rückenflossen, die miteinander verbunden sind.

- ☐ Forellenbarsch
- ☐ Flussbarsch
- ☒ Kaulbarsch

1.758 Wie nennt man die hier abgebildete Fischart? Es handelt sich um einen Schwarmfisch, der auch ein Indikator für gute Gewässerqualität ist.

- ☐ Moderlieschen
- ☒ Elritze
- ☐ Ukelei

1.760 Wie nennt man die hier abgebildete Fischart? Ihr Augendurchmesser ist im Verhältnis zur Maulspalte größer oder gleich groß.

- ☐ Blei
- ☒ Güster
- ☐ Döbel

1.818 Wie nennt man die hier abgebildete Fischart? Ihre Rückenflosse ist konvex. Das Schuppenkleid scheint messing- bis bronzefarben.

- ☐ Giebel
- ☐ Schuppenkarpfen
- ☒ Karausche

1.762 Wie nennt man die hier abgebildete Fischart? Sie bevorzugt schnell fließende Gewässerabschnitte.

- ☐ Blei
- ☐ Güster
- ☒ Hasel

Sachgebiet: Allgemeine Fischkunde

1.808 Wie nennt man die hier abgebildete Fischart? Sie gehört zur Familie der Lachsartigen. Die Knochenplatten am Kiemendeckel berühren sich in einem Punkt.

- ☒ Atlantischer Lachs
☒ Bachforelle
☐ Äsche

1.802 Wie nennt man die hier abgebildete Fischart? Sie ist auch Leitfisch einer Fließgewässerregion.

- ☐ Äsche
☒ Barbe
☐ Blei

1.759 Wie nennt man die hier abgebildete Fischart? Sie ist ein Leitfisch einer Fließgewässerregion.

- ☒ Blei
☐ Güster
☐ Zope

1.803 Wie nennt man die hier abgebildete Fischart? Sie ist leicht mit anderen Fischarten zu verwechseln.

- ☒ Rotaugen
☐ Aland
☐ Rotfeder

1.817 Wie nennt man die hier abgebildete Fischart? Sie laicht im Winter ("Winterlaicher").

- ☐ Wels
☒ Quappe
☐ Schlammpeitzger

1.801 Wie nennt man die hier abgebildete Fischart? Sie verfügt über ein sehr großes Maul und eine konkave Afterflosse. Die Art lebt frühzeitig räuberisch.

- ☒ Rapfen
☐ Hasel
☐ Zander

1.069 Wie sind die Schuppen an einem Fisch fixiert?

- ☒ die Schuppen sitzen dachziegelartig nach hinten gerichtet in Taschen der Lederhaut
☐ die Schuppen sitzen dachziegelartig nach hinten gerichtet in der Schleimhaut
☐ die Schuppen sitzen dachziegelartig nach hinten gerichtet und sind fest mit der Muskulatur verwachsen

835 Wie sollen die Organe in einem gesunden Süßwasserfisch aussehen?

- ☐ die Leber - gelblich marmoriert, die Niere - wässrig aufgehell
☒ die Leber - rötlich-bräunlich, die Niere - dunkelrot
☐ die Leber - hellgelb, die Niere - ausgezackt

1.070 Wie sollte ein Hechtbesatz getätigt werden, damit Verluste durch Kannibalismus möglichst vermieden werden?

- ☐ in kleinen Mengen im Freiwasser
☐ möglich schnell alle Fische im Uferbereich freilassen
☒ einzeln in Ufernähe, wenn möglich an Krautbänken

1.656 Wie viele Fischarten kommen in Sachsen vor?

- ☐ ca. 20
☒ ca. 50
☐ ca. 120

1.657 Wie viele Rückenflossen haben die meisten Süßwasserfische?

- ☒ eine Rückenflosse
☐ zwei Rückenflossen
☐ drei Rückenflossen

296 Wie werden verästelte Gräten in der Nackenmuskulatur von Cypriniden bezeichnet?

- ☒ Y-Gräten
☐ z-Gräten
☐ x-Gräten

Sachgebiet: Allgemeine Fischkunde

65 Wieviel Fischarten kommen in Deutschland vor?

- ☐ ca. 20 Arten
- ☐ ca. 40 Arten
- ☒ ca. 80 Arten

39 Wieviel Kiemenbögen besitzen Karpfenfische?

- ☐ ein Paar
- ☐ zwei Paar
- ☒ vier Paar

1.071 Wir teilen die Fische nach dem Bau des Skeletts und ihrer Entwicklungsstufe in zwei große Gruppen ein:

- ☐ Säugetiere und wirbellose Fische
- ☒ Knorpelfische und Knochenfische
- ☐ Meeresfische und Süßwasserfische

1.072 Wo befinden sich die Schuppentaschen mit den Schuppen, sowie den Pigmentzellen?

- ☐ in der Oberhaut und der Schleimschicht
- ☒ in der Unter- oder Lederhaut
- ☐ zwischen den Muskelsegmenten

1.073 Wo befinden sich Fischegel an befallenen Fischen?

- ☐ in der Leibeshöhle
- ☐ in der Schwimmblase
- ☒ auf dem Körper

42 Wo befindet sich der Ferntastsinn bei den Fischen ?

- ☐ auf dem Rücken
- ☐ auf dem Bauch
- ☒ auf beiden Körperseiten

1.074 Wo befindet sich die Fettflosse?

- ☐ hinter den Brustflossen
- ☒ auf dem Schwanzstiel
- ☐ im Bauchbereich hinter den Bauchflossen

785 Wo befindet sich die Seitenlinie des Fisches ?

- ☒ an den Körperflanken
- ☐ längs der Bauchkante
- ☐ zwischen den paarigen Flossen

1.075 Wo liegen die Nieren beim Fisch?

- ☐ unter der Schwimmblase
- ☐ entlang der Bauchseite
- ☒ unterhalb der Wirbelsäule, vom Kopf bis hinter zum After

515 Wo liegen die Riechgruben der Fische?

- ☐ an der Seitenlinie
- ☐ an der Fettflosse
- ☒ zwischen Augen und Maulspitze

873 Wo liegt das Hauptnervensystem im Fischkörper?

- ☒ im Kopf und oberhalb der Wirbelsäule
- ☐ entlang der Unterseite der Nieren
- ☐ unter der Wirbelsäule

1.076 Wo sitzt das Herz der Fische?

- ☐ zwischen Schädelende und Rückenflosse
- ☐ in der Mitte zwischen Rückenflosse und Bauchflossen
- ☒ vor den Brustflossen, im Bereich der Kiemen

Sachgebiet: Allgemeine Fischkunde

202 Wodurch entsteht in der Laichzeit die sogenannte Laichfärbung?

- ☐ durch Änderung der Sehkraft in der Laichzeit
 - ☐ durch Umstellung einer Gehirnfunktion in der Laichzeit
 - ☒ durch Einwirkung von Hormonen in der Laichzeit
-

826 Wodurch kommt es in der Regel bei Fischen zu Verpilzungen?

- ☒ durch Verletzung der Schleimhaut
 - ☐ durch hohes Alter der Fische
 - ☐ durch falsche Ernährung
-

1.077 Wodurch können Viruserkrankungen bei Fischen übertragen werden?

- ☒ durch Transport- und Fanggeräte, Wasser und durch Kontakt Fisch zu Fisch
 - ☐ durch den menschlichen Verzehr erkrankter Fische
 - ☐ durch Endoparasiten wie den Fischbandwurm
-

1.078 Wodurch werden bakterielle Infektionen, wie Furunkulose begünstigt?

- ☒ durch stark organisch belastete Gewässer
 - ☐ durch einen schnellen Wechsel verschiedener Wetterlagen
 - ☐ nicht durch äußere Faktoren, da die Krankheitserreger in jedem Fisch vorhanden sind
-

78 Wodurch wird der Laichausschlag hervorgerufen?

- ☐ durch Parasiten
 - ☐ durch Verletzungen
 - ☒ durch Hormone
-

726 Womit nimmt der Fisch den Sauerstoff aus dem Wasser auf?

- ☐ mit dem Schlund
 - ☒ mit den Kiemen
 - ☐ über die Seitenlinie
-

55 Womit wird der Fischkörper hauptsächlich vorwärts bewegt?

- ☐ mit den Bauchflossen
 - ☐ mit den Rückenflossen
 - ☒ mit der Schwanzflosse
-

1.079 Woran erkennt man ein Fischsterben, das durch Abwässer hervorgerufen wird?

- ☒ das Fischsterben vollzieht sich in kurzer Zeit und betrifft alle im Gewässer vorkommenden Fischarten
 - ☐ das Fischsterben vollzieht sich schleichend und erfasst in der Regel nur bestimmte Fischarten
 - ☐ das Fischsterben erstreckt sich nur auf die am Boden lebenden Fischarten
-

1.080 Woran erkennt man ein Fischsterben, das durch eine Krankheit hervorgerufen wird?

- ☐ das Fischsterben vollzieht sich in kurzer Zeit und betrifft alle im Gewässer vorkommenden Fischarten
 - ☒ das Fischsterben ist in der Regel schleichend und erfasst nur eine oder miteinander verwandte Fischarten
 - ☐ das Fischsterben erstreckt sich nur auf bestimmte Bereiche des Gewässers
-

1.081 Worauf läßt das oberständige Maul eines Fisches schließen?

- ☒ der Fisch ernährt sich von Oberflächennahrung
 - ☐ der Fisch ist ein ausgesprochener Freiwasserjäger
 - ☐ der Fisch ernährt sich von Laich
-

67 Wozu dient den Fischen die Seitenlinie?

- ☒ als Sinnesorgan
 - ☐ zur Erhöhung der Sauerstoffaufnahme
 - ☐ sie hat keine spezielle Funktion
-

1.083 Wozu ist die Kenntnis der Lage des Gehirns eines Fisches wichtig?

- ☐ für die Auswahl des Köders
 - ☐ für die Auswahl der Hakengröße
 - ☒ für die richtige Ausführung des Betäubungsschlags
-

Sachgebiet: Allgemeine Fischkunde

1.084 Wozu kann man bei bestimmten Fischen die Fettflosse heranziehen?

- ☐ zur Bestimmung des Geschlechts
 - ☐ zur Abschätzung des Ernährungszustandes
 - ☒ zur Artbestimmung
-

1.794 Zu welcher Familie gehört dieser Fisch?

- ☒ Cypriniden
 - ☐ Coregonen
 - ☐ Salmoniden
-

722 Zu welcher Gruppe unserer Fischfauna gehören die meisten Fischarten?

- ☐ zur Gruppe der Barschartigen
 - ☒ zur Gruppe der Karpfenartigen
 - ☐ zur Gruppe der Forellenartigen
-

1.082 Zu welcher Klasse gehört der Parasit Ergasilus sieboldi?

- ☐ Gürtelwürmern
 - ☐ Hakensaugwürmern
 - ☒ Ruderfußkrebsen
-

695 Zu welcher Tiergruppe gehört die Karpfenlaus?

- ☐ zu den Läusen
- ☒ zu den Krebsen
- ☐ zu den Insekten

Sachgebiet: Gerätekunde

1.085 Ab welcher Schnurstärke sollten große Stationärrollen verwendet werden?

- ☐ bei 0,10 bis 0,12 mm starken Schnüren
- ☐ bei 0,15 bis 0,20 mm starken Schnüren
- ☒ bei 0,40 bis 0,50 mm starken Schnüren

1.086 An welcher Stelle einer mehrteiligen Stechrute besteht in der Regel die größte Bruchgefahr?

- ☐ an der Spitze
- ☒ an den starren Steckverbindungen
- ☐ am Handgriff

1.087 Auch in tiefen Gewässern kann mit einer Pose geangelt werden. Welche Pose ist vorteilhaft?

- ☐ die Antennenpose
- ☐ die Leuchtpose
- ☒ die Laufpose in Verbindung mit einem Stopper

1.089 Auf einer Rute sehen Sie den Aufdruck "Wurfgewicht 30 g". Welche Bedeutung hat dieser Aufdruck?

- ☐ die Rute sollte beim Wurf mit einem Gewicht von mindestens 30 g belastet werden
- ☒ die Rute sollte beim Wurf höchstens mit einem Gewicht von 30 g belastet werden
- ☐ mit dieser Rute kann nur eine Wurfweite bis zu 30 Metern erreicht werden

1.090 Auf welche Hakenform werden Fliegen gebunden?

- ☐ auf Plättchenhaken
- ☒ auf Öhrhaken
- ☐ auf Spezialhaken mit eingebundenem Vorfach

1.091 Aus welchem Material sind heute die leichtesten Angelruten gefertigt?

- ☐ gespließtes Tonkinrohr
- ☒ Kohlefaser
- ☐ Glasfaser

662 Bei einem Rollentyp dreht sich die Spule nicht mit. Die Schnur läuft über einen Schnurfangbügel. Welche Rolle arbeitet so?

- ☒ Stationärrolle
- ☐ Fliegenrolle
- ☐ Multirolle

780 Bei welchem Kunstköder rotiert ein Metallblatt um die Körperachse aus Draht?

- ☐ beim Blinker
- ☒ beim Spinner
- ☐ beim Wobbler

428 Bei welchen Stationärrollen wird die Schnur am meisten geschont?

- ☐ bei Stationärrollen mit kleinen feststehenden Schnurlaufröllchen
- ☐ bei Stationärrollen mit Plastikschnurlaufröllchen
- ☒ bei Stationärrollen mit drehbaren kugelgelagerten Schnurlaufröllchen

415 Bei welcher Angelart verwendet man vorrangig lange, unberingte Ruten?

- ☐ beim Flugangeln in größeren Forellengewässern
- ☐ beim Spinnangeln an Kanälen
- ☒ beim Stippangeln

670 Bei welcher Angelmethode sind besonders starke Wirbel zu wählen?

- ☐ beim Stippfischen
- ☒ beim Spinnfischen
- ☐ beim Fliegenfischen

1.697 Bei welcher Angelmethode werden im Allgemeinen Drillinge benutzt?

- ☐ beim Fliegenfischen
- ☒ beim Spinnfischen
- ☐ beim Angeln auf Friedfische

Sachgebiet: Gerätekunde

1.184 Bei welcher Angelmethode wird eine „doppelt verjüngte“ Schnur verwendet?

- ☐ Stippangeln
- ☒ Fliegenangeln
- ☐ Grundangeln

1.092 Bei welcher Angelmethode wird eine doppelt verjüngte Angelschnur (Double Taper) verwendet?

- ☐ beim Grundangeln
- ☐ beim Spinnfischen
- ☒ beim Fliegenfischen

438 Bei welcher Posenart wird ein Stopper verwendet?

- ☒ bei einer Lauf- oder Gleitpose
- ☐ bei keiner
- ☐ bei sehr kleinen Posen

1.093 Beim Fliegenfischen werden künstliche Fliegen als Köder geworfen, obgleich sie kaum ein Gewicht haben. Wie ist das möglich?

- ☐ die Fliege wird mit Blei beschwert
- ☐ die Fliege wird vom Wind getragen
- ☒ die Fliegenschnur bringt das zu werfende Gewicht

1.727 Bestimmte Ruten lassen sich ineinanderschieben. Diese Ruten heißen?

- ☐ Federruten
- ☒ Teleskopruten
- ☐ Fliegenruten

1.097 Darf ein Angler ein Wurfnetz benutzen, um Köderfische zu fangen?

- ☐ ja
- ☒ nein
- ☐ Ja, aber das Wurfnetz muss eine Spannweite von mindestens 1,5 m besitzen.

797 Der Schnurfangbügel ist Kennzeichen für:

- ☐ die Grundrolle
- ☐ die Multirolle
- ☒ die Stationärrolle

1.117 Die Einstellung der Schnurbremse richtet sich nach welcher Größe?

- ☐ die Größe und Kraft des zu erwartenden Fisches
- ☐ die Stärke der Rutenspitze
- ☒ die Tragkraft der Schnur

1.698 Ein typischer Wurmhaken soll welche Form haben?

- ☒ langschenklig mit Widerhaken auf dem Hakenschenkel
- ☐ kurzer Rundhaken mit großem Bogen
- ☐ Drillingsform

245 Eine Schnur hat 10 kg Tragkraft. Welche hat den geringeren Durchmesser?

- ☐ monofile
- ☒ geflochtene
- ☐ gleich

220 Für welche Angelmethode eignet sich neben der Stationärrolle auch die Multirolle?

- ☐ für das Fliegenfischen
- ☐ für die Stippangelei
- ☒ für das Grundangeln und das Spinnangeln

1.622 Für welche Angelmethode sind besonders robuste Ruten erforderlich?

- ☐ Feedern
- ☒ Welsangeln
- ☐ Fliegenfischen

Sachgebiet: Gerätekunde

1.096 Für welche Angelmethoden eignet sich die Multirolle besonders gut?

- ☐ sie eignet sich für alle gleich gut
- ☐ für das Stippangeln und das Fliegenfischen
- ☒ für das schwere Spinnfischen und das Meeresangeln

815 Für welche Angelmethoden sind Multi- und Stationärrollen nicht geeignet?

- ☒ für die Flugangelei
- ☐ für die Grundangelei
- ☐ für die Spinnangelei

409 Für welche der aufgeführten Angelmethoden wird eine Pose verwendet?

- ☐ Tunierangeln
- ☐ Spinnfischen
- ☒ Stippfischen

1.099 Für welche Fischart sind gekochte Kartoffeln ein guter Köder?

- ☐ Rapfen
- ☐ Flussbarsch
- ☒ Karpfen

1.100 Gefährden weggeworfene Schnurreste die Umwelt?

- ☐ nein, denn die Schnur verrottet relativ schnell
- ☐ nein, der nächste Angler kann sich daraus am Gewässer ein Vorfach anfertigen
- ☒ ja, sie sind eine Gefahr für die Tierwelt

1.103 Im Handel werden Ruten zum Teil ohne Schnurführungsringe angeboten. Meist fallen sie durch ihre beträchtliche Länge auf. Für welche Angelmethode sind sie besonders geeignet?

- ☐ Grundangeln
- ☐ Pilken
- ☒ Stippangeln

705 In welche Hauptgruppen werden künstliche Fliegen unterschieden?

- ☐ leichte und schwere Kunstfliegen
- ☐ große und kleine Kunstfliegen
- ☒ Naß- und Trockenfliegen

980 In welcher Reihenfolge muss nach dem Landen des Fisches vorgegangen werden?

- ☐ betäuben, töten, Haken entfernen, messen
- ☒ messen, ggf. Haken entfernen und zurücksetzen oder betäuben, töten, Haken entfernen
- ☐ betäuben, messen, töten, Haken entfernen

1.101 Ist es wichtig, Schnurenden mit speziellen Knoten zu verknüpfen?

- ☐ ja, sonst könnten Fische den Knoten erkennen
- ☐ nein, die Tragkraft der Schnur ist immer gleich und entspricht den Angaben des Herstellers
- ☒ ja, weil Knoten die Tragkraft der Angelschnüre herabsetzen können

1.699 Monofile Angelschnüre werden nach dem Durchmesser klassifiziert. Nach welchen Kriterien werden Multifile Angelschnüre eingeteilt?

- ☒ nach der Tragkraft
- ☐ nach der Länge
- ☐ nach der Anzahl der Fäden aus denen sie geflochten werden

1.102 Müssen ausgelegte Angeln ständig überwacht werden?

- ☐ nein, bei einigen Angelmethoden hakt sich der Fisch selbst
- ☒ ja, damit der Fisch nicht durch anhaltende, erfolglose Fluchtversuche Stress erleidet
- ☐ ja, damit der mögliche Fang nicht gestohlen werden kann

222 Nach welchem Grundsatz soll die Schnurstärke gewählt werden?

- ☐ immer möglichst stark
- ☒ nicht dünner als nötig
- ☐ immer möglichst dünn

Sachgebiet: Gerätekunde

94 Offene Stationärrolle beim Wurf. Welche Panne muß durch geschickte Handhabung möglichst vermieden werden?

- ☐ das Festziehen der Schnurbremse
- ☒ das Zurückspringen des Schnurfangbügels
- ☐ eine Perückenbildung durch zu schnelle Drehung der Schnurtrommel

1.104 Sie hören einen Angler von einer "Rutenaktion" sprechen. Was versteht man unter diesem Begriff?

- ☒ die Biegsamkeit der Rute bei Belastung
- ☐ die Länge der Rute
- ☐ die Rutenstärke

1.105 Sie kaufen eine monofile Schnur und lesen den Aufdruck "0,50 mm". Welche Bedeutung hat dieser Aufdruck?

- ☒ es ist eine starke Angelschnur mit einem Durchmesser von 0,50 mm
- ☐ die Schnur ist 10 x 50 m lang
- ☐ diese Schnur eignet sich besonders für Ruten mit einem Wurfgewicht von 50 g

1.106 Sie sind Angler und sehen in einem Angelgeschäft eine Reuse. Dürfen sie sich diese kaufen?

- ☒ ja, aber die angelfischereiliche Nutzung von Reusen ist verboten
- ☐ nein, der Erwerb einer Reuse ist bereits strafbar
- ☐ ja, aber die Reuse darf nur zum Köderfischfang verwendet werden

782 Sie wollen einen Unterfangescher erwerben, worauf sollten Sie besonders achten?

- ☒ auf die Bügelspannweite und die Qualität des Anklappsystems
- ☐ auf den Preis und auf die Herstellerfirma
- ☐ auf die Farbe des Netzes

214 Von welchem Teil der Angelrolle wird ein Schnurriß durch einen starken Fisch vermieden?

- ☒ durch die richtig eingestellte Bremse
- ☐ durch eine Übersetzung, da sie schnelles Einholen der Schnur ermöglicht
- ☐ durch die Rücklaufperre, da sie ein versehentliches Schnurgeben unmöglich macht

140 Wann soll die Tragkraft der Angelschnur durch eine Knotenprobe geprüft werden?

- ☒ vor jedem Angeln
- ☐ nach einem Jahr
- ☐ niemals

1.108 Warum kann man kleine Stationärrollen nicht zum Fang starker Fische verwenden?

- ☐ man muss beim Drill zu schnell kurbeln
- ☒ sie fassen nur eine geringe Menge der benötigten starken Angelschnur
- ☐ man kann die Schnurbremse nicht stark genug einstellen

1.109 Warum muss man ein geeignetes Maßband o.ä. beim Angeln mitführen?

- ☐ um sicherzustellen, wenn mit mehreren Angelruten gefischt werden darf, daß die Vorfachlängen gleich sind
- ☒ um festzustellen, ob der gefangene Fisch das vorgeschriebene "Mindestmaß" erreicht hat
- ☐ weil bei Trophäen der Kopf mindestens 20 cm hinter den Kiemen abgeschnitten werden muss

1.110 Warum sind Rollen mit geringem Schnurfassungsvermögen für den Fang großer Raubfische ungeeignet?

- ☐ weil sie bei starker Belastung zerbrechen
- ☐ weil diese Modelle keine Schnurbremse haben
- ☒ weil solche Rollen zu wenig der benötigten starken Angelschnur aufnehmen

1.111 Warum soll beim Hechtfang ein Stahlvorfach verwendet werden?

- ☐ weil damit die Lockwirkung erhöht wird
- ☒ weil die Schnur beim Drill an den Hechtzähnen scheuern und reißen kann
- ☐ weil ein Stahlvorfach eine bessere Köderführung ermöglicht

1.700 Warum sollte die Tragkraft des Vorfaches geringer als die Tragkraft der Hauptschnur sein?

- ☒ um bei einem Hänger den Totalverlust von Angelmontage zu vermeiden
- ☐ die Aussage ist falsch! Das Vorfach muss stärker sein als die Hauptschnur
- ☐ damit sich die Haken besser anknoten lassen

Sachgebiet: Gerätekunde

1.113 Warum sollte eine Angelrute nicht über das angegebene Wurfgewicht belastet werden?

- ☐ die angestrebte Wurfweite wird nicht erreicht
- ☒ es besteht Bruchgefahr des Rutenblanks
- ☐ die Rute kommt nicht mehr in ihre Ausgangsposition zurück und verbiegt sich

1.114 Was bedeutet der Begriff "Naßfischen" beim Flugangeln?

- ☐ Wattfischen
- ☐ Fischen im Regen
- ☒ Fischen mit künstlicher Fliege unter Wasser

1.115 Was bedeutet die Hakenskala von 1 - 18?

- ☐ 18 ist der größte Haken
- ☒ 1 ist der größte Haken
- ☐ von 1- 9 ist das Hakenöhr nach oben, von 10 - 18 zur Seite gebogen

1.116 Was bedeutet waidgerechtes Angeln?

- ☐ eine spezielle Angelmethode, mit der man besonders schonend Fische fängt
- ☐ waidgerecht ist ein Begriff aus der Jägersprache und hat mit dem Angeln nichts zu tun
- ☒ das Fangen, Töten Versorgen und Verwerten der Fische in Sinne des Tierschutzgesetzes

1.119 Was gefährdet eine synthetische Angelschnur am meisten?

- ☐ die Nutzung zusammen mit zu großen Haken
- ☐ die Nutzung zusammen mit zu kleinen Haken
- ☒ defekte Schnurlaufringe, Sonne, scharfe Kanten

1.118 Was ist bei Stahlschnurlaufringen zu tun, bei denen die Schnur Rillen eingeschliffen hat?

- ☐ die Rillen sind ohne Bedeutung
- ☒ sie müssen durch neue, einwandfreie Ringe ersetzt werden
- ☐ es ist eine stärkere Schnur zu verwenden

1.120 Was ist das Besondere einer Kohlefaserrute?

- ☐ sie ist schwerer als vergleichbare Vollglasruten
- ☐ sie werden im Handel nur bis 2 m Länge angeboten
- ☒ sie ist leichter als vergleichbare Glasfaserruten

1.121 Was ist das Charakteristische einer Multirolle?

- ☒ die Schnurspule dreht sich
- ☐ die Schnurspule steht fest
- ☐ der Schnurfangbügel ist besonders groß

1.122 Was ist das Charakteristische einer Stationärrolle?

- ☒ die Schnurspule steht fest
- ☐ die Schnurspule dreht sich
- ☐ der Schnurfangbügel fehlt

1.123 Was ist der Zweck des Widerhakens?

- ☒ dient der festen Fixierung von Ködern und gehakten Fischen
- ☐ dient der Schonung von Ködern und gehakten Fischen
- ☐ dient der Stabilität des Hakens

1.124 Was ist die Besonderheit einer Schwingspitze an Angelruten?

- ☒ ein bewegliches Spitzenteil, welches kleinste Bisse durch Ausschlag in Richtung Fisch anzeigt
- ☐ ein sehr weicher, dünner Rutenkörper ohne Spitze
- ☐ eine spezielle Spitze nur zum Eisangeln

720 Was ist ein Boilie?

- ☒ ein spezieller Köder beim Karpfenangeln
- ☐ ein Bissanzeiger
- ☐ die Bremsscheibe einer Stationärrolle

Sachgebiet: Gerätekunde

430 Was ist ein Drilling?

- ☐ drei hintereinander an einer Schnur befestigte Haken
 - ☐ der Fang von drei Fischen zur gleichen Zeit
 - ☒ ein Haken mit drei Spitzen
-

265 Was ist ein Gaff?

- ☐ ein künstlicher Angelköder für Meeresfische
 - ☐ ein elektronisches Bissanzeigergerät
 - ☒ ein Landungsgerät für große Fische
-

714 Was ist ein Hakenlöser?

- ☐ eine Hakenbindemaschine
 - ☐ ein Schleifstein für Haken
 - ☒ ein Gerät zum waidgerechten Lösen von Haken
-

1.126 Was ist ein Rachensperrerr?

- ☐ ein an Sauerstoffmangel verendender Fisch
 - ☐ Toxin eines Fisches, das eine Maulsperre auslöst
 - ☒ Gerät zum Offenhalten des Maules von Raubfischen
-

153 Was ist ein sogenanntes Anti-Tangle-Blei?

- ☒ ein Wurfblei mit steifem Röhrchen, damit sich die Hakenmontage nicht verwickelt
 - ☐ das Gegengewicht an einer Multirolle
 - ☐ ein Gerät zum Betäuben von Fischen
-

1.701 Was ist ein Twister?

- ☐ spezieller Hakenknoten
 - ☒ ein Kunstköder zum Raubfischfang, der einen Wurm imitiert
 - ☐ eine Perücke in der Schnur
-

1.128 Was ist ein typisches Merkmal eines Spinners?

- ☒ das Blatt dreht sich um eine Achse
 - ☐ er taumelnde Bewegung des Köders
 - ☐ spezielle Farbeffekte
-

1.129 Was ist ein Wobbler?

- ☐ ein Gerät zum waidgerechten Töten gefangener Fische
 - ☒ ein künstlicher Köder für den Fang von Raubfischen
 - ☐ ein halbautomatisches Anfütterungsgerät für Friedfische
-

1.702 Was ist eine Freilaufrolle (sog. Baitrunnerrolle)?

- ☒ eine Stationärrolle, bei der bei geschlossenem Schnurfangbügel der Fisch bei geringem Widerstand Schnur abziehen kann
 - ☐ eine Stationärrolle ohne Schnurbremse, die durch falsche Handhabung leicht zur „Perückenbildung“ neigt
 - ☐ Eine Stationärrolle, bei der der Fisch nur bei offenem Schnurfangbügel Schnur abziehen kann
-

1.131 Was ist eine Hegene?

- ☒ es handelt sich um eine Handangel bei der von einer beschwerten Schnur drei bis fünf Seitenschnüre (Springer) abzweigen
 - ☐ es handelt sich um eine spezielle Flugangel mit Springer und Strecker
 - ☐ es handelt sich um ein Gerät zur Hege und Pflege der Fischbestandes
-

1.132 Was ist eine Senke?

- ☐ ein Gerät zur Tiefenmessung
 - ☐ ein Netz zur Aufbewahrung von Köderfischen
 - ☒ ein Netz zum Fischfang
-

1.703 Was ist mit angerauter Angelschnur zu machen?

- ☒ abschneiden und umweltgerecht entsorgen
- ☐ einfetten und wiederverwenden
- ☐ in die Sonne legen und anschließend wiederverwenden

Sachgebiet: Gerätekunde

1.704 Was muss vor dem Angeln am Gerät überprüft werden?

- ☒ ☐ die Schnurführungsringe auf Risse, die Schnur auf Tragfähigkeit und die Rolle auf Bremszug
 - ☐ die Fischwaage und die Entfettung der Rolle
 - ☐ die Menge des Ködermaterials und die Qualität desselben
-

427 Was sind AFTMA-Klassen?

- ☐ Einteilung der Spinnangelköder nach Gewicht
 - ☐ neue Wurfgewichte bei Ruten
 - ☒ Einteilung der Flugschnüre in die Gewichtsklassen 0-15 für die ersten 10 Yards (9,14 m)
-

1.134 Was sind Flugschnüre?

- ☐ besonders leichte Schnüre, bei der der Köder weit fliegt
 - ☒ schwere Schnüre, sie stellen das eigentliche Wurfgewicht dar
 - ☐ Schnüre zum Meeresangeln auf fliegende Fische
-

1.135 Was unternimmt man, wenn der Fisch den Angelhaken zu tief geschluckt hat?

- ☐ der Haken wird unter Kraftaufwendung aus dem Fisch entfernt
 - ☒ ist der Fisch maßig und nicht geschont, sofort waidgerecht töten
 - ☐ der Haken wird im Fischkörper belassen, bis der Fisch erstickt ist
-

1.136 Was versteht man bei Angelrollen mit aufgezogener Schnur unter einer "Perücke"?

- ☐ die beim Fliegenfischen noch nicht ganz gestreckte Schnur
 - ☒ ein verdrehen der Schnur beim Wurf (Verhedderung)
 - ☐ eine Schutzkappe für die Rolle vor Witterungseinflüssen
-

1.137 Was versteht man bei einer Angelrute unter Aktion?

- ☐ das Gesamtgewicht einer Rute
 - ☒ die Art der Durchbiegung bei Belastung
 - ☐ den mittleren Durchmesser einer Rute
-

1.625 Was versteht man im Zusammenhang mit dem Spinnfischen unter dem Begriff Jiggen?

- ☒ eine besondere Form der Führung eines Gummiköders
 - ☐ die ausschließliche Verwendung von Naturködern
 - ☐ eine oberflächennahe Angelvariante in besonders unzugänglichen Gewässerbereichen
-

233 Was versteht man unter "Wattfischen"?

- ☐ das Fischen im Moorwasser
 - ☐ das Fischen im Wattenmeer
 - ☒ das Fischen im Wasser stehend oder im Wasser gehend.
-

161 Was versteht man unter einem Vorfach beim Angeln und welche Stärke sollte dieses in der Regel haben?

- ☒ das am Angelhaken angebundene Schnurende, das dünner als die Hauptschnur sein sollte
 - ☐ das am Angelhaken angebundene Schnurende, das dicker als die Hauptschnur sein sollte
 - ☐ Ein Vorfach wird beim Angeln nie verwendet.
-

1.138 Was will man mit einem Schwimmer (Pose) hauptsächlich erreichen?

- ☐ einen möglichst weiten, gezielten Wurf
 - ☒ Angebot des Köders in der richtigen Tiefe und Anzeige des Bisses
 - ☐ das Aufliegen der Schnur auf der Wasseroberfläche
-

143 Was wird als Laufblei bezeichnet?

- ☐ ein spezielles Blei zur Tiefenmessung
 - ☐ ein Vorlaufblei vor einem künstlichen Köder
 - ☒ ein Blei mit einer durchgehenden Bohrung
-

424 Welche allgemeine Regel gilt bei der Zusammenstellung: Haken-Schnur-Rute?

- ☒ großer Haken, starke Schnur, steife Rutenspitze / kleiner Haken, dünne Schnur, weiche Rutenspitze
- ☐ großer Haken, dünne Schnur und steife Rute
- ☐ kleiner Haken, starke Schnur und weiche Rute

Sachgebiet: Gerätekunde

1.705 Welche Angelrute passt zu Schnüren mit 0,12 - 0,15 mm Durchmesser?

- ☐ eine möglichst lange und steife Rute
- ☐ eine möglichst kurze und weiche Rute
- ☒ eine lange und weiche Rute mit weicher Spitze

1.147 Welche Art von Fischen werden beangelt, wenn Stahlvorfächer eingesetzt werden?

- ☐ Plattfische
- ☐ Friedfische
- ☒ Raubfische

1.140 Welche Aufgaben haben Wirbel?

- ☐ sie erleichtern das Anbringen von Spinnern
- ☐ sie verhindern einen Schnurbruch
- ☒ sie verhindern das Verdrehen der Schnur

1.141 Welche Beziehung besteht zwischen Schnurdurchmesser und Tragkraft?

- ☒ je dicker die Schnur, desto höher ist die Tragkraft
- ☐ je dicker die Schnur, desto geringer ist die Tragkraft
- ☐ die Tragkraft ist unabhängig von der Schnurstärke

1.142 Welche der aufgeführten Angelgeräte sind für den Angler erlaubt?

- ☒ mehrteilige Wobbler
- ☐ Reißangel mit mehreren Drillingen
- ☐ Netze und Reusen

1.143 Welche der aufgeführten Fanggeräte sind für Angler in Sachsen erlaubt?

- ☒ eine Spinnrute
- ☐ eine Reihenangel
- ☐ Köderfischangel mit lebendem Köderfisch

1.144 Welche Eigenschaften sollte eine Angelrute haben?

- ☐ sie sollte einen möglichst langen Griff haben
- ☐ sie sollte eine möglichst weiche Spitzenaktion haben
- ☒ man sollte mit ihr gut werfen und die Fische sicher landen können

1.145 Welche Fanghilfsgeräte sind beim Angeln immer mitzuführen?

- ☐ Setzescher, Rutenhalter, Ersatzhaken, Schlagstock zur Betäubung, Bandmaß
- ☐ Fischwaage, Ködermaterial, Sitzgelegenheit, Messer, Hakenlöser
- ☒ Kescher, Hakenlöser, Schlagstock zur Betäubung, Messer und Bandmaß

893 Welche Fangmethode ist grundsätzlich verboten?

- ☐ das Angeln mit sogenannten Blinkern
- ☒ das Angeln mit künstlichem Licht
- ☐ das Angeln ohne Bißanzeiger

441 Welche Fischart kann man in der Regel mit dem Spinnköder fangen?

- ☒ Hecht
- ☐ Karpfen
- ☐ Blei

1.146 Welche Fischarten fängt man normalerweise mit Spinnködern?

- ☒ Zander und Flussbarsch
- ☐ Schleie und Karpfen
- ☐ Nase und Hasel

443 Welche Fische werden am zweckmäßigsten mit dem Gaff gelandet?

- ☒ sehr große Fische, für die der Kescher zu klein ist und welche nicht der Schonzeit unterliegen.
- ☐ Salmoniden gleich welcher Größe
- ☐ nur Welse und Hechte mit mehr als 10 kg Gewicht

Sachgebiet: Gerätekunde

90 Welche Form haben Fliegenvorfächer?

- ☐ parallel
- ☒ einseitig verjüngt
- ☐ doppelt verjüngt

1.148 Welche Funktion übernimmt die Rücklaufsperre einer Rolle?

- ☒ sie verhindert ein unbeabsichtigtes Rückwärtslaufen der Spule
- ☐ sie verhindert ein Zerreißen der Schnur beim Drill
- ☐ sie verhindert eine Überbeanspruchung der Schnur

1.149 Welche Funktion übernimmt die Spulenbremse einer Stationärrolle?

- ☐ sie soll ein verdrehen der Schnur beim Auswerfen vermeiden
- ☒ sie soll eine Überbeanspruchung der Schnur beim Drill vermeiden
- ☐ sie soll verhindern, dass über eine gewisse Weite hinaus ausgeworfen werden kann

227 Welche Gerätezusammenstellung ist richtig und fischgerecht?

- ☐ steife Rute, dünne Schnur, großer Haken
- ☐ weiche Rute, starke Schnur, möglichst kleiner Haken
- ☒ steife Rute, starke Schnur, großer Haken

1.150 Welche Haken sind beim Angeln auf Friedfische fischgerecht?

- ☐ Zwillingshaken
- ☒ Einfachhaken
- ☐ Drillingshaken

1.107 Welche Haken sollten beim Friedfischangeln, im Sinne einer waidgerechten Angelei nicht genutzt werden?

- ☐ Wurmhaken
- ☐ Einzelhaken
- ☒ Zwillingss- oder Drillingshaken

667 Welche Hakengröße ist die kleinste?

- ☐ Hakengröße: 1
- ☐ Hakengröße: 4
- ☒ Hakengröße: 10

1.151 Welche Länge hat heute in der Regel die zweihändige Wurfrute (Spinnrute) ?

- ☐ 1,50 - 2,00 m
- ☒ 2,40 - 3,00 m
- ☐ 3,50 - 5,00 m

1.156 Welche Länge und Stärke monofiler Schnur sollte eine Stationärrolle für den Fang größerer Hechte aufnehmen können?

- ☒ ca. 100m der Stärke 0,40 bis 0,45 mm Durchmesser
- ☐ ca. 100m der Stärke 0,60 bis 0,70 mm Durchmesser
- ☐ ca. 100m der Stärke 0,20 bis 0,30 mm Durchmesser

1.152 Welche Methoden sind beim Fischen auf Rapfen recht fängig?

- ☐ das Grundfischen mit halbgaren Kartoffeln
- ☒ das Spinnfischen mit schlanken, mittleren Blinkern
- ☐ das Grundfischen mit Weichkäse

1.157 Welche monofile Schnurstärke soll man beim Aalfang mindestens verwenden?

- ☐ 0,15 - 0,20 mm Durchmesser
- ☒ 0,35 - 0,40 mm Durchmesser
- ☐ 0,60 - 0,70 mm Durchmesser

1.153 Welche Nachteile hat eine Steckrute gegenüber einer Teleskoprute?

- ☒ sie hat eine ungünstigere Transportlänge
- ☐ sie hat ein geringeres Wurfgewicht gegenüber einer vergleichbaren Teleskoprute
- ☐ sie hat bei gleicher Länge und Aktion einen Rutenblank mit größerem Durchmesser

Sachgebiet: Gerätekunde

1.155 Welche Rollen verwendet man vorzugsweise bei 0,15 bis 0,20 mm starken Schnüren?

- ☐ Multirollen
- ☒ kleine Stationärrollen
- ☐ mittelgroße Stationärrollen

211 Welche Rutenlängen sind bei Grundruten üblich?

- ☐ ca. 1,50m - 2,00m
- ☒ ca. 3,00m - 6,00m
- ☐ ca. 7,50m - 12,00m

1.158 Welche Spinnköder haben feste oder verstellbare Tauchschaufeln?

- ☐ Heintzblinker
- ☒ ein- und mehrteilige Wobbler
- ☐ Kugelspinner

266 Welche verschiedenen Hakenformen gibt es zum Anbinden beim Einzelhaken?

- ☒ Plättchen- und Öhrhaken
- ☐ dick- und dünnschenklig Haken
- ☐ Flach- und Rundstahlhaken

1.706 Welche wesentliche Aufgabe hat bei der Spinnangelei ein vorgeschalteter Wirbel?

- ☒ er verhindert ein Verdrillen der Schnur
- ☐ er hat das Wasser mit Sauerstoff anzureichern
- ☐ er erhöht den Anreiz zum Anbiss für den Raubfisch

1.161 Welche wesentlichen Aufgaben haben die Schnurlaufringe der Angelrute?

- ☐ sie ermöglichen einen weiten Wurf
- ☐ sie streifen Verunreinigungen und Schmutz von der Schnur ab
- ☒ Sie verteilen bei Wurf und Drill die Belastung gleichmäßig auf den Rutenblank

1.162 Welchen Einfluß haben Knoten auf die Reißfestigkeit der Schnur?

- ☐ sie haben keinen Einfluß
- ☐ sie sind besonders reißfest
- ☒ sie vermindern die Reißfestigkeit

665 Welchen Teil der Angelschnur bezeichnet der Angler als Hauptschnur?

- ☒ die Schnur auf der Rolle bis zum Vorfach
- ☐ die Schnur vom Hakenschenkel bis zum ersten Knoten
- ☐ eine neue oder noch unbenutzte Schnur

212 Welcher Angelrollentyp ist in Deutschland der meist verwendete?

- ☐ einfache Metallrolle mit sich drehender Trommel
- ☐ Multirolle (Metallrolle mit Übersetzung)
- ☒ Stationärrolle mit sich nicht drehender Schnurtrommel

92 Welcher Einfachhaken ist am größten?

- ☒ Hakengröße 1
- ☐ Hakengröße 2
- ☐ Hakengröße 3

1.163 Welcher Grundsatz gilt beim Angeln mit der Pose?

- ☒ gute Sichtbarkeit, so schlank wie möglich und so wenig wie möglich aus dem Wasser schauend
- ☐ die Größe der Pose richtet sich nach der Größe der Fische, große Fische große Pose
- ☐ beim Angeln mit Pose gibt es keine Grundsätze zu beachten

1.164 Welcher Grundsatz soll die Wahl des Angelhakens bestimmen?

- ☐ sehr klein, damit er recht unauffällig ist
- ☐ die Angelhakengröße kann nach Belieben gewählt werden
- ☒ die Gewährleistung eines waidgerechten und schonenden Fischfanges

Sachgebiet: Gerätekunde

1.165 Welcher Knoten ist zum Verbinden monofiler Angelschnüre geeignet?

- ☐ der Mastwurf
- ☐ der Turleknoten
- ☒ der Blutknoten

89 Welcher natürliche Köder ist besonders erfolgversprechend, wenn Sie große Aale fangen wollen?

- ☒ toter Köderfisch
- ☐ gekochte Kartoffel
- ☐ Fliegenmaden

1.166 Welcher Schnurring einer Rute ist am stärksten belastet?

- ☒ der Spitzenring
- ☐ der erste Ring nach der Rolle
- ☐ alle Ringe werden gleichmäßig stark belastet

613 Welcher Spinnköder hat eine Tauchschaufel?

- ☐ Löffelbinker
- ☒ Wobbler
- ☐ Twister

1.624 Welcher Spinnköder ist seit über 100 Jahren noch immer im Gebrauch?

- ☐ der große und der kleine Devonspinner
- ☒ der Heintzbinker
- ☐ der Leder-und Gummizopf

715 Welches Gerät eignet sich besonders zum waidgerechten Entfernen eines Angelhakens?

- ☒ ein spezieller Hakenlöser
- ☐ eine Rachensperre
- ☐ ein kleiner Stock

716 Welches Gerät schützt beim Entfernen des Hakens vor Verletzungen durch Raubfischzähne?

- ☐ der Haken selbst
- ☐ ein Messer
- ☒ ein sogenannter Rachensperrerr

12 Welches Gerät sollte der Angler zum Betäuben und Töten der gefangenen Fische bei sich führen?

- ☐ ein Gaff und ein Stichgerät
- ☒ ein Schlaginstrument zum Betäuben und ein Messer zum waidgerechten Töten
- ☐ eine Fischgabel und eine Ködernadel

781 Welches Hilfsgerät eignet sich nicht zum "Landen" eines Fisches?

- ☒ ein Setzkescher
- ☐ ein Gaff
- ☐ ein Unterfangkescher

244 Welches ist ein Merkmal geflochtener Schnüre?

- ☒ hohe Tragkraft bei geringem Durchmesser
- ☐ hohe Dehnung bei hoher Tragkraft
- ☐ reißt schnell, da die Fäden sehr dünn sind

774 Welches Kriterium ist beim Kauf von Angelschnüren am wichtigsten?

- ☐ die Farbnummer
- ☒ die lineare Tragkraft
- ☐ der Hersteller

1.774 Welches Mindestmaß gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?

- ☒ 50 cm und geschont vom 1. Februar bis 30. April
- ☐ 45 cm und geschont vom 1. Februar bis 31. Mai
- ☐ 55 cm und geschont vom 1. Februar bis 30. Juni

Sachgebiet: Gerätekunde

204 Welches sind die beherrschenden Grundsätze bei der Wahl des Angelgerätes und der Angelmethoden?

- ☐ die Verbesserung der Angelgeräte
- ☒ die Forderungen des Tier- und Naturschutzes
- ☐ die Weiterentwicklung der Angelmethoden

1.168 Welches Zubehör gehört unbedingt zu jedem Angelausflug?

- ☒ gültiger Fischereischein und Angelerlaubnis, geeignetes Maßband, Hakenlöser, Fischtöter
- ☐ Angelerlaubnis, Hakenlöser, Messer, wetterfeste Kleidung
- ☐ gültiger Fischereischein, Waage, Maßband, Fischtöter, Hakenlöser, Telefon

439 Weshalb wird bei den meisten Angelruten das Wurfgewicht angegeben?

- ☒ um die Rute beim Wurf nicht zu überlasten
- ☐ um die Wurfweite besser abschätzen zu können
- ☐ um keine Transportprobleme zu bekommen

442 Wie groß sollte ein Kescher sein?

- ☒ besser zu groß als zu klein
- ☐ so klein wie möglich
- ☐ nur beim Karpfenfischen groß

1.170 Wie ist beim Drill das Abkommen eines Fisches zu vermeiden?

- ☐ die Schnur locker und durchhängend halten
- ☒ die Schnur in ständiger Spannung zum Fisch halten
- ☐ die Schnurbremse stark anziehen und den Fisch schnellstens zum Gaff oder Kescher führen

396 Wie kann man die Haltbarkeit eines Schnurknotens erhöhen?

- ☒ durch mehrfache Windungen der beiden Schnurenden
- ☐ durch maschinelles Binden
- ☐ durch einen Wachsüberzug

702 Wie lang ist eine normale Einhand-Spinnrute?

- ☒ 1,5 - 2,1m
- ☐ 2,4 - 2,8m
- ☐ 3 - 5m

1.171 Wie lang soll ein gehakter Fisch gedrillt werden?

- ☒ nicht länger als nötig, um ihn schonend zu landen
- ☐ möglichst lange, damit der Fisch entkräftet ist und sich ohne Probleme landen lässt
- ☐ maximal 15 Minuten

144 Wie lang soll ein Stahlvorfach beim Raubfischangeln mit Köderfisch sein?

- ☐ höchstens 5 cm
- ☐ mindestens 60 cm
- ☒ mindestens 30 cm

1.172 Wie schützt man sich vor dem Durchbeißen der Schnur durch den Hecht?

- ☐ man verwendet eine 0,60 mm starke monofile Schnur
- ☒ man verwendet ein Stahlvorfach
- ☐ man hält die Schnur unter Spannung und landet den Fisch vorsichtig

1.173 Wie soll ein Schnurknoten beschaffen sein?

- ☐ möglichst groß um die maximale Tragkraft zu gewährleisten
- ☒ er darf sich nicht aufziehen lassen und die Tragkraft der Schnur nicht schwächen
- ☐ möglichst klein und wenig auffallend

612 Wie sollte ein Angelknoten beschaffen sein?

- ☐ leicht lösbar
- ☐ möglichst groß
- ☒ möglichst klein und von hoher Tragkraft

Sachgebiet: Gerätekunde

216 Wie stark darf die Schnurbremse der Stationärrolle angezogen werden?

- ☐ so stark, dass der Fisch keine Schnur abziehen kann
 - ☒ nur so stark, dass die Reißfestigkeit der Schnur nicht überschritten wird
 - ☐ etwas stärker als die Reißfestigkeit der Schnur
-

1.174 Wie verhält sich die Tragkraft des Schnurknotens zur Tragkraft der Schnur?

- ☐ die Tragkraft am Knoten ändert sich nicht
 - ☒ die Tragkraft ist am Knoten geringer
 - ☐ die Tragkraft ist am Knoten größer
-

414 Wie werden Fische betäubt?

- ☐ durch Werfen auf den Boden
 - ☐ durch Schlag aufs Herz
 - ☒ durch einen kräftigen Schlag auf die Schädeldecke (Gehirn)
-

402 Wie wird der gefangene und zum Mitnehmen bestimmte Fisch gemessen?

- ☐ nach Augenmaß oder mit der Handspanne von Daumen bis zum kleinen Finger
 - ☒ mit einem geeignetem Bandmaß von Kopfspitze bis zum Schwanzflossenende
 - ☐ Das Messen ist nicht erforderlich, da einmal gehakte Fische nicht zurückgesetzt werden brauchen.
-

538 Wie wird die Bremse der Angelrolle eingestellt?

- ☐ so, daß ein großer Fisch keine Schnur nehmen kann
 - ☒ so, daß bei stärkerem Zug des Fisches Schnur gegeben wird
 - ☐ so, daß ein Fisch immer Schnur nehmen kann
-

437 Wie wird die senkrechte Stellung des Schwimmers im Wasser erreicht?

- ☐ durch Zwischenschalten eines Wirbels
 - ☐ durch das auf Grund liegen des Köders
 - ☒ durch eine auf die Tragkraft des Schwimmers abgestimmte Bleibescherung
-

542 Wo ist kein Wirbel nötig?

- ☐ beim Spinnfischen
 - ☒ beim Fliegenfischen
 - ☐ beim Schleppfischen
-

1.175 Wo nutzt sich die Angelschnur am stärksten ab ?

- ☐ es erfolgt eine gleichmäßige Abnutzung
 - ☐ es erfolgt keine Abnutzung
 - ☒ auf den ersten Metern hinter dem Haken
-

142 Wodurch entsteht hauptsächlich Schnurdrall?

- ☐ durch ständiges Werfen
 - ☐ nur durch Stationärrollen
 - ☒ durch stark wirbelnde Köder
-

139 Wodurch unterscheidet sich der Rutengriff einer Spinnrute von dem einer Fliegenrute?

- ☐ durch eine zusätzliche Ausbuchtung für den Daumen
 - ☐ durch unterschiedliche Längen
 - ☒ durch die Anbringung des Rollenhalters vor oder hinter der Wurfhand
-

1.176 Wodurch unterscheidet sich der Spinner von einem Blinker?

- ☐ der Spinner ist leichter als ein Blinker
 - ☒ das Blatt des Spinners läuft um eine Achse
 - ☐ der Spinner ist farbiger als ein Blinker
-

1.707 Wodurch unterscheidet sich der Wurmhaken von anderen Einzelhaken ?

- ☒ er besitzt zusätzlich am Schaft weitere Widerhaken
- ☐ er besitzt einen größeren Hakenbogen als andere Haken
- ☐ der Widerhaken der Hakenspitze zeigt nach außen

Sachgebiet: Gerätekunde

137 Wodurch unterscheidet sich die Stationärrolle von der Multirolle?

- ☐ durch ihr Gewicht
 - ☒ durch die Anordnung der Rollennachse
 - ☐ durch größeres Schnurfassungsvermögen
-

1.098 Wofür eignet sich die Stationärrolle besonders gut?

- ☐ sie eignet sich gleich gut für alle Fangmethoden
 - ☐ für das Fliegenfischen
 - ☒ für die leichte und mittlere Spinnfischerei und für das Grundangeln
-

419 Wonach hat sich die Bremseinstellung an der Rolle zu richten?

- ☐ nach der Schwere des zu erwartenden Fisches
 - ☐ nach der Größe der Rollenspule
 - ☒ nach der Tragfähigkeit der Schnur
-

36 Wonach richtet sich hauptsächlich die Länge der Angelrute?

- ☒ nach der Beschaffenheit des Ufers und der Fangmethode
 - ☐ nach der Tiefe des Gewässers
 - ☐ nach der Größe des Gewässers
-

1.178 Worauf ist beim Angeln mit einer Kohlefaserrute zu achten?

- ☒ auf elektrische Leitungen; bei Gewitter ist das Angeln damit einzustellen
 - ☐ durch die leichte Bauweise, sind Kohlefaserruten nur fürs Stippfischen geeignet
 - ☐ die Rute sollte nicht über längeren Zeitraum mit Wasser in Berührung kommen
-

1.180 Worauf muß während des Drills geachtet werden?

- ☒ durch stete Spannung der Schnur ist Fühlung mit dem Fisch zu halten
 - ☐ die Schnur ist möglichst locker zu führen, damit der Fisch nicht ausschlitzt
 - ☐ der Fisch ist so schnell wie möglich zu landen
-

1.181 Worauf soll man beim Knotenbinden achten?

- ☐ einfache Knoten mit wenig Windungen
 - ☒ für den Zweck entsprechende Knoten mit vielen Windungen
 - ☐ die Knoten sind alle gleich gut
-

706 Worauf sollte bei der Wahl einer Angelschnur besonders geachtet werden?

- ☐ auf die Länge der eingesetzten Rute
 - ☒ auf Durchmesser und Tragfähigkeit
 - ☐ auf die Verpackung
-

708 Wovon hängt in erster Linie die zu verwendende Schnurstärke ab?

- ☐ vom Vorfach
 - ☐ vom Blei
 - ☒ vom Fisch und Gewässer
-

1.182 Wozu dient die Pose?

- ☒ sie zeigt den Biß an
 - ☐ sie ist ein guter Köder
 - ☐ sie verhindert Schnurverdrehungen
-

1.183 Wozu dient die Schwingspitze?

- ☐ um plötzliches Flüchten des Fisches im Drill abzufedern
 - ☐ die Schwingspitze ermöglicht besonders weite Würfe
 - ☒ die Schwingspitze dient als Bissanzeiger
-

425 Wozu dient ein Gaff?

- ☐ um untermaßige Fische schonend zu landen
 - ☐ zum Landen von Fischen, die mitgenommen werden sollen
 - ☒ zum sicheren Landen von kapitalen Fischen, für die ein Kescher zu klein ist
-

Sachgebiet: Gerätekunde

411 Zum Fang welcher Fische verwendet man die Spinnangel?

- ☐ Blei, Plötze
 - ☒ Zander, Rapfen
 - ☐ Karpfen, Barben
-

1.185 Zusatzspitzen für Grundruten in Form von Zitter-oder Schwingspitzen haben folgende Funktion?

- ☐ sie verbessern die Rutenaktion
- ☒ sie dienen als Bissanzeiger
- ☐ sie dienen zur schonenderen Führung der Angelschnur

Vorbereitungslehrgang

Sachgebiet: Gesetzeskunde

1.454 Besteht in Sachsen zur Ausübung des Fischfangs grundsätzlich eine Fischereischeinpflcht?

- ☐ nein, nur Berufsfischer benötigen einen Fischereischein
- ☒ ja, der Fischereischein ist gemäß § 20 SächsFischG erforderlich
- ☐ nein, nur Angler benötigen einen Fischereischein

1.455 Bezieht sich das Tierschutzgesetz auch auf Fische?

- ☐ nein, es bezieht sich nur auf Säugetiere, denen nicht ohne vernünftigen Grund Schmerz, Leid oder Schäden zugefügt werden darf
- ☐ nein, im Wasser lebende Organismen sind davon nicht betroffen, sie werden vom Wasserhaushaltsgesetz erfasst
- ☒ ja, auch Fischen darf nicht ohne vernünftigen Grund Schmerz, Leid oder Schäden zugefügt werden

1.456 Darf der Angelfischer an das Gewässer angrenzende Schifffahrtsanlagen sowie Brücken, Wehre, Schleusen und sonstige Wasserbauwerke zum Fischfang betreten und benutzen?

- ☒ ja, soweit öffentlich-rechtliche Vorschriften dem nicht entgegenstehen
- ☐ nein, nach dem sächsischen Fischereigesetz gelten sie als fremde Grundstücke
- ☐ ja, auch wenn er nicht den Fischfang ausüben will

1.457 Darf der Angler zum Fischfang lebende Köderfische verwenden?

- ☒ nein, das schließt das sächsische Fischereigesetz aus
- ☐ ja, wenn der Köderfisch minderwertig ist
- ☐ ja, wenn der Köderfisch nicht gesetzlich geschützt ist

911 Darf ein Fischer auf Grund des Fischereirechts dem Gewässer Lurche entnehmen?

- ☐ ja
- ☒ nein
- ☐ nur in vereinseigenen Gewässern

1.459 Darf ein staatlicher Fischereiaufseher widerrechtlich gefangene Fische sicherstellen?

- ☒ ja, er ist dazu laut Fischereigesetz befugt
- ☐ nein, er ist kein Polizeibediensteter
- ☐ nur wenn er in Begleitung eines Polizeibediensteten ist

1.460 Darf ein Teichbesitzer oder Teichpächter einem Angler den Fischfang mit der Handangel erlauben, wenn dieser keinen gültigen Fischereischein besitzt?

- ☒ nein, außer er hat eine bewirtschaftete Anlage bei der Fischereibehörde angemeldet
- ☐ ja, wenn es sich um ein künstliches Gewässer handelt
- ☐ ja, wenn er sich verpflichtet einen Lehrgang mit Prüfung zu absolvieren

1.462 Darf ich als Angelfischer in jedem Gewässer mit der Hegene fischen?

- ☒ nein, es muss ein Gewässer mit nachgewiesenem Coregonenvorkommen sein und die Schonzeit ist zu beachten
- ☐ ja, ich kann mit der Hegene in jedem Gewässer fischen
- ☐ ja, das Gewässer muss mindestens einen Hektar groß und drei Meter tief sein

1.464 Darf ich als Angelfischer mit der Hegene fischen, wenn ich gleichzeitig noch eine Rute mit waidgerecht getötetem Köderfisch ausgelegt habe?

- ☐ ja, nach der Fischereiverordnung darf ich in Sachsen gleichzeitig mit zwei Ruten fischen
- ☒ nein
- ☐ ja, denn die Köderfischrute kann ich im Rutenständer ablegen

1.461 Darf ich als Angler in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember mit der Hegene Coregonen fischen?

- ☐ ja, Coregonen haben dann keine Schonzeit
- ☐ ja, aber nur in festgelegten Gewässern mit nachgewiesenem Coregonenvorkommen
- ☒ nein

1.463 Darf ich als Angler in Sachsen eine Legangel benutzen?

- ☐ ja, die Legangel gleicht der Hegene
- ☒ nein
- ☐ ja, es dürfen aber nur höchstens fünf Anbissstellen vorhanden sein

1.465 Darf ich beim Wechsel von einem Gewässer zu einem anderen gebrauchsfertiges Angelgerät mit mir führen?

- ☐ ja, ohne Einschränkung
- ☐ nein, es ist generell verboten gebrauchsfertiges Angelgerät mit sich zu führen
- ☒ nur wenn für beide Gewässer Angelerlaubnisscheine vorhanden sind

Sachgebiet: Gesetzeskunde

1.685 Darf ich in einem Fließgewässer eine Vorrichtung anbringen, die die natürliche Durchgängigkeit des Gewässers für Fische unterbricht?

- ☐ ja, zur Gartenbewässerung ist es möglich
- ☒ nein, ich darf die Fischdurchgängigkeit nicht unterbrechen
- ☐ ja, denn ich habe einen Fischereischein und Erlaubnisschein, um das Gewässer beangeln zu können

1.466 Darf ich ohne Erlaubnisschein einem Gewässer Fischnährtiere entnehmen?

- ☐ ja
- ☒ nein
- ☐ ja, sofern ein gültiger Fischereischein vorhanden ist

1.467 Darf in Sachsen die Elektrofischerei von jedermann ausgeübt werden ?

- ☐ nein, sie darf nur vom Fischereiberechtigten im eigenen Gewässer ausgeübt werden
- ☒ nein, ausschließlich von Personen die einen Elektrofischereischein, einschließlich der nötigen Genehmigungen und Unterlagen besitzen
- ☐ ja, wenn ein Fischereierlaubnisschein für das zu befischende Gewässer vorliegt, einschließlich der Genehmigung der örtlichen Gemeindeverwaltung

1.468 Darf in Sachsen die Schleppangel-Fischerei mit einem Segelboot betrieben werden?

- ☐ nein
- ☒ ja, wenn eine Genehmigung der Fischereibehörde vorliegt
- ☐ ja, aber nicht während einer Regatta

1.469 Darf jeder Angler zur Bestandsregulierung mit dem Elektrofangerät fischen?

- ☐ ja, Angler dürfen bei Vorliegen eines gültigen Fischereischeins und einer amtlichen Genehmigung mit dem Elektrofangerät fischen
- ☒ nein, ausschließlich von Personen, die einen Elektrofischereischein, einschließlich der nötigen Genehmigungen und Unterlagen besitzen
- ☐ Elektrofischen zur Bestandsregulierung ist immer verboten

1.470 Darf man an einem Gewässer, in dem man nicht fischereiausübungsberechtigt ist, gebrauchsfertige Fischereigeräte mit sich führen ?

- ☐ ja, ohne Einschränkung
- ☒ ja, aber nur im verpackten, d.h. nicht einsatzfähigen Zustand
- ☐ nein, es dürfen generell keine gebrauchsfertigen Angeln transportiert werden

916 Darf sich der Angler durch eine Person, die keinen gültigen Fischereischein und Erlaubnisschein besitzt, durch vorübergehendes Halten der Angelrute, helfen lassen ?

- ☐ ja
- ☒ nein
- ☐ ja, wenn diese Person über 21 Jahre alt ist

1.471 Darf sich der Angler von einer Person, die für dieses Gewässer keinen gültigen Erlaubnisschein besitzt, durch Halten des Angelgeräts helfen lassen?

- ☐ ja, jede Person darf ihm behilflich sein
- ☒ nein, der berechnigte Angler muß die Angelfischerei selbst ausüben
- ☐ ja, aber nur, wenn die Person ein direktes Familienmitglied ist

1.686 Darf sich der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte überfluteter Grundstücke auf diesen Grundstücken Fische aneignen?

- ☐ nein, Hochwasserereignisse rechtfertigen keine Aneignung von Fischen auf privaten Grundstücken
- ☒ ja, sobald das Wasser auf dem überfluteten Grundstück länger als acht Tage mit dem Fluss nicht mehr in Verbindung steht
- ☐ ja, aber nur mit Genehmigung der örtlichen Ordnungsbehörde

1.776 Der hier abgebildete Fisch hat 6 Barteln an der Oberlippe und die Färbung ist marmoriert. Was hat dieser Fisch für eine Schonzeit laut SächsFischVO?

- ☒ ganzjährig geschont
- ☐ keine Schonzeit
- ☐ 15. April bis 30. Juni

1.777 Der hier abgebildete Fisch hat 6 kurze Barteln an der Oberlippe. Was hat dieser Fisch für eine Schonzeit laut SächsFischVO?

- ☐ keine Schonzeit
- ☒ ganzjährig geschont
- ☐ 1. Februar bis 30. Juni

Sachgebiet: Gesetzeskunde

1.745 Der hier abgebildete Fisch hat laut § 2 (1) Nr. 21 SächsFischVO in der Elbe ein Mindestmaß von 40 cm. Welche Schonzeit ist zu beachten?

- ☒ 1. Januar bis 31. März
☒ 1. Januar bis 15. Juni
☐ 1. Februar bis 30. Juni

1.746 Der hier abgebildete Fisch hat laut § 2 (1) Nr. 25 SächsFischVO in der Elbe, der Vereinigten Mulde und der Weißen Elster ein Mindestmaß von 30 cm. Welche Schonzeit ist zu beachten?

- ☒ 1. Januar bis 31. März
☐ 1. Januar bis 31. Mai
☐ 1. Januar bis 15. Juni

1.747 Der hier abgebildete Fisch hat laut § 2 (1) Nr. 25 SächsFischVO mit Ausnahme dreier Flüsse ganzjährig geschont. Welches Mindestmaß gilt für die Elbe, die Vereinigte Mulde und die Weiße Elster?

- ☒ 30 cm
☐ 35 cm
☐ 40 cm

1.743 Der hier abgebildete Fisch ist laut § 2 (1) Nr. 21 SächsFischVO in allen Gewässern außer der Elbe ganzjährig geschont. Welches Mindestmaß gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO an der Elbe?

- ☐ 30 cm
☐ 35 cm
☒ 40 cm

1.739 Diese abgebildete Fischart darf mit einer Hegene beangelt werden. Welche Schonzeit hat die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?

- ☒ 1. Oktober bis 31. Dezember
☐ 1. Oktober bis 30. April
☐ 1. Februar bis 30. Juni

1.473 Dürfen Angler mit Erlaubnisschein die gefangenen Fische in andere Gewässer aussetzen, um dort den Fischbestand aufzubessern?

- ☐ ja, es ist aber nur bei bestimmten Fischarten möglich
☒ nein, es ist generell nicht gestattet
☐ ja, es ist aber nur in abgeschlossenen Gewässern wie Teichen und Steinbrüchen erlaubt

1.474 Dürfen Fische durch den Fischereiausübungsberechtigten unbeschränkt ausgesetzt werden?

- ☐ ja, unter Beachtung der maximalen Besatzmenge von 25 kg pro Hektar
☐ nein, das Aussetzen von Fischen ist generell verboten
☒ nein, nur bestimmte Fischarten dürfen genehmigungsfrei und bei Beachtung des Hegezieles ausgesetzt werden

936 Dürfen ganzjährig geschonte Fische, die aus anderen Bundesländern stammen, in Sachsen ausgesetzt werden?

- ☐ nur in stehende Gewässer ohne Zu- und Abfluss
☐ ja
☒ nein

1.475 Dürfen gebietsfremde und nicht heimische Fische ohne Genehmigung der zuständigen Behörde ausgesetzt werden?

- ☐ ja, aber nur wenn entsprechender Lebensraum für die Fischart vorhanden ist
☐ nein, außer es handelt sich um unfruchtbare Fischarten, die sich nicht Vermehren können
☒ nein, grundsätzlich nicht

1.476 Dürfen genetisch veränderte Fische als Besatzmaterial verwendet werden?

- ☐ ja
☒ nein
☐ ja, wenn der Nachweis erbracht wird, dass sie sich nicht natürlich Fortpflanzen können

1.477 Dürfen Gifte und Sprengmittel zum Fischfang benutzt werden?

- ☐ ja, bei Nachweis eines entsprechenden Erlaubnisscheins
☒ nein, der Einsatz solcher Mittel ist unzulässig
☐ ja, der Einsatz solcher Mittel muß aber behördlich angemeldet werden

Sachgebiet: Gesetzeskunde

1.478 Dürfen Jugendliche, die im Besitz eines Jugendfischereischeines sind, allein angeln?

- ☐ ja
- ☒ nein, es sei denn, sie sind seit mindestens einem Jahr Mitglied in einem Anglerverein
- ☐ ja, wenn mindestens drei Jugendliche gemeinsam angeln

1.687 Dürfen Sie als Angler auch Enten oder andere Wasservögel fangen?

- ☐ ja, auf dem Wasser lebende Tiere unterliegen auch dem Fischereirecht
- ☐ nein, es sei denn es handelt sich um fischfressende Wasservögel, die dem Fischereirecht unterliegen
- ☒ nein

1.480 Dürfen Sie beim Angeln von den Angaben in ihrer Angelkarte (Fischereierlaubnisvertrag) abweichen?

- ☒ nein, ich darf nur in dem Umfang fischen, wie es mir die vertraglichen Bedingungen und Auflagen gestatten
- ☐ ja, geringfügige Abweichungen werden toleriert
- ☐ die Einschränkungen gelten nur für Angler, deren Fischereiprüfung in einem anderen Bundesland abgelegt wurde

1.481 Ein Angelgewässer befindet sich innerhalb eines eingefriedeten, fremden Grundstückes. Darf es ein Angler zum Fischen betreten?

- ☐ nein, dies ist generell untersagt
- ☒ dies ist nur mit Zustimmung des Eigentümers gestattet
- ☐ ja, das Grundstück darf ohne Einschränkungen betreten werden

1.482 Ein Weidezaun versperrt meinen Weg zum Angelplatz. Darf ich den Weidezaun übersteigen?

- ☒ ja, Viehweiden gehören nicht zu eingezäunten Hofstellen (Uferbetretungs-/Uferbenutzungsrecht)
- ☐ nein, die Viehweide ist eingezäunt und somit Bedarf der Zustimmung des Eigentümers
- ☐ nein, das Vieh auf der Weide könnte unruhig werden und ausbrechen

1.483 Für welche Grundstücke gilt das Uferbetretungsrecht des Fischereiausübungsberechtigten nicht ?

- ☐ Campingplätze
- ☐ Koppeln und Viehweiden
- ☒ zum Wohn- und Hofbereich gehörende eingefriedete Grundstücke

149 Für welche Maßnahmen im Rahmen der Hege und Pflege des Fischbestandes ist generell eine behördliche Genehmigung erforderlich?

- ☒ für die Ausübung der Elektrofischerei
- ☐ für die Reusenfischerei
- ☐ für die Stellnetzfischerei

1.484 Gelten die in den anderen Bundesländern nach bestandener Sachkundeprüfung ausgestellten Fischereischeine auch beim Besuch im Freistaat Sachsen?

- ☐ nein
- ☐ ja, aber nur aus bestimmten Bundesländern wird der Fischereischein anerkannt
- ☒ ja

1.458 Gelten für den Eigentümer oder Pächter eines Gewässers die Rechtsvorschriften hinsichtlich der Mindestmaße für sein Gewässer ?

- ☒ ja, die Bestimmungen dürfen jedoch nur strenger gefaßt werden, d.h. der Fischereiausübungsberechtigte kann das Mindestmaß erhöhen
- ☐ nein, es ist ihm freigestellt ein bestimmtes Maß festzulegen
- ☐ ja, es handelt sich um ein allgemeingültiges und unveränderliches Maß

1.585 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat Atlantischer Stör in Sachsen folgendes Mindestmaß:

- ☒ kein Mindestmaß vorhanden, da ganzjährig geschont
- ☐ 50 cm
- ☐ 60 cm

1.581 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat das Moderlieschen in Sachsen folgendes Mindestmaß:

- ☐ 10 cm
- ☐ 15 cm
- ☒ kein Mindestmaß festgelegt

Sachgebiet: Gesetzeskunde

1.550 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat der Aal in Sachsen folgende Schonzeit:

- ☒ keine
☐ 01. September - 31. März
☐ 01. Oktober - 01. Mai

1.582 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat der Aal in Sachsen folgendes Mindestmaß:

- ☐ kein Mindestmaß festgelegt
☒ 50 cm
☐ 35 cm

1.583 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat der Aland in Sachsen folgendes Mindestmaß:

- ☐ 30 cm
☐ 35 cm
☒ 20 cm

1.584 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat der Atlantische Lachs in Sachsen folgendes Mindestmaß:

- ☐ 40 cm
☐ 50 cm
☒ 60 cm

1.551 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat der Bachsaibling in Sachsen folgende Schonzeit:

- ☐ 01. September - 30. April
☐ ganzjährig geschont
☒ 01. Oktober - 30. April

1.586 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat der Bachsaibling in Sachsen folgendes Mindestmaß:

- ☐ 35 cm
☒ 28 cm
☐ 30 cm

1.709 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat der Döbel in Sachsen folgende Schonzeit:

- ☐ 01. Februar bis 30. Juni
☒ keine
☐ er ist ganzjährig geschont

1.587 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat der Döbel in Sachsen folgendes Mindestmaß:

- ☐ 35 cm
☒ kein Mindestmaß festgelegt
☐ 25 cm

1.553 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat der Hecht in Sachsen folgende Schonzeit:

- ☐ ganzjährig geschont
☒ 01. Februar bis 30. April
☐ keine

1.588 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat der Hecht in Sachsen folgendes Mindestmaß:

- ☐ kein Mindestmaß festgelegt
☒ 50 cm
☐ 60 cm

1.554 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat der Karpfen in Sachsen folgende Schonzeit:

- ☒ keine
☐ 01. April - 31. Juli
☐ 30. Juni - 30. September

1.589 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat der Karpfen in Sachsen folgendes Mindestmaß:

- ☐ 45 cm
☒ 40 cm
☐ 35 cm

Sachgebiet: Gesetzeskunde

1.555 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat der Rapfen in Sachsen folgende Schonzeit:

- ☐ keine
- ☒ 01. Januar - 31. Mai
- ☐ 01. Februar - 31. Mai

1.590 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat der Rapfen in Sachsen folgendes Mindestmaß:

- ☐ 30 cm
- ☒ 40 cm
- ☐ 50 cm

1.556 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat der Steinbeißer in Sachsen folgende Schonzeit:

- ☐ 01. Januar - 15. Juni
- ☒ ganzjährig geschont
- ☐ 01. Februar - 30. April

1.557 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat der Wels in Sachsen folgende Schonzeit:

- ☐ 30. Juni - 30. September
- ☐ 01. Februar - 30. Juni
- ☒ keine

1.591 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat der Wels in Sachsen folgendes Mindestmaß:

- ☐ 50 cm
- ☒ kein Mindestmaß festgelegt
- ☐ 80 cm

1.710 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat der Zander in Sachsen folgende Schonzeit:

- ☒ 01. Februar - 31. Mai
- ☐ 01. Dezember - 01. Mai
- ☐ ganzjährig geschont

1.711 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat der Zander in Sachsen folgendes Mindestmaß:

- ☐ kein Mindestmaß festgelegt
- ☐ 60 cm
- ☒ 50 cm

1.559 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat die Äsche in Sachsen folgende Schonzeit:

- ☒ 01. Januar - 15. Juni
- ☐ keine
- ☐ es gilt die Salmonidenschonzeit vom 01. Oktober - 30. April

1.712 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat die Äsche in Sachsen folgendes Mindestmaß:

- ☒ 35 cm
- ☐ 28 cm
- ☐ 40 cm

1.713 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat die Bachforelle in Sachsen folgende Schonzeit:

- ☒ 01. Oktober - 30. April
- ☐ keine
- ☐ 01. Juni - 30. September

1.594 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat die Bachforelle in Sachsen folgendes Mindestmaß:

- ☐ kein Mindestmaß festgelegt
- ☐ 20 cm
- ☒ 28 cm

1.561 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat die Barbe in Sachsen folgende Schonzeit:

- ☒ 15. April - 30. Juni
- ☐ 01. Juni - 30. September
- ☐ keine

Sachgebiet: Gesetzeskunde

1.595 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat die Barbe in Sachsen folgendes Mindestmaß:

- ☒ 50 cm
- ☐ 60 cm
- ☐ 45 cm

1.714 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat die Elritze in Sachsen folgende Schonzeit:

- ☒ ganzjährig geschont
- ☐ 15. April - 30. Juni
- ☐ 01. Oktober - 30. April

1.708 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat die Große Maräne in Sachsen folgende Schonzeit:

- ☐ 01. Oktober - 30. April
- ☐ ganzjährig geschont
- ☒ 01. Oktober - 31. Dezember

1.715 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat die Große Maräne in Sachsen folgendes Mindestmaß:

- ☒ 30 cm
- ☐ 35 cm
- ☐ 40 cm

1.716 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat die Karausche in Sachsen folgende Schonzeit:

- ☐ 01. September - 31. Dezember
- ☐ ganzjährig geschont
- ☒ 01. Februar - 30. Juni

1.597 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat die Karausche in Sachsen folgendes Mindestmaß:

- ☒ 15 cm
- ☐ 10 cm
- ☐ 25 cm

1.688 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat die Nase in Sachsen folgendes Mindestmaß:

- ☐ 20 cm
- ☐ kein Mindestmaß festgelegt
- ☒ 40 cm, gilt aber nur für die Elbe

1.565 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat die Quappe in Sachsen folgende Schonzeit:

- ☒ ganzjährig geschont, außer in der Elbe, der Vereinigten Mulde und in der Weißen Elster
- ☐ keine
- ☐ 30. Juni - 30. September

1.599 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat die Quappe in Sachsen folgendes Mindestmaß:

- ☐ 20 cm
- ☒ 30 cm, gilt aber nur für die Elbe, die Vereinigte Mulde und die Weiße Elster
- ☐ kein Mindestmaß festgelegt

1.717 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat die Regenbogenforelle in Sachsen folgende Schonzeit:

- ☐ 01. September - 31. März
- ☐ 01. Januar - 30. Juni
- ☒ 01. Oktober - 30. April

1.567 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat die Rotfeder in Sachsen folgende Schonzeit:

- ☐ 01. Oktober - 30. April
- ☐ 15. April - 30. Juni
- ☒ keine

1.718 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat die Rotfeder in Sachsen folgendes Mindestmaß:

- ☐ 30 cm
- ☐ kein Mindestmaß festgelegt
- ☒ 20 cm

Sachgebiet: Gesetzeskunde

1.719 Gemäß der Sächsischen Fischereiverordnung hat die Schleie in Sachsen folgende Schonzeit:

- ☒ keine
- ☐ 15. April - 30. Juni
- ☐ 01. Februar - 30. April

1.485 Gibt es in Deutschland ein einheitliches Fischereirecht?

- ☐ ja, das Fischereirecht ist in ganz Deutschland gleich
- ☒ nein, jedes Bundesland hat ein eigenes Fischereirecht
- ☐ nein, das Fischereirecht wird auf kommunaler Ebene geregelt

22 Gilt die Fischereiverordnung losgelöst vom Fischereigesetz (SächsFischG)?

- ☐ Ja, sie setzt vorrangig das Tierschutzgesetz um.
- ☐ Ja, sie ist ein eigenständiges Recht, das vom Fischereigesetz nicht berührt wird.
- ☒ Nein, sie gilt nur im Rahmen des Fischereigesetzes.

616 Haben Mindestmaße auch in bewirtschafteten Anlagen der Teichwirtschaft und der Fischzucht Gültigkeit?

- ☐ ja
- ☒ nein
- ☐ ja, aber nur in der Forellenteichwirtschaft

1.689 Hat eine rechtswidrig angelnde Person eine Ordnungswidrigkeit begangen, auch wenn er nichts gefangen hat?

- ☐ nein, erst wenn er sich eines Fisches angeeignet
- ☒ ja, das Führen fangfertiger Geräte am Gewässer ist bereits eine Ordnungswidrigkeit
- ☐ es liegt im Ermessen des Fischereiberechtigten

1.487 In welchem Zeitraum sind Abschluss, Änderungen, Kündigungen und Erlöschen eines Fischereipachtvertrages der Fischereibehörde schriftlich anzuzeigen ?

- ☐ eine Anzeige ist nicht erforderlich
- ☐ die Anzeige hat innerhalb von zwei Monaten zu erfolgen
- ☒ die Anzeige muß unverzüglich erfolgen

1.488 In welchen Fällen wird zur Ausübung der Fischerei ein Erlaubnisschein (Angelberechtigung) erforderlich?

- ☒ wenn der Ausübende nicht selbst Fischereiausübungsberechtigter oder Fischereipächter ist
- ☐ wenn während der Schonzeit gefischt werden soll
- ☐ wenn der Ausübende keine Fischereiprüfung abgelegt hat

1.489 In welcher Rechtsvorschrift sind die geschonten Fischarten bzw. die bei Fischen zu berücksichtigenden Schonzeiten und Mindestmaße festgelegt:

- ☐ Sächsisches Fischereigesetz
- ☒ Sächsische Fischereiverordnung
- ☐ Sächsisches Naturschutzgesetz

1.490 Ist das Aussetzen nicht heimischer Fischarten z.B. aus einem Aquarium oder Gartenteich erlaubt?

- ☒ nein, es ist nach der sächsischen Fischereiverordnung verboten
- ☐ ja, da es die Artenvielfalt unserer Gewässer erhöht, gibt es hier kein Verbot
- ☐ nein, außer es liegt ein Nachweis vor, dass diese Arten bereits in anderen Gewässern auftreten

1.491 Ist der Fang des Edelkrebse in Sachsen erlaubt?

- ☒ nein, er unterliegt einer ganzjährigen Schonzeit
- ☐ ja, außerhalb der gesetzlichen Schonzeit vom 1. April - 30. September
- ☐ ja, sobald er das Mindestmaß von 12 cm erreicht hat

470 Ist der Fischfang erlaubt, wenn man nur den Fischereischein besitzt und nicht Pächter oder Eigentümer des Gewässers ist ?

- ☐ ja
- ☒ nein
- ☐ nur an stehenden Gewässern

1.690 Ist der Fischfang in Fischwegen erlaubt?

- ☐ ja
- ☐ ja, aber nur am unterstem Ende eines Fischweges
- ☒ nein, er ist generell verboten

Sachgebiet: Gesetzeskunde

1.500 Ist der Fischfang in Naturschutzgebieten immer verboten?

- ☐ ja, es ist generell verboten
- ☐ nein, der Vorstand des Angelvereins kann Ausnahmen zulassen
- ☒ nein, das ergibt sich aus der Naturschutzgebietsverordnung

1.493 Ist die Ausübung der Fischerei in Gewässern innerhalb eingefriedeter Grundstücke möglich?

- ☒ nur mit Zustimmung des Eigentümers bzw. Nutzungsberechtigten
- ☐ ja
- ☐ nein

1.494 Ist die Fischerei mit elektrischem Strom verboten?

- ☐ nur in fließenden Gewässern
- ☐ nein, sie ist ohne Einschränkungen gestattet
- ☒ ja, aber sie kann unter Auflagen und Bedingungen genehmigt werden

1.495 Ist die Sächsische Fischereiverordnung für jeden Angler verbindlich, der in Sachsen angelt?

- ☒ ja, jeder Angler ist grundsätzlich daran gebunden
- ☐ nein, die Fischereiverordnung gilt nicht für Angler, die gleichzeitig Gewässereigentümer sind
- ☐ nein, die Fischereiverordnung gilt nur für in Sachsen ansässige Angler

1.496 Ist ein Erlaubnisscheininhaber berechtigt, selbständig Besatzmaßnahmen durchzuführen?

- ☒ nein, nur der Fischereiberechtigte ist dafür verantwortlich
- ☐ ja
- ☐ ja, bei Mitgliedschaft in einem ansässigen Angelverein

1.497 Ist es möglich, dass Schutzgebietsverordnungen die Angeltätigkeit einschränken?

- ☐ nein - nur Einschränkungen beim Betretungsrecht können eingeführt werden
- ☐ nein - die Angeltätigkeit kann nicht eingeschränkt werden
- ☒ ja - als spezielles Recht können sie unter anderem Betretungs- und Angelverbote beinhalten

1.498 Ist Fischwilderei ein Straftatbestand?

- ☐ nein, Fische sind ein Allgemeingut, ohne klar definierten Besitz
- ☒ ja, nach § 293 StGB
- ☐ Nein, es ist eine Ordnungswidrigkeit nach Fischereiverordnung

1.499 Ist für die Zulassung zur Fischereiprüfung in Sachsen der Besuch eines Vorbereitungslehrgangs vorgeschrieben?

- ☐ nein, der Besuch ist freiwillig
- ☒ ja, gilt aber nicht für Jugendfischereischeininhaber, deren Mitgliedschaft in einem Anglerverein seit mindestens zwei Jahren besteht
- ☐ ja, gilt aber nur für Bewerber, die keine Mitgliedschaft in einem Anglerverein haben

1.501 Kann der Fischereischein Personen versagt werden, welche die Fischereiprüfung bestanden haben?

- ☐ nein, es ist ein offiziell bestandener Abschluss mit lebenslanger Gültigkeit
- ☐ ja, wenn sie wegen Fahrerflucht zu Freiheitsstrafen über einem Jahr verurteilt sind
- ☒ ja, wenn sie auf Grund fischereirechtlicher, naturschutzrechtlicher oder tierschutzrechtlicher Verstöße rechtskräftig verurteilt wurden

1.502 Kann die Fischereibehörde, die den Fischereischein erteilt hat, diesen für ungültig erklären und entschädigungslos einziehen?

- ☐ ja, wenn der Fischereibeirat dem zustimmt
- ☒ ja, wenn nach Erteilung Tatsachen bekannt werden, die eine Versagung rechtfertigen
- ☐ nein, es kann maximal eine befristete Sperre auferlegt werden

1.503 Kann einer Person vor Vollendung des 14. Lebensjahres der Fischereischein ausgestellt werden?

- ☒ nein, nur der Jugendfischereischein
- ☐ ja, wenn der Fischfang in Anwesenheit eines Erwachsenen ausgeübt werden soll
- ☐ ja, ohne Beschränkung

Sachgebiet: Gesetzeskunde

1.691 Kann einer Person vor Vollendung des 9. Lebensjahres der Jugendfischereischein ausgestellt werden?

- ☒ ☐ nein
☐ ja, ohne Einschränkung
☐ ja, wenn diese einem Fischereiverein angehört

1.692 Kann es in Naturschutzgebieten sinnvoll sein, das Angeln zu beschränken?

- ☐ nein, ein Angler stellt für Tiere und Pflanzen keine Störung dar
☒ ja, wenn der besondere Schutzzweck nur so erreichbar ist
☐ nein, rechtlich ist Angeln an allen Gewässern erlaubt

1.505 Können Auflagen im Erlaubnisschein enthalten sein?

- ☐ nein, es gibt ein festgelegtes und allgemeingültiges Formular
☒ ja, z. B. zu den Angelzeiten, der Anzahl der Ruten u. ä.
☐ ja aber nur mit Zustimmung des Erlaubnisscheininhabers

1.506 Muß der Angler bei der Ausübung des Fischfangs fischereirechtliche Gewässergrenzen beachten?

- ☐ nein, denn die Gewässergrenzen ändern sich je nach Jahreszeit und Wasserstand
☒ ja, denn er darf nur im Geltungsbereich seines Fischereierlaubnisvertrages (Angelkarte) angeln
☐ ja, nur am Tage, nachts haben sie keine Geltung

1.507 Muß der Pächter eines Fischereirechts einen Fischereischein haben?

- ☒ ja, immer
☐ nein
☐ nur bei Gewässern ab 100 ha Wasserfläche

1.508 Muß ich fischereirechtliche Gewässergrenzen beim Angeln berücksichtigen?

- ☐ nein
☐ ja, nur als Inhaber eines Fünfjahresfischereischeins nicht
☒ ja, ich darf nur im Geltungsbereich meiner Erlaubnis angeln

1.509 Muß sich ein staatlicher Fischereiaufseher in jedem Fall mit Dienstaussweis ausweisen?

- ☒ ja, es sei denn, er kann aus Sicherheitsgründen seinen Dienstaussweis nicht vorzeigen
☐ nein, er muss ihn erst auf Nachfrage vorzeigen
☐ nein, nur wenn die Polizei zu Hilfe gerufen werden muß

1.723 Müssen einem staatlichen Fischereiaufseher der Fischerei- und Erlaubnisschein zur Einsichtnahme vorgezeigt werden?

- ☐ ja aber nur sofern er sich in Begleitung des Fischereiberechtigten befindet
☐ nein
☒ ja

1.511 Nach dem Tierschutzgesetz gilt in erster Linie für alle Bürger welcher Grundsatz?

- ☐ nur Personen mit gültigem Fischereischein dürfen Tieren Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen
☐ gefangene Fische müssen vor Anbruch der Dunkelheit waidgerecht getötet werden
☒ niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen

1.453 Sie beobachten im Frühjahr einen großen Hecht im flachen krautreichen Wasser. Wie handeln Sie?

- ☐ unter Beachtung der Schonzeit, versuche ich den großen Hecht mit einem Kescher zu erwischen
☒ vermutlich befindet sich der Fisch im Laichgeschäft, ich beachte die Schonzeit und aus Bestandsgründen verzichte ich auf den Fang
☐ ich versuche so schnell wie möglich den Fisch mit einem oberflächennahen Wobbler zu fangen

1.512 Sie entdecken am Angelplatz eine brütende Stockente auf dem Nest. Wie verhalten Sie sich?

- ☐ es kann weitergeangelt werden, da sich Enten beim Brutgeschäft nicht stören lassen
☐ die Ente darf verjagt werden, da sie nach dem Angeln zum Brutplatz zurückkehren kann
☒ sie verlassen den Angelplatz, um das Brutgeschäft des Vogels nicht zu stören

Sachgebiet: Gesetzeskunde

- 1.513 Sie fangen am 1. Februar einen Zander mit 55 cm Länge. Der Zander läßt sich problemlos vom Haken lösen. Wie verhalten sie sich richtig?
- ☒ sie setzen den Zander unverzüglich ins Gewässer zurück
 - ☐ sie betäuben und töten den Zander sofort nach dem Fang
 - ☐ sie hält den Zander in einem Setzkescher bis sie das Gewässer verlassen wollen, dann töten Sie den Fisch waidgerecht

- 1.514 Sie fangen am 1. Januar eine Äsche mit 35 cm. Die Äsche läßt sich problemlos vom Haken lösen. Wie verhalten sie sich richtig?
- ☒ sie setzen die Äsche unverzüglich ins Gewässer zurück
 - ☐ sie betäuben und töten die Äsche sofort nach dem Fang
 - ☐ sie hält die Äsche in einem Setzkescher bis sie das Gewässer verlassen, dann töten sie den Fisch waidgerecht

- 1.515 Sie haben in Sachsen die Fischereiprüfung abgelegt und gelernt, dass für viele Fischarten bestimmte Mindestmaße u. Schonzeiten vorgeschrieben sind. Kann es sein, dass Sie in einem anderen Bundesland andere Bestimmungen beachten müssen?
- ☐ nein, für Angler gelten in ganz Deutschland die gleichen Bestimmungen
 - ☐ ja, aber die Bestimmungen unterscheiden sich nur hinsichtlich der anwendbaren Angelmethode
 - ☒ ja, denn die Fischereirecht ist in jedem Bundesland recht unterschiedlich

- 687 Sie wollen sich in einem anderen Bundesland einen Erlaubnisschein beschaffen. Welche Ausweispapiere müssen Sie vorlegen?
- ☐ Fahrerlaubnis
 - ☐ Vereinsausweis
 - ☒ gültigen staatlichen Fischereischein

- 1.516 Sind Fische in Teichen im Sinne des Strafrechts als herrenlos anzusehen?
- ☐ ja, wenn die Gewässer nicht eingezäunt sind
 - ☐ ja, sofern sich an Gewässer keine Hinweisschilder auf Privatbesitz befinden
 - ☒ nein, für sie gilt ohne Erlaubnis des Besitzers kein Aneignungsrecht

- 1.532 Sind Fischereiaufseher berechtigt, Personen vorübergehend vom Ort zu verweisen?
- ☒ ja, wenn dies zur Unterbindung von Zuwiderhandlungen gegen Fischereivorschriften erforderlich ist
 - ☐ nein, dies ist nur durch eine polizeiliche Anordnung möglich
 - ☐ ja, aber nur an Privatgewässern

- 460 Sind Fischnährtiere Gegenstand des sächsischen Fischereirechts?
- ☒ ja
 - ☐ nein
 - ☐ nur in Flüssen

- 1.517 Von einem Angler wird nicht nur zum Fischereirecht Wissen erwartet. Welche rechtlichen Kenntnisse muß er noch haben?
- ☐ Kenntnisse zur Flora und Fauna - (FFH), Natura 2000 - und Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
 - ☒ Kenntnisse zu Tierschutz-, Artenschutz- und Naturschutzrecht
 - ☐ Kenntnisse über das Wasserhaushaltsgesetz, Strafrecht sowie das Jagdrecht

- 1.518 Wann darf ein "Wettfischen" durchgeführt werden?
- ☐ ja, wenn mindestens 10 Anglervereine teilnehmen
 - ☐ ja als Hegemaßnahme, wenn zu viele Weißfische vorhanden sind
 - ☒ Wettfischen ist ausnahmslos verboten

- 1.519 Warum gibt es Fischereiaufseher?
- ☐ zum Schutze der Angelfischer vor Unfällen im Wasser
 - ☐ zum Schutze des Wassers und zur Überwachung der Einhaltung vereinsinterner Bestimmungen
 - ☒ zum Vollzug der fischereilichen Rechtsvorschriften

- 1.520 Warum sind Fangstatistiken wichtig?
- ☐ um die Besatzmaßnahmen der Wasserbehörde zu überprüfen
 - ☐ um den Nachweis zu führen, wie leistungsfähig der einzelne Angler ist
 - ☒ sie geben Auskunft über Fischarten, Populationsdichten und Wachstumsbedingungen

Sachgebiet: Gesetzeskunde

1.521 Warum werden Schonzeiten festgelegt?

- ☒ ☐ um ein ungestörtes Abbläichen der Fische zu gewährleisten
 - ☐ um das Wachstum der Fische zu fördern
 - ☐ um den angelfischereilichen Druck auf die Gewässer zu reduzieren
-

1.522 Was gehört alles zu den „Fischen“ im Sinne des Sächsischen Fischereigesetzes?

- ☐ Fische, deren Laich und alle aquatisch lebenden Amphibien und deren Larven
 - ☒ ☐ Fische, deren Laich, Neunaugen und deren Larven, Zehnfußkrebse und Muscheln
 - ☐ Fische und Fischnährtiere
-

1.523 Was gilt nicht als eingefriedetes Grundstück im Sinne des Uferbetretungsrechtes?

- ☐ Grundstücke, dessen Abzäunung leicht überklettert werden kann
 - ☐ Grundstücke mit maroder Abzäunung
 - ☒ ☐ Grundstücke die als Viehweiden dienen und eingezäunt sind
-

1.525 Was hat gemäß der guten fachlichen Praxis nach dem Landen eines maßigen Fisches, der für den Verzehr bestimmt ist, von den aufgeführten Maßnahmen als erstes zu geschehen?

- ☐ Längen- und Gewichtsbestimmung
 - ☒ ☐ Entfernen des Angelhakens
 - ☐ Fangbucheintragung
-

1.626 Was hat gemäß einer guten fachlichen Praxis nach dem Landen eines maßigen Fisches, der für den Verzehr bestimmt ist sofort zu geschehen?

- ☐ Fangbucheintragung mit Längen- und Gewichtsbestimmung
 - ☐ sofortiges Entweiden
 - ☒ ☐ Betäuben und Töten durch Kehlschnitt
-

1.528 Was ist das Besondere am Jugendfischereischein?

- ☒ ☐ er gilt nur, in Begleitung eines volljährigen Fischereischeininhabers oder bei Nachweis einer mindestens einjährigen Mitgliedschaft in einem Fischereiverein
 - ☐ er gestattet den Gebrauch nur einer Handangel
 - ☐ er gilt nur, in Begleitung eines Erziehungsberechtigten
-

1.529 Was ist ein Fischschonbezirk ?

- ☒ ☐ ein Gewässerabschnitt in dem der Fischfang eingeschränkt oder verboten ist
 - ☐ ein Gewässerabschnitt in der Hand des Freistaates Sachsen
 - ☐ ein Gewässerabschnitt in dem das Befahren und das Begehen des Ufers verboten ist
-

1.526 Was ist gemäß Sächsischer Fischereiverordnung beim Fischfang verboten?

- ☐ in Gruppen mit mehr als vier Personen an das Wasser zu gehen
 - ☒ ☐ lebende Köderfische und betäubende Mittel zu verwenden
 - ☐ mehr als eine Friedfischangel zu verwenden
-

1.527 Was ist nach Sächsischer Fischereiverordnung beim Fischfang verboten?

- ☐ die Verwendung eines Blinkers
 - ☐ das Betreten des Ufers
 - ☒ ☐ Ausübung des Fischfangs als Wettbewerb
-

1.693 Was ist zu tun, wenn man einen untermaßigen Fisch gefangen hat?

- ☐ man schneidet die Schnur durch und lässt den Fisch frei
 - ☒ ☐ man löst den Fisch vorsichtig mit nassen Händen vom Haken und setzt ihn ins Wasser zurück
 - ☐ man hält den Fisch mit einem sauberen trockenen Tuch und löst ihn vom Haken
-

1.531 Was kann in Schonbezirken beschränkt oder verboten werden?

- ☐ das Fällen von Bäumen am Ufer
- ☐ das Betreten des Ufers
- ☒ ☐ das Angeln

Sachgebiet: Gesetzeskunde

- 1.694 Was muss der Betreiber einer angemeldeten bewirtschafteten Anlage beachten, wenn ich dort Angeln möchte und keinen gültigen Fischereischein besitze?
- ☐ er kann mich ohne weiteres angeln lassen
 - ☐ ich benötige keinen Fischereischein aber einen Erlaubnisschein
 - ☒ Ich benötige keinen Fischereischein und Erlaubnisschein, muss aber in den Umgang und die sachkundige Tötung von Fischen unterwiesen werden

- 1.535 Was sind Natur- oder Landschaftsschutzgebiete?
- ☐ rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete zum Schutz des Grundwassers
 - ☐ rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete und Standorte zum Schutz historischer Kulturgüter
 - ☒ rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete mit besonders schützenswerter Natur und Landschaft

- 1.536 Was sind Schonzeiten?
- ☐ Zeiträume, die für den Salmonidenbesatz festgelegt sind und diese nicht gezielt beangelt werden dürfen
 - ☐ Zeiträume, in denen nur Milchner gefangen werden dürfen.
 - ☒ festgelegte Zeiträume, in denen bestimmte Fischarten geschont sind und nicht gefangen werden dürfen

- 1.537 Was sind selbständige Fischereirechte?
- ☐ Fischereirechte die niemandem zustehen
 - ☐ Fischereirechte die nur dem Staat zustehen
 - ☒ Fischereirechte, die nicht dem Eigentümer des Gewässergrundstücks zustehen

- 479 Was sind verbotene Fangmittel ?
- ☐ Spinnangeln, Handangeln ohne Pose
 - ☒ künstliches Licht, explodierende, betäubende und giftige Stoffe
 - ☐ Grundbleiangeln mit Seitenarm

- 1.538 Was versteht man unter einem Mindestmaß?
- ☐ die Länge von Satzfishen, ab welcher diese besetzt werden dürfen
 - ☐ die Länge von Laichfishen, ab welcher diese gefangen und abgestriffen werden dürfen
 - ☒ die Länge von Fischen, ab welcher diese gefangen und mitgenommen werden dürfen

- 1.139 Welche Angelmethode ist verboten?
- ☒ Angeln mit lebenden Köderfisch
 - ☐ Angeln mit totem Köderfisch
 - ☐ Angeln mit Blinker

- 1.540 Welche Aufgaben hat der staatliche Fischereiaufseher?
- ☒ er hat zu überprüfen, ob die Fischerei nach den gesetzlichen Vorschriften erfolgt
 - ☐ er hat darauf zu achten, dass die Angler in möglichst weitem Abstand voneinander fischen
 - ☐ er hat dem Fischereiberechtigten oder -pächter monatlich mitzuteilen, wie viele Personen die Fischerei ausgeübt haben

- 1.541 Welche Auskunft geben „Rote Listen“ im Zusammenhang mit Fragen des Tier- und Pflanzenschutzes?
- ☐ sie bezeichnen Schutzzonen und Schonzeiten
 - ☐ sie sind eine Liste jagdbarer, nicht gefährdeter Tiere
 - ☒ sie kennzeichnen den Gefährdungsgrad einzelner Tier- und Pflanzenarten

- 1.542 Welche Behörde ist in Sachsen für die Ausweisung von Naturschutzgebieten zuständig?
- ☐ die Fischereibehörde
 - ☒ die Naturschutzbehörde
 - ☐ das Bauamt

- 1.627 Welche der aufgeführten Aussagen entspricht der gesetzlichen Definition der Hegepflicht?
- ☐ die Pflicht, die Fischerei soweit zu beschränken, dass sich alle Fische wieder uneingeschränkt vermehren können
 - ☒ die Pflicht, einen den Gewässerverhältnissen entsprechenden heimischen Fischbestand aufzubauen und zu erhalten
 - ☐ die Pflicht, sämtliche fischfressende Prädatoren dauerhaft zu vergrämen

- 1.543 Welche der aufgeführten Fangmethoden kann fischereibehördlich zugelassen werden ?
- ☐ der Fischfang mit Sprengmitteln
 - ☒ die Elektrofischerei und das Fischen mit künstlichem Licht
 - ☐ der Fischfang mit Fischeispeeren

Sachgebiet: Gesetzeskunde

904 Welche der aufgeführten Fische dürfen ohne vorherige Betäubung getötet werden?

- ☐ Welse und Hechte
- ☒ Aale und Plattfische
- ☐ Barsche und Schleien

1.544 Welche der aufgeführten Stoffe und Geräte sind für den Fischfang verboten?

- ☐ künstliche Fliegen und Plastikköder
- ☒ Gifte, Harpunen, Schlingen und Schusswaffen
- ☐ lebende Maden, Fliegen und Würmer

1.545 Welche der folgenden Handlungen entspricht einer Ordnungswidrigkeit im Sinne des Sächsischen Fischereigesetzes?

- ☐ das Parken eines Kfz in Ufernähe
- ☒ die Ausgabe von Angelscheinen an Personen die keinen gültigen Fischereischein besitzen
- ☐ die Benutzung eines zu kleinen Unterfangkeschers

1.546 Welche der folgenden Handlungen ist eine Ordnungswidrigkeit nach Sächsischem Fischereigesetz ?

- ☒ Angeln ohne den vom Fischereiberechtigten erteilten Erlaubnisschein
- ☐ das Mitführen von mehreren Angelgeräten
- ☐ das Betreten und Befahren von Fließgewässern während der Schonzeit

1.547 Welche Dokumente benötigt der Angler an Eigentumsgewässern, die keine bewirtschaftete Anlage darstellen?

- ☐ nur einen gültigen Erlaubnisschein
- ☒ einen gültigen Fischerei- und Erlaubnisschein
- ☐ eine gültigen Personalausweis oder Reisepass

1.548 Welche Dokumente werden vom Angler gemäß §§ 19 und 20 SächsFischG zum Töten und Aneignen gefangener Fische benötigt?

- ☐ Fischereischein und Personalausweis
- ☒ gültiger Fischereischein und Erlaubnisschein
- ☐ das Zeugnis über die erfolgreich absolvierte Fischereiprüfung in Verbindung mit einem gültigen Personalausweis

1.549 Welche fischereilichen Dokumente sind zur Ausübung des Fischfangs gesetzlich vorgeschrieben ?

- ☒ der Fischereischein und der Erlaubnisschein
- ☐ der Fischereischein und der Personalausweis
- ☐ der Vereinsausweis und der Personalausweis

1.569 Welche Nutzung eines Gewässers zählt nicht zum Gemeingebrauch nach dem Sächsischen Wasserrecht?

- ☒ Angeln
- ☐ Baden
- ☐ Bootfahren

1.570 Welche Regelungen gelten für einen neu entstandenen Baggersee?

- ☐ er muss unmittelbar nach Beendigung der Baggerarbeiten mit Forellen besetzt werden
- ☒ der erstmalige Besatz im bisher fischereilich nicht genutzten Gewässer bedarf der Erlaubnis der Fischereibehörde
- ☐ der See muss zunächst als ein Naturschutzgebiet ausgewiesen werden

1.783 Welche Schonzeit gilt für die abgebildete Fischart?

- ☐ 1. Oktober bis 30. April
- ☒ 1. Januar bis 15. Juni
- ☐ 1. Januar bis 30. April

1.769 Welche Schonzeit gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?

- ☐ 1. Januar bis 15. Juni
- ☐ 1. Februar bis 30. Juni
- ☒ 15. April bis 30. Juni

1.771 Welche Schonzeit gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?

- ☐ 1. Oktober bis 31. Mai
- ☒ ganzjährig
- ☐ es gibt keine Schonzeit

Sachgebiet: Gesetzeskunde

1.772 Welche Schonzeit gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?

- ☒ ganzjährig geschont
☐ keine Schonzeit
☐ 1. Februar bis 30. Juni

1.731 Welche Schonzeit gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?

- ☐ keine Schonzeit
☒ ganzjährig geschont
☐ Schonzeit nur während der Laichzeit (April bis Juni)

1.733 Welche Schonzeit gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?

- ☐ 1. Februar bis 30. April
☒ 1. Februar bis 30. Juni
☐ 15. April bis 30. Juni

1.728 Welche Schonzeit gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?

- ☐ 1. Oktober bis 31. Dezember
☒ 1. Oktober bis 30. April
☐ 1. Oktober bis 31. Mai

1.729 Welche Schonzeit gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?

- ☒ 1. Oktober bis 30. April
☐ 1. Oktober bis 31. Dezember
☐ 1. Oktober bis 31. Mai

1.737 Welche Schonzeit gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?

- ☐ ganzjährig geschont
☒ 1. Oktober bis 30. April
☐ 1. Oktober bis 31. Mai

1.738 Welche Schonzeit gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?

- ☐ 1. Januar bis 30. April
☐ 1. Januar bis 31. Mai
☒ 1. Januar bis 15. Juni

1.730 Welche Schonzeit gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO? Der weibliche Fisch ist in der Laichzeit mit einer Legeröhre ausgestattet.

- ☒ ganzjährig geschont
☐ 1. Februar bis 30. Juni
☐ 15. April bis 30. Juni

1.773 Welche Schonzeit gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO? Sie ist ein Indikator für gute Wasserqualität und betreibt echte Brutpflege.

- ☐ keine Schonzeit
☐ 1. Oktober bis 30. April
☒ ganzjährig geschont

1.753 Welche Schonzeit hat der hier abgebildete Fisch laut SächsFischVO?

- ☐ 15. April bis 30. Juni
☐ keine Schonzeit
☒ ganzjährig geschont

1.780 Welche Schonzeit hat der hier abgebildete Fisch laut SächsFischVO?

- ☐ 1. Januar bis 15. Juni
☐ 1. Februar bis 30. April
☒ 1. Februar bis 31. Mai

1.750 Welche Schonzeit hat der hier abgebildete Fisch laut SächsFischVO?

- ☐ keine Schonzeit
☒ 1. Oktober bis 30. April
☐ 1. Oktober bis 31. Mai

Sachgebiet: Gesetzeskunde

1.751 Welche Schonzeit hat der hier abgebildete Fisch laut SächsFischVO?

- ☐ keine Schonzeit
- ☒ ganzjährig geschont
- ☐ 1. Januar bis 15. Juni

1.754 Welche Schonzeit hat der hier abgebildete Fisch laut SächsFischVO? Auffällig ist die hier weit nach hinten versetzte Rückenflosse.

- ☐ 1. Februar bis 30. April
- ☐ 1. Februar bis 31. Mai
- ☒ ganzjährig geschont

1.778 Welche Schonzeit hat der hier abgebildete Fisch laut SächsFischVO? Der Schnauzenbug ist nasenartig vorstehend, kegelförmig, verdickt und dunkel.

- ☒ ganzjährig geschont
- ☐ keine Schonzeit
- ☐ 1. Oktober bis 31. Dezember

1.781 Welche Schonzeit hat der hier abgebildete Fisch laut SächsFischVO? Er hat eine sehr lange Afterflosse.

- ☒ ganzjährig geschont
- ☐ keine Schonzeit nur ein Mindestmaß von 25 cm
- ☐ 1. Oktober bis 30. April

1.782 Welche Schonzeit hat der hier abgebildete Krebs (Astacus astacus) laut SächsFischVO?

- ☐ keine Schonzeit
- ☒ ganzjährig geschont
- ☐ nur während der Häutung geschont

482 Welche Voraussetzung muß grundsätzlich erfüllt sein, um einen Fischereischein erwerben zu können?

- ☐ ein gültiger Pachtvertrag
- ☐ die Mitgliedschaft in einem Fischereiverein
- ☒ das Bestehen der Fischereiprüfung

1.572 Welche Wasserinsektenart ist durch die Bundesartenschutzverordnung geschützt?

- ☐ die rote Zuckmückenlarve
- ☒ der Kolbenwasserkäfer
- ☐ der Bachflohkrebs

1.573 Welche Wasserpflanzen sind durch die Bundesartenschutzverordnung geschützt und dürfen nicht entfernt werden?

- ☐ Teichlinsen und Großer Wassernabel
- ☒ Weiße See- und Gelbe Teichrose
- ☐ Wasserpest und Tausendblatt

1.574 Welche zwingende Voraussetzung ist für den Abschluss eines Fischereierlaubnisvertrages erforderlich?

- ☐ der Antragsteller muß einen gültigen Personalausweis besitzen
- ☒ der Antragsteller muß Inhaber eines gültigen amtlichen Fischereischeins sein
- ☐ der Antragsteller muß einen Mitgliedsausweis einer Anglervereinigung besitzen

276 Welchem Zweck dient die sächsische Fischereiverordnung?

- ☐ Sie regelt das Gemeinschaftsleben der Angler.
- ☒ Sie enthält die konkreten Regelungen und Festlegungen zur Durchführung der Fischerei.
- ☐ Sie regelt die Belange der Berufsfischerei.

1.575 Welchen Geltungsbereich hat das Sächsische Fischereigesetz?

- ☒ es gilt für alle in Betten fließenden und stehenden Gewässer
- ☐ es gilt für alle fließenden Gewässer
- ☐ es gilt für alle stehenden Gewässer

1.576 Welchen Zweck haben die in der sächsischen Fischereiverordnung festgelegten Mindestmaße?

- ☐ Möglichst große Fische und alte Fische zu entnehmen
- ☒ Sicherstellung der natürlichen Reproduktion
- ☐ Unterbindung der natürlichen Reproduktion

Sachgebiet: Gesetzeskunde

1.695 Welcher Abstand ist beim Angeln von Netzen, Reusen und ständigen Fischereivorrichtungen mindestens einzuhalten?

- ☐ 25 m
- ☒ 50 m
- ☐ 70 m

1.577 Welcher Form bedarf ein Fischereipachtvertrag damit er gültig ist?

- ☐ in Form eines mündlichen Vertragsabschlusses
- ☐ in Form eines mündlichen Vertragsabschlusses, in Gegenwart eines Zeugen
- ☒ in Form eines schriftlichen Fischereipachtvertrages

1.578 Welcher Grundsatz muß auch beim Umgang mit Fischen beachtet werden?

- ☒ Keinem Fisch darf ohne vernünftigen Grund Schmerz, Leid oder Schaden zugefügt werden
- ☐ Fischbestände tragen zu einer ausgewogenen Ernährung bei und sind zu bewirtschaften
- ☐ Fische besitzen keine Schmerzempfinden und ihnen ist nach guter fachlicher Praxis nachzustellen

1.579 Welcher Köder darf nicht zum Beködern von Angelhaken verwendet werden?

- ☐ Larven von Bremsen
- ☐ Larven von Stubenfliegen
- ☒ Larven von Libellen

1.696 Welches Beispiel fällt unter den Begriff "Gemeingebrauch" nach dem Sächsischen Wassergesetz?

- ☐ Hineinschieben eines Bootsanhängers in den See um ihn dort zu waschen
- ☒ Entnahme von geringen Wassermengen aus einem Bach zum Vieh tränken
- ☐ Anlegen eines einfachen Angelstegs im Uferbereich

927 Welches Mindestalter schreibt das Fischereigesetz des Freistaates Sachsen für die Erteilung eines Jugendfischereischeines vor?

- ☐ 8 Jahre
- ☒ 9 Jahre
- ☐ 12 Jahre

1.770 Welches Mindestmaß gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?

- ☐ 25 cm
- ☒ 28 cm
- ☐ 35 cm

1.775 Welches Mindestmaß gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?

- ☒ 50 cm und geschont vom 1. Februar bis 30. April
- ☐ 45 cm und geschont vom 1. Februar bis 31. Mai
- ☐ 55 cm und geschont vom 1. Februar bis 30. Juni

1.768 Welches Mindestmaß gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?

- ☐ 30 cm
- ☐ 40 cm
- ☒ 50 cm

1.742 Welches Mindestmaß gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?

- ☐ 45 cm
- ☒ 50 cm
- ☐ 60 cm

1.736 Welches Mindestmaß gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?

- ☐ 40 cm
- ☐ 50 cm
- ☒ 60 cm

1.740 Welches Mindestmaß gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?

- ☐ 25 cm
- ☒ 28 cm
- ☐ 30 cm

Sachgebiet: Gesetzeskunde

1.744 Welches Mindestmaß gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?

- ☐ 28 cm
☐ 30 cm
☒ 35 cm

1.734 Welches Mindestmaß gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?

- ☐ 15 cm
☐ 35 cm
☒ 40 cm

1.732 Welches Mindestmaß gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO?

- ☐ kein Mindestmaß
☒ 15 cm
☐ 20 cm

1.735 Welches Mindestmaß gilt für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO? Die Innenhaut der Bauchhöhle (Peritoneum) ist schwärzlich gefärbt.

- ☒ kein Mindestmaß
☐ 15 cm
☐ 40 cm

1.749 Welches Mindestmaß hat der hier abgebildete Fisch laut SächsFischVO?

- ☒ 25 cm
☐ 28 cm
☐ 30 cm

1.752 Welches Mindestmaß hat der hier abgebildete Fisch laut SächsFischVO?

- ☐ 20 cm
☒ 25 cm
☐ 28 cm

1.779 Welches Mindestmaß hat der hier abgebildete Fisch laut SächsFischVO?

- ☐ 45 cm
☒ 50 cm
☐ 60 cm

1.755 Welches Mindestmaß hat der hier abgebildete Fisch laut SächsFischVO? Es ist der größte bei uns lebende Raubfisch.

- ☐ 60 cm
☐ 80 cm
☒ nicht im § 2 (1) SächsFischVO genannt, somit kein Mindestmaß

1.748 Welches Mindestmaß hat der hier abgebildete karpfenartige Fisch, der im Alter vorwiegend räuberisch lebt, laut SächsFischVO?

- ☐ 35 cm
☒ 40 cm
☐ 50 cm

1.799 Welches Mindestmaß hat dieser abgebildete Fisch laut aktueller SächsFischVO?

- ☐ kein Mindestmaß
☒ 20 cm, nur beim Fang in Fließgewässern
☐ 25 cm, nur beim Fang in Fließgewässern

1.792 Welches Mindestmaß hat dieser karpfenartige Fisch laut SächsFischVO?

- ☐ 30 cm
☒ 20 cm
☐ 15 cm

1.741 Welches Mindestmaß ist für die hier abgebildete Fischart laut aktueller SächsFischVO vorgesehen?

- ☐ 28 cm
☒ 30 cm
☐ 35 cm

Sachgebiet: Gesetzeskunde

1.601 Welches Recht gesteht Ihnen als Angler das sächsische Fischereirecht zu?

- ☒ mit gültigem Fischereischein und Erlaubnisschein Fische zu fangen
- ☐ überall Fische zu fangen und sie innerhalb ihrer Mindestmaße und Schonzeiten mitzunehmen
- ☐ Fische zu fangen, sie aber immer schonend wieder zurück zusetzen

1.571 Welches Tier ist durch die Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt ?

- ☐ der Aland
- ☐ die Bachforelle
- ☒ der Edelkrebs

1.602 Welches Ziel hat das Bundesnaturschutzgesetz?

- ☒ Schutz, Pflege, Entwicklung und Sicherung von Natur, Landschaft und Gewässern
- ☐ den Schutz der Wälder vor Brandgefahr durch entsprechende gesetzliche Regelungen
- ☐ Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion durch geeignete gesetzliche Regelungen

273 Wem steht ein Uferbetretungsrecht zu?

- ☒ dem Fischereiausübungsberechtigten, ihren Fischereihilfen sowie Erlaubnisscheininhabern
- ☐ jedem Inhaber eines Fischereischeines
- ☐ dem Fischereiausübungsberechtigten und seinen Angehörigen

1.603 Wenn im Sächsischen Fischereigesetz der Begriff "Fische" gebraucht wird, gilt dieser dann:

- ☐ für alle Fischarten deren Laich
- ☒ für Fische und deren Laich, Neunaugen und deren Larven, Zehnfußkrebse, Muscheln sowie Fischnährtiere
- ☐ für Fische und deren Laich, Neunaugen und deren Larven, Fischnährtiere und Wasserinsekten

1.604 Wer begeht Fischwilderei?

- ☒ wer ohne entsprechende Berechtigung in einem nicht geschlossenen Gewässer fischt
- ☐ wer in der Schonzeit Fische fängt
- ☐ wer eine Raubfischangel in den Wintermonaten verwendet

1.605 Wer bekommt einen Jugendfischereischein?

- ☐ Angler unter 18 Jahre, die die Fischereiprüfung bestanden haben
- ☐ Angler zwischen 16 und 18 Jahren, die noch keine Fischereiprüfung bestanden haben
- ☒ Angler zwischen 9 und 16 Jahren, die noch keine Fischereiprüfung abgelegt haben

1.606 Wer braucht keinen Fischereischein beim Fischfang?

- ☐ Gäste des Fischereischeininhabers
- ☒ Personen, die den Fischereiberechtigten beim Abfischen eines Fischteiches unterstützen
- ☐ Fischereiberechtigte im eigenen Gewässer

1.607 Wer Fische ohne Erlaubnisschein aus einem Fischteich fängt begeht ...

- ☐ ein Kavaliersdelikt
- ☒ Diebstahl
- ☐ Mundraub

634 Wer haftet für Schäden, die durch den Angler verursacht werden?

- ☐ die Fischereibehörde
- ☐ der Grundstückseigentümer
- ☒ der Angler als Verursacher

1.608 Wer ist zur fischereilichen Hege im Gewässer verpflichtet?

- ☐ alle Erlaubnisscheininhaber
- ☐ der Gewässeranlieger
- ☒ der Inhaber oder Pächter des Fischereirechts

478 Wer stellt den Erlaubnisschein (Angelberechtigung) aus?

- ☐ die Fischereibehörde
- ☐ das Staatliche Amt für Landwirtschaft
- ☒ der Fischereirechtsinhaber oder Fischereipächter

Sachgebiet: Gesetzeskunde

820	Wer stellt Fischereischeine aus?	☐ der Anglerverein ☒ die Fischereibehörde ☐ die Fischereigenossenschaft
1.609	Wie erkenne ich als Angler Fisch- oder Laichschonbezirke?	☐ Schonbezirke haben klares Wasser und eine gute Gewässerstruktur ☐ Schonbezirke sind als solche nicht gekennzeichnet und müssen immer vor Ort erfragt werden ☒ Schonbezirke sind durch Bojen und/oder Schilder gekennzeichnet
1.610	Wie hat sich der Angler einem sich ausweisenden, staatlichen Fischereiaufseher gegenüber zu verhalten ?	☐ nur in Polizeibegleitung bestehen Kontrollbefugnisse und fischereiliche Dokumente sind vorzuzeigen ☒ auf Verlangen sind fischereiliche Dokumente und Fang vorzuzeigen ☐ der Aufseher hat keine konkreten Kontrollbefugnisse, der Nachweis fischereiliche Dokumente und Fänge geschieht auf freiwilliger Basis
1.611	Wie ist die Handangel zu beaufsichtigen?	☒ die Handangel muß ständig beaufsichtigt werden ☐ die Handangel muß in regelmäßigen Zeitabständen beaufsichtigt werden ☐ die Beaufsichtigung ergibt sich nach der Art der Angelmethode
1.614	Wie ist in der Bundesrepublik Deutschland gegenwertig die Fischerei geregelt?	☐ durch Bundesrecht ☐ durch Europäisches Recht ☒ durch Landesrecht
1.612	Wie kann der Fischer fischfressende Vögel bekämpfen z. B. Fischreiher?	☐ Giftköder ☐ lebend fangen und an geeigneten Ort umsiedeln ☒ verscheuchen
1.613	Wie wird ein Fisch waid- und tierschutzgerecht getötet?	☐ der Fisch bleibt an Land, bis er erstickt ist ☐ durch Einschnitt der Bauchhöhle und schnelles Entweiden ☒ durch einen Schlag auf den Gehirnschädel und anschließenden Entblutungsschnitt
955	Wo gilt das Sächsische Fischereigesetz?	☐ im gesamten Bundesgebiet ☒ im Freistaat Sachsen ☐ in Sachsen und Sachsen-Anhalt
1.615	Wo ist das Fischen mit zwei Handangeln geregelt?	☐ im Sächsischen Fischereigesetz (SächsFischG) ☒ in der Sächsischen Fischereiverordnung (SächsFischVO) ☐ Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
910	Wo sind die besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten namentlich aufgeführt?	☐ im Bundesnaturschutzgesetz ☒ in der Bundesartenschutzverordnung ☐ im Tierschutzgesetz
1.617	Wonach muss man sich vorher erkundigen, wenn ein Angelgewässer in einem Schutzgebiet liegt?	☒ nach der jeweiligen Schutzgebietsverordnung und den dort geltenden Bestimmungen ☐ nach dem geltenden Fischereigesetz und den dort festgelegten Schonzeiten ☐ nach dem Pflanzenschutzrecht und dem dort festgelegten Gefährdungsgrad von Röhricht und Ufervegetation
1.616	Wozu darf der Angelfischer seinen Fang nur verwenden?	☒ nur für den Eigenbedarf bei Beachtung der Mindestmaße und Schonzeiten ☐ zum Eigenbedarf und nicht kommerziellen Verkauf unter Beachtung der Mindestmaße und Schonzeiten ☐ zum Eigenbedarf und zum Besatz anderer fischereilich bewirtschafteter Gewässer

1.618 Wozu kann die Fischereibehörde Fischschonbezirke ausweisen?

- ☒ um den betreffenden Gewässerabschnitt vor Verunreinigung zu schützen
- ☒ zur Erhaltung von bedrohten Fischarten, ihrer Laichplätze und Winterlager
- ☒ zur Erhaltung stabiler Friedfischpopulationen (Beutepopulationen)

Vorbereitungslerngang

Sachgebiet: Gewässerkunde

1.313 Algen zählen zu den Pflanzen. Welche Bedeutung haben sie?

- ☐ sie führen immer zur Verringerung der Fließgeschwindigkeit eines Gewässers
- ☒ sie bilden den Anfang der Nahrungskette und produzieren Sauerstoff
- ☐ sie trüben das Wasser und führen dadurch zu einer Verschlechterung der Wasserqualität

1.314 Als besonders wertvolle Pflanzen im Gewässer gelten Unterwasserpflanzen. Warum?

- ☒ Unterwasserpflanzen produzieren Sauerstoff und sind "Kinderstuben" für Jungfische
- ☐ Unterwasserpflanzen sind Futter für Amphibien und Krebse
- ☐ Unterwasserpflanzen bauen Ozon ab

1.670 An welchen Gewässerstellen sollte Fischbesatz eingebracht werden?

- ☒ weit verteilt entlang der Ufer
- ☐ im Freiwasser oder in Flüssen an den tiefsten Stellen
- ☐ nur an einer Stelle im Flachwasser

1.316 Auf welche Art der Abwassereinwirkung deutet der Verlust der Schleimschicht bei Fischen hin?

- ☐ auf Abwässer mit Schwebstoffen
- ☒ auf ätzende Abwässer
- ☐ auf organische Abwässer

1.317 Beeinflusst die Wassertemperatur die Löslichkeit für Sauerstoff?

- ☐ nein, die Wassertemperatur hat keinen Einfluss auf den Sauerstoffgehalt
- ☒ ja, kaltes Wasser kann mehr Sauerstoff aufnehmen als warmes Wasser
- ☐ ja, warmes Wasser kann mehr Sauerstoff aufnehmen als kaltes Wasser

1.318 Bei welcher der angegebenen Temperaturen kann Wasser den meisten Sauerstoff binden?

- ☐ bei 25 °C
- ☐ bei 15 °C
- ☒ bei 5 °C

364 Bei welcher Temperatur hat Wasser seine größte Dichte und ist damit am schwersten?

- ☐ bei 0 °C
- ☒ bei plus 4 °C
- ☐ bei minus 2 °C

1.319 Bis zu welcher Tiefe können grüne Pflanzen in Seen dauerhaft existieren?

- ☐ der Pflanzenwuchs ist unabhängig von der Tiefe
- ☒ soweit, wie genügend Licht eindringt
- ☐ soweit, bis der Wasserdruck nicht 1,5 bar überschreitet

1.320 Dichter Erlenbestand beschattet das Flussbett. Welche Auswirkungen hat das auf den Wasserpflanzenwuchs?

- ☐ bestimmte Wasserpflanzen wachsen hier besonders üppig
- ☒ die Wasserpflanzen wachsen hier stark eingeschränkt
- ☐ der Schutz der Bäume erlaubt eine besonders artenreiche Vegetation

1.321 Die Artenanzahl richtet sich nach vielen Bedingungen und kann je nach Gewässer stark schwanken. Wo kommen die wenigsten Arten vor?

- ☒ in Gewässern mit extremen Bedingungen, z.B. in sauren Braunkohleseen
- ☐ in sommerkühlen Gewässern
- ☐ in nährstoffreichen Seen

1.322 Die Menge des im Wasser gelösten Sauerstoffs wird primär beeinflusst durch:

- ☐ den pH-Wert
- ☒ die Wassertemperatur
- ☐ den Härtegrad

1.671 Die natürlichen Begleitfischarten in der Forellenregion sind:

- ☐ Plötze, Barbe, Blei
- ☒ Groppe, Elritze, Schmerle
- ☐ Stichling, Kaulbarsch, Bitterling

Sachgebiet: Gewässerkunde

1.672 Die Photosynthese ist für alle Lebensvorgänge auf der Erde von großer Bedeutung. Was ist darunter zu verstehen?

- ☐ die Reflexionen des Sonnenlichtes auf der Wasseroberfläche
- ☐ der Wasseraustausch zwischen Atmosphäre und Gewässeroberfläche mit Hilfe von Sonnenenergie
- ☒ die Produktion von Biomasse und Sauerstoff durch grüne Pflanzen mit Hilfe von Sonnenenergie und Kohlendioxid

116 Durch welche Abwässer kann in einem Gewässer Sauerstoffmangel entstehen?

- ☒ durch organische, fäulnisfähige Abwässer
- ☐ durch Betonschwemmwässer
- ☐ durch saure Abwässer

800 Durch welche natürlichen Vorgänge kann der Sauerstoffgehalt in stehenden Gewässern unter das für Fische erträgliche Maß absinken?

- ☒ durch Sauerstoffverbrauch bei Nacht infolge starker Pflanzenatmung (Dissimilation)
- ☐ durch massenhaftes Ausschlüpfen von Wasserinsekten
- ☐ durch erhöhten Sauerstoffverbrauch beim Abbläichen der Fische

1.323 Durch welche Witterungsverhältnisse, werden Fischsterben infolge von Sauerstoffmangel in stark verkrauteten Teichen begünstigt?

- ☐ durch starke Regen- und Schneefälle
- ☐ durch windreiche, kalte Nächte
- ☒ durch windstille, warme Nächte und starke Bewölkung am darauffolgenden Morgen

674 Eines der aufgeführten Gewässer ist meist sauerstoffarm. Welches?

- ☒ ein schattiger, verschlammter Tümpel ohne Wasserpflanzen
- ☐ ein schnell fließender, klarer Gebirgsbach
- ☐ ein flacher See mit gutem Unterwasserpflanzenbestand

1.673 Haben flache Ufer in einem Gewässer eine besondere fischereiliche Bedeutung?

- ☐ nein, weil die Fische dort besonders gut von fischfressenden Vögeln erbeutet werden können
- ☐ ja, Fische überwintern gern in Flachwasserbereichen, da in diesen Bereichen im Winter die höchsten Temperaturen vorliegen
- ☒ ja, weil hier eine verstärkte Nährtierproduktion stattfindet und viele Tierarten hier ideale Fortpflanzungs- und Aufwuchszonen vorfinden

1.325 Haben Pflanzennährstoffe im Gewässer eine fischereibiologische Bedeutung?

- ☒ ja, sie sind u. a. notwendig zur Entwicklung der Algen, diese wiederum sind Grundlage der Nahrungskette
- ☐ nein, Pflanzennährstoffe sind für Fische nicht verfügbar und haben somit keine Bedeutung aus fischereibiologischer Sicht
- ☐ nein, denn Pflanzennährstoffe geben nur Auskunft über die Gewässergüteklassen

1.326 Hat die Gestalt des Bodenuntergrundes eine fischereibiologische Bedeutung?

- ☐ nein, Fische passen sich schnell an die vor Ort herrschenden Bedingungen an
- ☐ ja, da unregelmäßiger Untergrund und Kolke vor allem Parasiten geeigneten Unterschlupf bieten.
- ☒ ja, da ein unregelmäßiger Untergrund verschiedensten Lebewesen Entwicklungsmöglichkeiten bietet

1.327 Hat die Kleintierlebewelt im Gewässer einen Nutzen, gegebenenfalls welchen?

- ☐ nein, es ist ein eigenständiges Tierreich ohne besonderen Einfluss auf das Gewässer
- ☒ ja, sie ist u.a. eine Nahrungsgrundlage für Fische
- ☐ ja, sie versorgt das Wasser mit Sauerstoff

1.674 Im Zusammenhang mit der Umwelt hören wir häufig von einem Biotop. Was ist damit gemeint?

- ☐ unter Biotop verstehen wir eine in der Regel nicht abgrenzbare Tier- oder Pflanzengemeinschaft
- ☒ unter Biotop verstehen wir einen räumlich abgegrenzten Lebensraum, der eine angepasste Lebensgemeinschaft beherbergt
- ☐ als Biotop bezeichnet man vom Menschen geschaffene, nicht abgrenzbare Lebensräume

1.329 In der warmen Jahreszeit kann es zum massenhaften Auftreten bestimmter Algen kommen. Wie nennt man dieses Massenaufreten?

- ☐ Wasserwachstum
- ☒ Wasserblüte
- ☐ Wasserpest

Sachgebiet: Gewässerkunde

1.330 In einigen Seen kann das Licht den Grund nicht mehr erreichen. Wasserpflanzenwuchs ist an solchen Stellen nicht möglich. Wie bezeichnet man diesen Bereich des Sees?

- ☒ Tiefenzone
☐ Freiwasserzone
☐ Epilimnion

1.331 In welchem Gewässerabschnitt ist normalerweise der wenigste Sauerstoff enthalten?

- ☒ an der Quelle eines Baches
☐ im Oberlauf eines Baches
☐ im Unterlauf eines Baches

235 In welchen Fließgewässern treten im Laufe des Jahres die größten Temperaturschwankungen auf?

- ☐ in Gewässern der Forellenregion
☐ in Gewässern der Barbenregion
☒ in Gewässern der Bleiregion

621 In welchen Gewässern ist Glasaalbesatz schädlich?

- ☐ in Talsperren
☒ in Forellenbächen
☐ in Baggerseen

1.333 In welcher Beziehung stehen Wassertemperatur und Sauerstoffgehalt?

- ☒ kaltes Wasser hat höhere Sättigungswerte an Sauerstoff
☐ warmes Wasser hat höhere Sättigungswerte an Sauerstoff
☐ hoher Luftdruck sorgt für höhere Sättigungswerte an Sauerstoff

1.334 In welcher Beziehung stehen Wassertemperatur und Stoffumsatz im Gewässer?

- ☐ bei einer Wassertemperatur von 20°C ist der Stoffumsatz am höchsten
☒ je höher die Wassertemperatur, desto höher ist der Stoffumsatz
☐ je niedriger die Wassertemperatur, desto höher ist der Stoffumsatz

1.335 In welcher fischereibiologischen Region ist die Groppe zu finden?

- ☒ in der Forellen- und Äschenregion
☐ in der Barben- und Bleiregion
☐ im Brackwasser

1.621 In welcher Reihenfolge kommen in stehenden Gewässern die Wasserpflanzengemeinschaften vom Ufer zur Seemitte hin vor?

- ☐ Schwimmblattpflanzen-Unterseeische Wiesen-Laichkräuter
☒ Schwimmblattpflanzen-Laichkräuter-Unterseeische Wiesen
☐ Laichkräuter-Unterseeische Wiesen-Schwimmblattpflanzen

117 In welcher Reihenfolge wachsen Pflanzen vom Ufer aus gesehen?

- ☐ Schwimmblattpflanzen - Röhricht - Unterwasserpflanzen - unterseeische Wiesen
☒ Röhricht - Schwimmblattpflanzen - Unterwasserpflanzen - unterseeische Wiesen
☐ Unterwasserpflanzen - unterseeische Wiesen - Röhricht - Schwimmblattpflanzen

1.332 In welcher Zone eines stehenden Gewässers kommt es am ehesten zu Sauerstoffmangel?

- ☐ im Uferbereich
☒ in der Tiefenzone
☐ an der Oberfläche

1.337 Insekten sind leicht von anderen Tieren zu unterscheiden. Sie haben typische Kennzeichen:

- ☐ alle Insekten besitzen Flügel
☐ Insekten haben einen zweigliedrigen Körper (Kopf, Hinterleib) und acht Beine
☒ Insekten haben einen dreigliedrigen Körper (Kopf, Brustteil, Hinterleib) und sechs Beine

1.338 Ist das Beseitigen von Tümpeln ökologisch sinnvoll?

- ☒ nein, weil dadurch der Lebensraum von Tieren und Pflanzen zerstört wird
☐ ja, weil dadurch fruchtbares Land gewonnen wird
☐ ja, weil Brutstätten lästiger Insekten verschwinden

Sachgebiet: Gewässerkunde

1.339 Ist das Einbringen großer Mengen an Futtermitteln für das Gewässer schädlich?

- ☐ nein, die Fische nehmen sämtliches Futter auf und wachsen dadurch besser ab
- ☐ nein, überschüssiges Futter wird ohne Folgen für das Gewässer biologisch zersetzt
- ☒ ja, es verstärkt die Sauerstoffzehrung und fördert die Eutrophierung des Gewässers

1.340 Ist der Sauerstoffgehalt in fließenden Gewässern gewöhnlich höher oder niedriger als in stehenden Gewässern?

- ☐ es besteht kein Unterschied, da die Aufnahmefähigkeit des Wassers für Sauerstoff immer gleich ist
- ☐ er ist niedriger wegen der höheren Wassertemperatur
- ☒ er ist höher, da durch die Fließbewegung zusätzlich Sauerstoff gelöst wird

1.341 Ist es bedenklich, wenn Fischeingeweide ins Wasser geworfen werden?

- ☐ nein, weil Fische Eingeweide fressen
- ☐ nein, denn hierdurch wird der Nährstoffgehalt des Wassers angereichert
- ☒ ja, denn Fischkrankheiten können dadurch gefördert werden (z.B. Parasiten)

1.342 Ist es möglich, mit Angelutensilien Fischkrankheiten zu verbreiten?

- ☐ nein, das ist völlig ausgeschlossen
- ☐ nein, nur bei Fischteichen ist es möglich
- ☒ ja, das ist möglich

1.343 Ist regelmäßiger Fischbesatz zur Bestandserhaltung notwendig?

- ☐ ja, denn Fischpopulationen unterliegen heute keiner natürlichen Regulation und sind deshalb regelmäßig zu besetzen
- ☒ nein, wenn Brutaufkommen und Nahrungsverhältnisse im Gewässer eine normale Entwicklung des Fischbestandes ermöglichen
- ☐ ja, sonst stirbt der Fischbestand innerhalb kurzer Zeit aus

1.675 Kann man unbrauchbare Bleibescherungen im Gewässer entsorgen?

- ☐ Blei ist korrosionsträge und verwittert nicht, deshalb ist eine Entsorgung im Gewässer möglich
- ☐ da Bleibescherungen auch sonst beim Angeln ins Wasser gebracht werden, ist das unerheblich
- ☒ Blei darf wegen möglicher Umweltgefahren keineswegs im Wasser entsorgt werden

1.344 Kann Wasser auch durch Regen verunreinigt werden?

- ☐ nein, Regen ist lediglich kondensiertes Wasser welches keine Verunreinigungen enthält
- ☒ ja, durch sich in der Luft befindende Schadstoffe, kann das Regenwasser verunreinigt werden
- ☐ nein, in der Luft sind kaum Schadstoffe enthalten, sodass Regenwasser immer unbedenklich ist

1.345 Können angebrachte Laichhilfen als sinnvoll angesehen werden?

- ☐ nein, sie werden von den Fischen grundsätzlich nicht angenommen
- ☒ ja, wenn aufgrund der Strukturarmut des Gewässers ein Mangel an natürlichen Laichplätzen besteht
- ☐ nein, sie verrotten und belasten das Gewässer mit organischen Stoffen

1.346 Können bereits geringe Abwassereinleitungen biologische Schäden in Gewässern verursachen?

- ☒ ja, weil die Tier- und Pflanzenwelt gegenüber Umweltveränderungen besonders empfindlich reagiert
- ☐ nein, weil die Selbstreinigungskraft der Gewässer solche Verunreinigungen ausgleicht
- ☐ Nein, der Verdünnungseffekt hebt diese Belastung auf

807 Können frisch ausgekieste Baggerseen schon fischereilich genutzt werden?

- ☐ ja, ohne Einschränkungen
- ☒ nein, erst nach Entwicklung des tierischen und pflanzlichen Lebens
- ☐ ja, sofort nach Durchführung eines starken Fischbesatzes

1.347 Können massive Steinschüttungen zur Uferbefestigung ein Problem für Fische sein?

- ☒ ja, denn sie verhindern die natürliche Veränderung und Strukturierung des Gewässers
- ☐ nein, denn sie verhindern, dass unterspülte Bäume ins Wasser fallen, zersetzt werden und die Wasserqualität verschlechtern
- ☐ nein, denn alle Fische finden hier einen idealen Lebensraum

Sachgebiet: Gewässerkunde

1.348 Können Querbauwerke wie Wehre und Sohlabstürze in Fließgewässern Fischbestände beeinträchtigen?

- ☐ ja, denn sie fördern Laichwanderungen und andere Ortsbewegungen
- ☒ ja, denn sie isolieren Fischbestände und verhindern Wiederbesiedlung und Laichwanderung
- ☐ nein, sie haben keinen direkten Einfluss auf die Fischbestände

1.349 Pflanzen haben sich wie Tiere ihrem Lebensraum angepasst. So finden wir in der Forellenregion mit kaltem, klarem, sauerstoffreichem Wasser andere Pflanzen als in der Bleiregion. Typische Pflanzen der Forellenregion sind:

- ☒ Wasserstern und Quellmoos
- ☐ Pfeilkraut und Schwimmendes Laichkraut
- ☐ Seerose und Rohrkolben

1.350 Sie haben ihren Angelplatz in der Nähe eines Vogelneests eingerichtet. Das Vogelpaar "schimpft" mächtig. Wie verhalten Sie sich?

- ☐ Ruhe bewahren und weiterangeln, die Vögel beruhigen sich nach einer gewissen Zeit
- ☐ das Vogelpaar sollte verjagt werden, da sich sonst die Fangaussichten erheblich verschlechtern
- ☒ um zu vermeiden, daß die Vögel das Nest verlassen, suche ich mir einen anderen Angelplatz

1.676 Sind Altarme eines Gewässers ökologisch besonders wertvoll?

- ☐ nein, weil sie zur Verlandung neigen und nur noch wenigen Tieren und Pflanzen geeigneten Lebensraum bieten
- ☒ ja, weil sie für viele Lebewesen geeignete Lebensräume und Rückzugsgebiete darstellen
- ☐ ja, weil ihr Wasser leicht zur Versauerung neigt

1.352 Sind bei der fischereilichen Hege auch die Fischarten zu berücksichtigen, die fischereilich nicht genutzt werden?

- ☒ ja, immer
- ☐ ja, aber nur wenn sie Futterfische der Raubfischarten sind
- ☐ nein, denn diese Fischarten stellen Nahrungskonkurrenten dar

1.677 Sollen Fische zum Besatz bei Wiederansiedlungsmaßnahmen aus dem selben Gewässersystem stammen?

- ☐ nein, damit es nicht zu einer genetischen Verarmung (Inzucht) kommt
- ☒ ja, damit die genetische Identität der lokalen Bestände erhalten bleibt
- ☐ die Wahl der Besatzfische sollte sich an ökonomischen Aspekten orientieren

1.354 Steigt der pH-Wert in einem Gewässer von pH 7 auf pH 9, wie wird dann der Reaktionszustand des Wassers bezeichnet?

- ☐ sauer
- ☒ alkalisch
- ☐ neutral

1.355 Unter Brackwasser verstehen wir:

- ☐ stark salzhaltiges Meereswasser
- ☐ Meereswasser, das stark durch Industrie, Landwirtschaft und Haushalte getrübt ist
- ☒ Meereswasser mit geringem Salzgehalt durch die Einmischung von Süßwasser

1.356 Wann ist die Sättigung von Sauerstoff im Wasser am höchsten?

- ☒ bei niedrigen Temperaturen
- ☐ bei hohen Temperaturen
- ☐ sie ist temperaturunabhängig

1.357 Warum bildet sich in stehenden Gewässern eine Temperaturschichtung des Wassers?

- ☐ weil chemische Prozesse innerhalb eines Gewässers zu dieser Schichtung führen
- ☐ weil das Tiefenwasser durch die Erdwärme aufgeheizt wird
- ☒ weil Wasser verschiedener Temperaturen unterschiedliche Dichte hat

1.358 Warum darf in Salmonidengewässern eine Grundräumung nur in besonderen Ausnahmefällen erfolgen?

- ☒ weil durch die Grundräumung u.a. die Laichbetten der Salmoniden zerstört werden
- ☐ durch Grundräumung kann der gesamte Fischbestand vernichtet werden
- ☐ weil durch Grundräumung die Gewässer zu tief werden

1.359 Warum ist die Tierwelt der Bäche besonders empfindlich gegenüber Sauerstoffmangel?

- ☒ weil sie an die in Bächen herrschenden Sauerstoffverhältnisse angepasst sind
- ☐ weil sie sich bei Sauerstoffmangel nicht vermehren können
- ☐ weil es bei Sauerstoffmangel zu einem Anstieg des pH-Wertes kommt

Sachgebiet: Gewässerkunde

1.620 Warum ist eine Temperaturangleichung beim Fischbesatz erforderlich?

- ☐ um einen Druckausgleich der Schwimmblase herzustellen
- ☐ um Hautparasiten abzuschwemmen
- ☒ zum Schutz der Schleimhaut und zur Stressreduzierung

1.678 Warum kann es besonders in stehenden Gewässern unter Eis zum Ersticken der Fische kommen?

- ☐ wegen der niedrigen Wassertemperaturen löst sich dementsprechend wenig Sauerstoff
- ☐ weil die Stickstoffkonzentration im Wasser durch fehlenden Pflanzenbewuchs ansteigt
- ☒ weil der Sauerstoffeintrag aus der Luft und die Sauerstoffproduktion der Pflanzen eingeschränkt ist

1.362 Warum können Schwäne in großen Mengen in Fischgewässern Schaden anrichten?

- ☐ sie beunruhigen und verscheuchen die Fische
- ☐ sie fangen Jungfische
- ☒ sie fressen Wasserpflanzen mit Nährtieraufwuchs, sowie Fischlaich

619 Warum muß eine Fangstatistik geführt werden?

- ☐ zum Nachweis über vorgenommenen Besatz
- ☒ zur Kontrolle der fischereilichen Bewirtschaftung
- ☐ zur Rechenschaft gegenüber dem Finanzamt

1.363 Warum schädigen in der Regel Baustellenabwässer die Fische?

- ☒ weil sie meist Zement, Beton oder Kalk enthalten, die alkalisch und ätzend wirken
- ☐ weil sie für gewöhnlich eine starke Trübung im Gewässer verursachen und zu Sauerstoffmangel führen
- ☐ weil sie immer Säuren enthalten und ätzend wirken

1.364 Warum schwimmt Eis auf dem Wasser?

- ☒ es hat eine geringere Dichte als Wasser
- ☐ es hat eine höhere Dichte als Wasser
- ☐ die Strömung hält das Eis an der Oberfläche

1.366 Warum sind Gewässerregulierungen oft nachteilig für die Fischerei?

- ☐ weil dadurch insgesamt weniger Wasser zur Verfügung steht und dementsprechend weniger Fischbiomasse vorhanden ist
- ☐ weil dadurch häufig die Wassertemperatur gesenkt wird
- ☒ weil die Gewässerstruktur und die Durchgängigkeit stark beeinträchtigt werden

1.367 Warum sind landwirtschaftliche Abwässer für Fische schädlich?

- ☒ weil sie beim Abbau im Gewässer sehr viel Sauerstoff verbrauchen
- ☐ weil sie giftige Schwermetalle enthalten
- ☐ weil sie eine akute Erwärmung des Gewässers auslösen

1.365 Warum sind organisch belastete Abwässer für Gewässer und ihre Bewohner gefährlich?

- ☐ weil die Temperatur des Gewässers ansteigt
- ☒ weil durch den Abbauprozess im Gewässer viel Sauerstoff verbraucht wird
- ☐ weil sie die Sichttiefe stark reduzieren

1.368 Warum sollen in Gewässern mit Edelkrebsbestand keine Aale eingesetzt werden?

- ☐ weil Krebsgewässer für Aale zu flach und warm sind
- ☒ weil Aale die frisch gehäuteten Krebse fressen
- ☐ weil Satzaale von Krebsen häufig verletzt werden

1.369 Warum sollen Schilf- und Röhrichtbereiche nicht begangen oder mit dem Boot befahren werden?

- ☐ weil hier oft nur ein gefährliches Waten möglich ist
- ☐ weil man hier beim Angeln und beim Landen eines Fisches von Schilf behindert wird
- ☒ weil der Lebensraum der Tier- und Pflanzenwelt gestört oder gar zerstört wird

1.370 Warum sollte sich der Angler in Uferbereichen mit Schilf und Röhricht besonders umsichtig verhalten?

- ☐ weil die Angelschnur in den Pflanzen hängen bleiben kann
- ☐ weil der Drill und die Landung des gehakten Fisches schwierig werden könnten
- ☒ weil dort Wasservögel nisten und die Anwesenheit eines Anglers die Tiere beunruhigen könnte

Sachgebiet: Gewässerkunde

1.371 Was besagt der pH-Wert einer Wasserprobe?

- ☐ er zeigt den Grad der organischen Belastung an
- ☒ er zeigt an, ob das Wasser sauer, neutral oder alkalisch reagiert
- ☐ er zeigt den Phenolgehalt an

1.372 Was bezeichnet man als „Aufwuchs“?

- ☐ den Gewässerboden bedeckende unterseeische Wiesen aus Wasserpflanzen
- ☐ große Ansammlungen von Jungfischen in der flachen Uferzone
- ☒ Ansiedlung von Algen und Mikroorganismen auf Oberflächen innerhalb des Gewässers

1.373 Was bezeichnet man als Sprock?

- ☐ Jungfischstadium
- ☒ Larve der Köcherfliege
- ☐ Parasit

372 Was bezeichnet man als Wasserblüte?

- ☐ das Blühen von Wasserpflanzen
- ☒ die Massenentwicklung von Algen
- ☐ das Blühen von Uferpflanzen

371 Was brauchen Unterwasserpflanzen vor allem um Sauerstoff zu erzeugen?

- ☐ trübes Wasser
- ☐ kaltes Wasser
- ☒ Licht und Wärme

1.374 Was geschieht bei der biologischen Selbstreinigung eines Gewässers?

- ☒ chemisch-biologische Prozesse bewirken den Abbau organischer Substanz
- ☐ im Wasser befindliche Schwebstoffe setzen sich in beruhigten Zonen ab (Sedimentation)
- ☐ im Wasser befindliche Pflanzen bauen die organischen Substanzen ab

1.375 Was ist als erstes zu tun, wenn ein Fischsterben bemerkt wird?

- ☐ der Gewässereigentümer ist ausfindig zu machen und darüber zu informieren
- ☒ es sind Wasserproben zu entnehmen und die Polizei sowie das Ordnungsamt zu benachrichtigen
- ☐ lediglich andere Angler informieren, denn nur die Behörde ist zu Handlungen berechtigt

1.376 Was ist beim Aussetzen von Fischen durch den Fischereiausübungsberechtigten besonders zu beachten?

- ☒ vor dem Aussetzen müssen die Fische temperiert werden
- ☐ er muss die Einwilligung der Grundstückseigentümer einholen
- ☐ er muss Schaulustige fernhalten

1.679 Was ist beim Fischtransport zu beachten?

- ☐ es sind möglichst kleine Transportbehälter zu verwenden, um die Fische bestmöglich kontrollieren zu können
- ☐ der Transport von Fischen darf zur Vermeidung von Stress und aus tierschutzrechtlichen Gründen immer nur bei Dunkelheit stattfinden
- ☒ es sind möglichst große Transportbehälter zu verwenden und es ist auf ausreichende Sauerstoffversorgung zu achten

611 Was ist charakteristisch für einen nährstoffarmen See?

- ☐ reiches Algenwachstum und geringe Sichttiefe
- ☐ hohe Sauerstoffgehalte, aber nur in Oberflächenschichten
- ☒ hohe Sauerstoffgehalte auch in der Tiefenzone

1.378 Was ist die Voraussetzung für die Sauerstoffproduktion durch grüne Pflanzen?

- ☐ ein hoher Nährstoffgehalt (Schwefel und Kalium müssen vorhanden sein)
- ☐ eine Wassertemperatur über 4 Grad Celsius
- ☒ Sonnenenergie (Licht und Wärme müssen vorhanden sein)

628 Was ist ein Altarm?

- ☐ langes schlauchartiges Gewässer im Wald
- ☐ Seebereich mit sauberem Wasser
- ☒ ehemaliger Flussabschnitt, der noch mit dem Hauptgewässer verbunden ist

Sachgebiet: Gewässerkunde

1.379 Was ist ein Altwasser?

- ☒ ☐ ein ehemaliger Abschnitt eines Flusses, der wassergefüllt zurückbleibt
☐ ein Gewässer, das zu verlanden droht
☐ ein Gewässer mit überaltertem Fischbestand, ohne nennenswertes Jungfischaufkommen
-

361 Was ist ein eutrophes Gewässer?

- ☒ ☐ ein sehr nährstoffreiches Gewässer
☐ ein sehr saures Gewässer
☐ ein sehr nährstoffarmes Gewässer
-

345 Was ist ein oligotropher See?

- ☒ ☐ ein nährstoffarmer See
☐ ein nährstoffreicher See
☐ ein See mit dicker Schlammschicht am Grund
-

393 Was ist ein Teich?

- ☒ ☐ ein künstlich geschaffenes, absperr- und ablassbares Gewässer
☐ ein abgesperrter Altarm eines Flusses
☐ ein altes Flachgewässer, welches nicht tiefer als 2 Meter ist
-

1.380 Was ist für die Sauerstoffabgabe der grünen Unterwasserpflanzen entscheidend?

- ☒ ☐ die Sonnenscheindauer
☐ die Wassertemperatur
☐ ein alkalischer pH - Wert
-

1.680 Was ist typisch für das stehende Zandergewässer?

- ☐ es ist tief, klar und nährstoffarm
☒ ☐ es ist flach, hartgründig und sommertrüb
☐ es ist klein, stark verkrautet und warm
-

544 Was ist typisch für die Barbenregion?

- ☐ schlammiger Untergrund und langsam fließendes Wasser
☒ ☐ sandiger bis kiesiger Untergrund mit schnell fließendem Wasser
☐ felsiger Untergrund und reißendes Wasser
-

355 Was muß eine Fangmeldung unbedingt enthalten?

- ☒ ☐ Fangort, Fischart, Anzahl, Länge, Gewicht
☐ Fischart, Geschlecht, Färbung, Anzahl
☐ Länge, Gewicht, Fangmethode, Köder
-

802 Was sind die fischereibiologischen Besonderheiten junger Baggergewässer?

- ☒ ☐ geringer Nährstoffgehalt
☐ hohe Wassertemperaturen im Sommer
☐ geringer Sauerstoffgehalt in der Oberflächenschicht
-

362 Was sind Fischtreppe und Fischwege?

- ☒ ☐ Bauten, die den Fischen das Passieren von Hindernissen ermöglichen
☐ Bauten, die den Fischen die Schwimmwege verkürzen
☐ Geröllablagerungen und Strömungskanäle, die die Fische bei der Wanderung bevorzugen
-

601 Was sind Überwasserpflanzen?

- ☒ ☐ Segge, Igelkolben
☐ Wasserstern, Hornkraut
☐ Tausendblatt, Quellmoos
-

1.383 Was sollte mit krankheitsverdächtigen toten Fischen geschehen?

- ☒ ☐ sie sollten gekühlt und umgehend zu einer Untersuchungsstelle gebracht werden
☐ sie sollten wegen der Ansteckungsgefahr nicht berührt werden
☐ sie sind von Angler nicht weiter zu beachten, die zuständige Behörde ist verantwortlich
-

Sachgebiet: Gewässerkunde

1.384 Was verbirgt sich hinter dem Wort Wasserpest?

- ☐ eine massive Trübung durch Algenwachstum
- ☐ eine Fischkrankheit
- ☒ eine Wasserpflanzenart

1.385 Was verstehen wir unter einer "Symbiose"?

- ☐ Zusammenleben zweier Lebewesen verschiedener Arten zum Vorteil einer der beiden Arten
- ☒ Zusammenleben zweier Lebewesen verschiedener Arten zu beiderseitigem Vorteil
- ☐ Zusammenleben zweier Lebewesen verschiedener Arten mit dem Effekt der Schwächung einer dritten Art

1.386 Was verstehen wir unter Plankton?

- ☒ Kleinstlebewesen der Pflanzen und Tiere
- ☐ Tonart, durch deren Abbau viele Tonseen entstanden
- ☐ nicht lebende Substanz/Schwefelstoffe in einem Gewässer

1.387 Was versteht man unter dem Begriff "Assimilation"?

- ☒ Umwandlung körperfremder Stoffe in körpereigene Stoffe (Stoffaufbau)
- ☐ Umwandlung körpereigener Stoffe in körperfremde Stoffe (Stoffabbau)
- ☐ Der Transport von Sauerstoff über Kapillaren (feinste Blutgefäße)

83 Was versteht man unter dem Begriff der Gewässereutrophierung?

- ☐ einen rasch wachsenden Bestand an Weissfischen in einem Gewässer
- ☐ die Temperaturschichtung von eisbedeckten Seen im Winter
- ☒ die Anreicherung eines Gewässers mit Nährstoffen

1.682 Was versteht man unter dem Begriff Dissimilation?

- ☒ Umwandlung körpereigener Stoffe in körperfremde Stoffe (Stoffabbau)
- ☐ Umwandlung körperfremder Stoffe in körpereigene Stoffe (Stoffaufbau)
- ☐ der Transport von Kohlenstoffdioxid über Kapillaren (feinste Blutgefäße)

1.681 Was versteht man unter dem Begriff Sommerstagnation?

- ☐ ein See weist im Sommer über die gesamte Tiefe eine gleichmäßige Sauerstoffversorgung auf
- ☒ eine stabile Temperaturschichtung in einem See zur Sommerzeit
- ☐ der Fischbestand eines Sees verteilt sich im Sommer auf bestimmte Wassertiefen

1.390 Was wird als Fischweg bezeichnet ?

- ☐ die von Fischen im Gewässer bevorzugten Wanderwegen
- ☒ technische Einrichtung zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Fließgewässern
- ☐ markierte und vorgeschriebene Zugangswege zu Gewässern zum Biotopschutz

1.391 Was wird unter Frühjahrs- und Herbstvollzirkulation in stehenden Gewässern verstanden?

- ☐ die Umwälzung bestimmter Wasserschichten geschichteter Seen und Ausbildung einer Sprungschicht induziert durch Wind
- ☐ die Frühjahrs- und Herbstabfischung in künstlichen Teichen
- ☒ die vollständige Umwälzung und Temperaturangleichung des Wasserkörpers geschichteter Seen durch Wind

1.392 Was wirkt sich negativ auf die normale Tier- und Pflanzenwelt in Talsperrengewässern aus?

- ☐ die häufig wechselnden Druckunterschiede
- ☒ die häufige Änderung des Wasserstandes
- ☐ die starke Abkühlung im Winter

680 Wasserpflanzen bestehen häufig aus Wurzeln, Stielen und Blättern. Welche Teile sind für die Sauerstoffproduktion im Wasser von Bedeutung?

- ☒ die grünen Blätter
- ☐ die Stiele
- ☐ die Wurzeln

352 Welche Ansprüche stellen Forellen an ihren Lebensraum?

- ☐ warmes Wasser mit nicht zu hoher Sauerstoffkonzentration
- ☐ stark strömendes, sauerstoffarmes Wasser mit hoher Leitfähigkeit
- ☒ kühles und sauerstoffreiches Wasser

Sachgebiet: Gewässerkunde

351 Welche Arten gehören zu den Schwimmblattpflanzen?

- ☐ Igelkolben, Schilf, Rohr
- ☒ Seerosen, Froschbiß, Wasserlinsen
- ☐ Quellmoos, Seggen, Hornkraut

1.394 Welche Aussage ist richtig?

- ☐ Lurche sind gut als Angelköder
- ☒ Lurche zählen zu den bedrohten Arten und stehen unter Naturschutz
- ☐ Lurche stehen nicht unter Naturschutz. Sie machen durch ihr Quaken nur Lärm und vertreiben die Fische

1.395 Welche Aussage über die Dichte des Wassers ist richtig?

- ☐ die Dichte bleibt immer gleich
- ☒ die Temperatur beeinflusst die Dichte
- ☐ der Luftdruck beeinflusst die Dichte

1.396 Welche biologische Funktion hat der im Wasser gelöste Sauerstoff?

- ☒ er wird für die Atmung der Wasserorganismen benötigt
- ☐ er neutralisiert alkalische Abwässer
- ☐ er neutralisiert saure Abwässer

1.397 Welche chemische Wasseruntersuchung kann mit geringem Aufwand durchgeführt werden?

- ☒ die Bestimmung des pH-Wertes
- ☐ die Bestimmung des Nitratwertes
- ☐ der Nachweis von Schwermetallen

1.400 Welche der drei Aussagen ist richtig?

- ☐ Steinfliegenlarven haben die Kiemenanhänge am Hinterleib und drei Schwanzborsten
- ☐ Steinfliegenlarven haben die Kiemenanhänge an der Brust und drei Schwanzborsten
- ☒ Steinfliegenlarven haben die Kiemenanhänge an der Brust und zwei Schwanzborsten

1.401 Welche der folgenden Stoffe sind wichtige Pflanzennährstoffe?

- ☐ Calcium und Chlorid
- ☐ Sauerstoff und Wasserstoff
- ☒ Stickstoff und Phosphor

1.403 Welche der genannten Tiere sind Bioindikatoren für gering belastete Fließgewässer (Gewässergüteklasse I - II)?

- ☐ Zuckmückenlarven
- ☒ Steinfliegenlarven
- ☐ Schneckenegel

1.404 Welche der genannten Tiere sind Laich- u. Bruträuber?

- ☐ Schnecken und Muscheln
- ☐ Würmer und Egel
- ☒ Libellenlarven und Raubwanzen

1.405 Welche Faktoren beeinflussen die Gewässergüte am stärksten?

- ☒ der Eintrag von Abwässern und Nährstoffen
- ☐ die durchschnittliche Wassertemperatur
- ☐ die Gewässergröße und -tiefe

1.406 Welche Fischarten sollte man in einem Gewässer fördern?

- ☐ Fischarten, die angelsportlich interessant sind und einen guten Drill bieten
- ☒ Fischarten, die dem Charakter des Gewässers entsprechen und zum biologischen Gleichgewicht gehören
- ☐ Fischarten, die wenig anfällig gegen Krankheiten und konkurrenzstark sind

1.407 Welche fischereiliche Bedeutung haben Kolke in fließenden Gewässern?

- ☐ sie können sich nachteilig auswirken, weil in ihnen das Wasser sauerstoffarm wird
- ☐ sie werden von Fischen gemieden
- ☒ sie sind bevorzugte Standplätze von Fischen

Sachgebiet: Gewässerkunde

1.408 Welche fischereiökologischen Maßnahmen müssen an Wasserkraftanlagen getroffen werden?

- ☐ keine, weil nach gesetzlichen Regelungen Wasserkraft eine umweltfreundliche Technologie ist
- ☐ ausreichender Fischbesatz auf Kosten des Anlagenbetreibers
- ☒ Errichtung von Fischwanderwegen, ausreichende Restwassermengen sowie Schutzvorrichtungen vor den Turbinen

1.409 Welche Fischnährtiere leben in der Bodenzone?

- ☒ Eintagsfliegenlarven und Roten Zuckmückenlarven
- ☐ Wasserflöhe und Hüpferlinge
- ☐ Stechmücken und Libellenlarven

374 Welche Fischnährtiere leben meist in der Freiwasserzone?

- ☐ Schlammröhrenwürmer
- ☐ Köcherfliegenlarven
- ☒ Wasserflöhe

1.411 Welche Fischnährtiere zählt man zum tierischen Plankton?

- ☐ Schlammröhrenwürmer und rote Mückenlarven
- ☒ Wasserflöhe und Hüpferlinge
- ☐ Eintagsfliegen- und Steinfliegenlarven

1.412 Welche Flaschen sind für die Entnahme von Wasserproben am besten geeignet?

- ☒ es sind saubere Glas-oder Plastikflaschen von 1Liter Inhalt zu verwenden
- ☐ es sind nur sterile Laborflaschen gut geeignet
- ☐ nur Flaschen aus Weißglas sind brauchbar, weil sich in ihnen die Schadstoffe nicht zersetzen

392 Welche Gewässer sind besonders durch Zuflüsse mit niedrigem pH-Wert gefährdet?

- ☐ Steinbruchgewässer
- ☒ Gewässer in Wald- und Mooregebieten mit geringem Puffervermögen
- ☐ alte Kiesgruben

1.413 Welche Gewässerzonen sind am sauerstoffreichsten?

- ☐ die Brackwasserregion und die lichtlose Tiefe im See
- ☐ die Barbenregion und die Zone der Schwimmblattpflanzen
- ☒ die Forellenregion und die Zone der Unterwasserpflanzen

1.683 Welche Hegemaßnahmen sind zu treffen, wenn in einem Gewässer der Bestand an Weißfischen oder Flussbarsch überhandnimmt?

- ☐ verstärkter Besatz mit den gleichen Arten
- ☒ intensives Befischen und Besatz mit geeigneten Raubfischen
- ☐ keine, denn der Bestand geht ohnehin wegen "Degeneration" zugrunde

133 Welche höheren Wasserpflanzen sind besonders günstig für die Sauerstoffversorgung stehender Gewässer?

- ☒ die untergetauchte "weiche" Flora (Laichkräuter, Tausendblatt, Wasserpest)
- ☐ die Schwimmblattpflanzen (Seerosen)
- ☐ die "harte" Flora (Schilf, Rohr)

1.399 Welche Lebewesen zählt man zum tierischen Plankton?

- ☐ juvenile Fische und Molche
- ☐ Kaulquappen und Libellenlarven
- ☒ Wasserflöhe und Hüpferlinge

1.415 Welche meist am Gewässergrund lebenden Kleintiere sind beste Fischnahrung?

- ☒ Insektenlarven
- ☐ Regenwürmer
- ☐ Fischegel

1.416 Welche Nachteile können Überwasserpflanzen haben?

- ☒ ihr beständiges Vordringen ins Gewässer führt zur Verlandung
- ☐ sie bieten guten Hecht-Einstand und fördern damit deren übermäßige Vermehrung
- ☐ das Gewässer kühlt durch zu starke Beschattung ab

Sachgebiet: Gewässerkunde

1.726 Welche Nahrungsquelle ist für die Ernährung der Fischbrut besonders wichtig?

- ☒ Zooplankton
- ☐ Anflugschmetterlinge
- ☐ Mückenlarven

1.417 Welche Organismen können auch in den lichtlosen Tiefenzonen von Seen dauernd leben?

- ☐ keine
- ☐ bestimmte Algen
- ☒ bestimmte Bakterien

1.418 Welche Organismen können Sauerstoff abgeben?

- ☐ tierisches Plankton
- ☒ grüne Pflanzen
- ☐ Insektenlarven

1.393 Welche Organismen stehen in Gewässern am Anfang der Nahrungskette?

- ☐ Muscheln
- ☐ Wasserflöhe
- ☒ Algen

373 Welche Pflanze gehört zu den Unterwasserpflanzen?

- ☐ Schilf
- ☐ Gelbe Seerose
- ☒ Wasserpest

1.419 Welche Pflanzen gehören zu den Unterwasserpflanzen?

- ☐ Kalmus
- ☐ Wasserlinsen
- ☒ Quellmoos

1.382 Welche Pflanzen sind häufig Bestandteil des flachen Uferbereichs stehender oder langsam fließender Gewässer?

- ☒ Schilfrohr und Rohrkolben
- ☐ Hechtkraut und Wasserpest
- ☐ Wasserstern und Pfeilkraut

735 Welche pH-Werte sind für unsere einheimischen Fische unbedenklich?

- ☒ Werte von 6,5 bis 8,5
- ☐ Werte von 3,5 bis 5,0
- ☐ Werte von 9,5 bis 12,5

1.420 Welche Schäden richten Bissamratten in Gewässern an?

- ☐ sie sind Nahrungskonkurrenten der Fische
- ☒ sie unterhöhlen Ufer und Dämme
- ☐ sie vertreiben die Fische aus ihrem Revier

369 Welche Stoffe haben besondere Bedeutung als Pflanzennährstoffe in Gewässern?

- ☐ Edelgase
- ☐ Kies und Geröll
- ☒ Phosphate und Nitrate

1.402 Welche Tierarten gehören zu den Amphibien?

- ☐ Wasserschildkröte und Griechische Landschildkröte
- ☐ Kreuzotter und Würfelnatter
- ☒ Wasserfrosch und Gelbbauchunke

1.421 Welche Tiere sind in einem Forellengewässer typische Fischnährtiere?

- ☐ Wasserflöhe
- ☒ Bachflohkrebse
- ☐ Mückenlarven

Sachgebiet: Gewässerkunde

1.398 Welche Vogelarten ernähren sich hauptsächlich von Fisch?

- ☒ Kormoran und Graureiher
- ☐ Schwan und Graugans
- ☐ Kranich und Seeadler

805 Welche Wasseruntersuchungen sollte ein Fischereiverein mindestens durchführen können?

- ☐ Gesamt-Phosphor-Gehalt, Eisengehalt
- ☒ pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Temperatur
- ☐ Stickstoff-, Chrom- und Ammoniakgehalt

745 Welche Zone des Sees ist im Hinblick auf den Fischzuwachs die ertragreichste?

- ☐ die lichtlose Tiefe
- ☒ die Uferzone
- ☐ die Freiwasserzone

1.422 Welche zugefrorenen Gewässer neigen besonders stark zur Ausstückung?

- ☒ besonders kleine Gewässer, die keinen Zufluß haben
- ☐ schnell fließende Fließgewässer
- ☐ große durchflossene Gewässer

1.423 Welchem Zweck dient die Entnahme von Wasserproben bei Fischsterben?

- ☐ sie dient dem Vergleich mit anderen Gewässern
- ☐ sie dient der Beruhigung der Öffentlichkeit
- ☒ sie dient zur Ermittlung von Ursachen und Verursachern

1.425 Welcher Fisch bevorzugt die Freiwasserzone?

- ☒ Zander
- ☐ Wels
- ☐ Brassen (Blei)

1.426 Welcher Fisch kommt natürlicherweise auch in Gebirgsseen vor?

- ☐ Wels
- ☒ Elritze
- ☐ Barbe

1.427 Welcher Grundsatz ist bei jeglichem Fischbesatz im Gewässer zu beachten?

- ☐ die Menge des Besatzes richtet sich nach der Gewässertiefe
- ☒ die Menge des Besatzes muß der Nahrungsgrundlage und dem Gewässertyp angepasst sein
- ☐ die Menge des Besatzes richtet sich nach dem gesetzlichen Mindestmaß der Fische

1.424 Welcher Käfer lebt im Süßwasser als räuberischer Schwimmkäfer?

- ☒ Gelbrandkäfer
- ☐ Junikäfer
- ☐ Kolbenwasserkäfer

349 Welcher pH-Wert ist für die heimischen Fische am günstigsten ?

- ☐ um 3
- ☐ um 10
- ☒ um 7

1.428 Welcher Wasservogel ernährt sich vorwiegend von Fischen?

- ☐ Schwan
- ☐ Stockente
- ☒ Haubentaucher

1.429 Welches Merkmal kennzeichnet ein eutrophes Standgewässer?

- ☐ klares Wasser mit geringer Planktonkonzentration (große Sichttiefe)
- ☒ getrübbtes Wasser mit hoher Planktonkonzentration (geringe Sichttiefe)
- ☐ starker Bewuchs entlang des Uferbereichs

Sachgebiet: Gewässerkunde

743 Welches Wasser ist für die Bachforelle vorteilhaft?

- ☐ reißendes, weiches und leicht trübes Wasser
 - ☐ strömendes, warmes und klares Wasser
 - ☒ fließendes, sommerkaltes und sauerstoffreiches Wasser
-

1.431 Wie alt sollten Besatzfische in der Regel sein?

- ☐ stets fangreife Fische
 - ☒ ein- oder zweisömmrige Setzlinge
 - ☐ stets nur Fischbrut
-

370 Wie bezeichnet man ein sehr nährstoffarmes Gewässer?

- ☐ eutroph
 - ☐ mesotroph
 - ☒ oligotroph
-

1.169 Wie füttert man in Fließgewässern an?

- ☒ man füttert oberhalb der Angelstelle mit möglichst wenig Futter an
 - ☐ das Futter wird an der Angelstelle in reichlicher Menge eingebracht
 - ☐ das Anfüttern in Fließgewässern ist generell verboten
-

1.432 Wie füttert man sinnvoll und gewässerverträglich an?

- ☐ nur mit Brot
 - ☒ in kleinen Mengen
 - ☐ in großen Mengen zum Anlocken vieler Fische
-

1.433 Wie gelangen unter natürlichen Verhältnissen Pflanzennährstoffe in Fließgewässer?

- ☐ durch Anbindung des Fließgewässers an nährstoffreiche Standgewässer und Moore
 - ☒ aus den von Regen und Grundwasser durchzogenen Boden- und Gesteinsschichten des Einzugsgebietes
 - ☐ sie entstehen durch die im Gewässer vorkommende Fauna
-

1.434 Wie gelangt Sauerstoff ins Wasser?

- ☐ nur durch Austausch mit der Atmosphäre und durch Niederschläge
 - ☐ nur durch Assimilation der Wasserpflanzen
 - ☒ aus der Atmosphäre und durch die Wasserpflanzen
-

357 Wie ist die richtige Reihenfolge der fischereibiologischen Regionen der Fließgewässer?

- ☐ Forellenregion-Barbenregion-Brackwasserregion-Äschenregion-Bleiregion
 - ☒ Forellenregion-Äschenregion-Barbenregion-Bleiregion-Brackwasserregion
 - ☐ Äschenregion-Barbenregion-Bleiregion-Forellenregion-Brackwasserregion
-

353 Wie ist ein eutrophes Gewässer beschaffen?

- ☐ arm an Pflanzennährstoffen
 - ☒ reich an Pflanzennährstoffen
 - ☐ vollkommen ohne Pflanzennährstoffe
-

1.435 Wie ist ein Kolk aus fischereilicher Sicht zu beurteilen?

- ☐ er ist sauerstoffärmer als die Strommitte und wird deshalb von den Fischen gemieden
 - ☐ er ist wegen möglichen Prädatoren ein für Fische ungeeigneter Standplatz
 - ☒ er ist ein guter Estand und Winterlager für viele Fischarten
-

33 Wie kann die anhaltende Abwasserbelastung eines Gewässers festgestellt werden?

- ☐ durch regelmäßige Elektrofischungen
 - ☐ durch regelmäßige Temperaturmessungen
 - ☒ durch regelmäßige Analyse von Kleintieren (Biologische Gewässeruntersuchung)
-

1.684 Wie kann man den natürlichen Zustand eines Gewässers wiederherstellen, wenn Weißfische etc. überhandgenommen haben?

- ☐ von Handlungen kann abgesehen werden, weil sich der Fischbestand in kurzer Zeit von selbst reguliert
- ☒ man befischt die vermehrt auftretenden Arten besonders intensiv und setzt geeignete Raubfische ein
- ☐ man setzt zu den vorhandenen Arten weitere geschlechtsreife Tiere dazu, um eine Degeneration zu erreichen

Sachgebiet: Gewässerkunde

1.437 Wie sind Wasserproben zu entnehmen, wenn der Verdacht einer Wasserverunreinigung besteht?

- ☐ grundsätzlich nur in Laborflaschen
- ☐ in gründlich gesäuberten Glasflaschen bei halber Füllung mit sterilen Verschluss
- ☒ saubere Wasserflaschen sind randvoll unter der Wasseroberfläche zu füllen und möglichst luftfrei zu verschließen

1.438 Wie soll sich ein Angler im Uferbereich von Gewässern grundsätzlich verhalten?

- ☐ der Angelplatz ist so herrichten, dass der Angler gut fischen kann, um seinen Fang sicher landen zu können, entstandener Müll ist mitzuführen
- ☒ er dürfen keine Pflanzen im Wasser und Uferbereich beschädigt oder beseitigt werden, es darf keinen Müll zurücklassen werden
- ☐ Es gibt keine Besonderheiten zu beachten, nur der entstandene Müll muss vergraben oder verbrannt werden

1.449 Wie unterscheiden sich Fischteiche von Seen?

- ☒ Fischteiche sind angelegte, ablassbare Gewässer zum Zwecke der fischereilichen Bewirtschaftung
- ☐ Teiche und Seen sind im Grunde das Gleiche, sie werden nur in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich bezeichnet
- ☐ Teiche sind kleine flache Seen, historischen Ursprungs zur Naherholung

1.628 Wie verhalten sich Fische in einer plötzlichen Sauerstoffmangelsituation in Teichen?

- ☒ sie sammeln sich am Gewässerzulauf, stehen oberflächennah und schnappen nach Luft
- ☐ sie steigern ihre Nahrungsaufnahme, um genügend Energie für die Mangelsituation bereitzustellen
- ☐ spielt bei Teichfischen keine Rolle

1.440 Wo findet man gehäuft Wasserasseln?

- ☒ in Gewässern, mit Abwasserbelastung
- ☐ in tiefen, gut durchmischten Seen
- ☐ in naturnahen klaren Bergbächen

376 Wo leben Schlammröhrenwürmer (Tubifex)?

- ☒ im Gewässerboden
- ☐ im Freiwasser schwebend
- ☐ unter Steinen

14 Wo müssen bei einem Fischsterben in einem Fließgewässer Wasserproben entnommen werden?

- ☐ dicht über dem Grund des Gewässers
- ☐ nur in der Gewässermitte
- ☒ aus verdächtigen Einleitungen sowie unterhalb und oberhalb derselben

1.441 Wo sind die Fischnährtiere eines Gebirgsbaches überwiegend zu finden?

- ☐ frei im Wasser schwimmend
- ☒ auf, zwischen und unter Steinen
- ☐ an der Wasseroberfläche

1.442 Wo sind Wasserproben, die nicht an Ort und Stelle untersucht werden können, bis zur Untersuchung aufzubewahren?

- ☐ außerhalb der Wohnung
- ☒ im Kühlschrank
- ☐ möglichst in geheizten Räumen

1.443 Wodurch kann u.a. die natürliche Fischbiozönose in einem Gewässer dauerhaft gestört werden?

- ☒ durch einen Besatz mit nicht heimischen Fischen
- ☐ durch die Ausbreitung und Ansiedlung des Nutria
- ☐ durch ein vermehrtes Auftreten von Wasservögeln

1.444 Wodurch wird in vielen Fällen das biologische Gleichgewicht eines Gewässers gestört?

- ☐ durch das Verbot des Fischens mit lebenden Köderfischen
- ☒ durch ungeeigneten, einseitigen Fischbesatz
- ☐ durch die Einbringung von Amphibienlaich

Sachgebiet: Gewässerkunde

1.445 Woher kommen für gewöhnlich die Pflanzennährstoffe in Fließgewässern?

- ☒ aus Einschwemmstoffen und Niederschlägen
- ☐ sie werden vom Plankton in Wassersäule gebildet
- ☐ aus den Sedimentschichten des Fließgewässers

884 Woher kommt das Grundwasser?

- ☐ durch tektonische oder vulkanische Erdrindenverlagerung.
- ☒ durch versickerte Niederschläge, die sich über dichteren Bodenschichten ansammeln.
- ☐ durch unterirdische chemische Verbindung von Sauerstoff und Wasserstoff

360 Womit beginnt die Nahrungskette in Gewässern?

- ☒ mit einzelligen Algen
- ☐ mit kleinen Fischarten
- ☐ mit den Insektenlarven der Forellenregion

1.446 Wonach erfolgt die biologische Beurteilung eines Gewässers?

- ☐ nach dem pH-Wert
- ☐ nach dem Sauerstoffgehalt
- ☒ nach den im Gewässer vorkommenden Leitorganismen

1.447 Wonach sollten sich Besatzmaßnahmen richten?

- ☐ nach dem Volumen des Gewässers, je größer und tiefer ein Gewässer desto zielversprechender sind Besatzmaßnahmen
- ☐ nach der Anzahl der Angler und dem dadurch zu Grunde liegenden Angeldruck
- ☒ nach den natürlichen Nahrungsverhältnissen und dem Charakter des Gewässers

744 Wonach werden die unterschiedlichen Fließgewässerregionen fischereilich benannt?

- ☐ nach dem Vorkommen bestimmter Fischnährtiere
- ☒ nach dem typischen Leitfisch der Region
- ☐ nach geographischen Gegebenheiten (z.B. Gebirge, Flachland)

1.448 Woraus setzt sich pflanzliches Plankton hauptsächlich zusammen?

- ☐ aus kleinen, mehrzelligen Wasserpflanzen
- ☒ aus einzelligen Blau-, Grün- und Kieselalgen
- ☐ aus Bakterien und Wasserpilzen

1.450 Wozu dient der Hegeplan?

- ☒ zur Festlegung fischereilicher Maßnahmen an einem Gewässer unter ökologischen Gesichtspunkten
- ☐ zur finanziellen Gleichbehandlung der Mitglieder der Fischereigenossenschaft
- ☐ zur Attraktivitätssteigerung des Angelgewässers

1.451 Wozu dient die Fangstatistik?

- ☐ um Fänge besonders großer Fische nachzuweisen
- ☒ als Grundlage für eine ordnungsgemäße fischereiliche Bewirtschaftung
- ☐ zur Aufzeichnung des persönlichen fischereilichen Erfolges

1.452 Zweimal im Jahr hat das Wasser in tiefen, stehenden Gewässern vom Grund bis zur Oberfläche die gleiche Temperatur. Das gesamte Wasser vermischt sich. Wann ist dies der Fall?

- ☐ im Sommer und Herbst
- ☒ im Frühjahr und Herbst
- ☐ im Winter und Sommer

Sachgebiet: Spezielle Fischkunde

1.189 Moderlieschen sind nicht einfach zu bestimmen. Was zeichnet sie aus?

- ☒ die Seitenlinie ist sehr kurz und unvollständig
- ☐ das Maul ist wegen der bodennahen Lebensweise unterständig
- ☐ die Afterflosse zieht sich von den Bauchflossen bis zur Afterflosse als Saum

650

Es gibt verschiedene Zuchtformen des Karpfens. Eine dieser Zuchtformen hat keine oder nur vereinzelte Schuppen.

Welche?

- ☐ Zeilenkarpfen
- ☐ Spiegelkarpfen
- ☒ Lederkarpfen

1.186 Ab welcher Länge ist beim Aal die Bestimmung des Geschlechtes sicher möglich?

- ☐ von 45 cm
- ☐ von 25 cm
- ☒ von 70 cm

1.843 Abgebildet ist hier ein für Sachsen sehr seltener, früher vorkommender Fisch. Um welche Art handelt es sich?

- ☐ Zope
- ☒ Maifisch
- ☐ Schneider

1.187 Aland und Döbel haben beide rötlich gefärbte Flossen auf der Bauchseite. Wie werden beide sicher unterschieden?

- ☐ der Döbel hat kleine Schuppen und eine konkave Afterflosse
- ☐ der Aland hat ein großes endständiges Maul und eine konvexe Afterflosse
- ☒ der Aland hat kleine Schuppen und eine konkave Afterflosse

151 Aland, Döbel und Hasel können leicht verwechselt werden. Doch nur bei einem dieser drei Fische stehen Rücken- und Bauchflossenansatz nicht auf gleicher Höhe. Die leicht nach hinten versetzte Rückenflosse finden wir:

- ☒ beim Aland
- ☐ beim Döbel
- ☐ beim Hasel (Häsling)

1.807 Alle in den Antworten genannten Fische besitzen 6 Barteln. Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?

- ☐ Europäischer Wels
- ☒ Bachschmerle
- ☐ Steinbeißer

1.188 Allgemein kann der Rogen der Fische sehr schmackhaft sein. Doch Vorsicht! Welcher Fisch hat während der Laichzeit giftigen Rogen?

- ☐ Wels
- ☐ Stör
- ☒ Barbe

1.190 An welchem äußeren Merkmal kann man Karpfen und Karauschen eindeutig unterscheiden?

- ☐ an der Beschuppung
- ☐ an der Länge der Rückenflosse
- ☒ er Karpfen hat Barteln, die Karausche besitzt keine

576 An welchen äußeren Merkmalen kann man das Geschlecht fortpflanzungsfähiger Schleien eindeutig erkennen?

- ☐ an der Färbung
- ☐ an der Rückenflosse
- ☒ an den Bauchflossen

193 Augen sind wichtig für den Beutefang.

Bei welcher Fischart besonders?

- ☐ Wels
- ☐ Aal
- ☒ Hecht

Sachgebiet: Spezielle Fischkunde

1.831 Bei der abgebildeten Fischart handelt es sich um *Coregonus albula* (L.). Nennen Sie die korrekte deutsche Bezeichnung.

- ☒ Kleine Maräne
☐ Große Maräne
☐ Stint

1.848 Bei der dargestellten Fischart nimmt das Männchen zur Laichzeit ein prächtiges Laichkleid an, welche ist es?

- ☐ Elritze
☒ Bitterling
☐ Rotaugen

1.193 Bei welchem Fisch ist die Schwanzflosse gerundet?

- ☐ Karpfen
☒ Quappe
☐ Barbe

1.192 Bei welchem Fisch ist die Schwanzflosse kaum eingebuchtet?

- ☒ Schleie
☐ Karpfen
☐ Perlfisch

580 Bei welchem Fisch spielt die zusätzliche Darmatmung eine bedeutende Rolle?

- ☐ beim Hecht
☐ beim Hering
☒ beim Schlammpeitzger

915 Bei welchem im Wasser lebenden Wirbeltier werden die Larven als Querder bezeichnet?

- ☐ Aal
☐ Groppe
☒ Neunauge

1.194 Bei welchen Fischen ist die Leberfarbe nicht dunkelrot?

- ☐ Bachforelle, Groppe
☒ Hecht, Quappe
☐ Karpfen, Aal

1.195 Bei welcher der drei Aufstellungen a), b) oder c) ist die Anzahl der den Fischen zugeordneten Barteln richtig?

- ☐ Karpfen 6 - Schleie 1 - Barbe 2 - Quappe 4 - Wels 2 - Gründling 4
☐ Karpfen 4 - Schleie 2 - Barbe 2 - Quappe 6 - Wels 4 - Gründling 1
☒ Karpfen 4 - Schleie 2 - Barbe 4 - Quappe 1 - Wels 6 - Gründling 2

1.658 Bei welcher Fischart besteht die Hauptnahrung auch als ausgewachsener Fisch aus tierischem Plankton ?

- ☐ Äsche
☐ Bachforelle
☒ Kleine Maräne

517 Bei welcher Fischart ist das Maul oberständig?

- ☒ Rapfen
☐ Döbel
☐ Zander

313 Bei welcher Fischart ist das Maul unterständig?

- ☐ Bachforelle
☐ Hecht
☒ Nase

314 Bei welcher Fischart kann man sich an den Spitzen der Flossenstrahlen verletzen?

- ☐ Schleie
☐ Hecht
☒ Zander

Sachgebiet: Spezielle Fischkunde

1.197 Bei welcher Krebsart ist die Unterseite der Scheren meist rot?

- ☐ Amerikanischer Flusskreb
- ☐ Galizischer Krebs
- ☒ Edelkreb

316 Beim Hecht finden wir eine auffällige Platzierung der Rückenflosse. Wo sitzt die Rückenflosse?

- ☒ weit hinten
- ☐ weit vorn
- ☐ in der Mitte

1.793 Das Weibchen ist in der Laichzeit mit einer Legeröhre ausgestattet. Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?

- ☐ Elritze
- ☐ Schneider
- ☒ Bitterling

581 Der Flußbarsch hat ...?

- ☐ Rundschuppen
- ☒ Kammschuppen
- ☐ keine Schuppen

1.198 Der Flussbarsch hat brustständige Bauchflossen. Was bedeutet das?

- ☐ Bauchflossen vor den Brustflossen
- ☒ Bauchflossen unter den Brustflossen
- ☐ keine Brustflossen, dafür nur Bauchflossen

556 Der Hecht hat ...?

- ☐ zwei Rückenflossen
- ☐ Stachelstrahlen in der Rückenflosse
- ☒ eine weit nach hinten zurückgesetzte Rückenflosse

1.199 Der Hecht hat neben den großen Fangzähnen eine Vielzahl kleiner, spitzer, nach hinten gerichteter Zähne, die einen Teil großen des Maules ausfüllen. Wie bezeichnet man diese Art von Zähnen?

- ☐ Hundszähne
- ☒ Hechelzähne
- ☐ Fangzähne

1.200 Der heimische Edelkreb wird durch den die Krebspest übertragenden Kamberkreb stark gefährdet. Wie unterscheidet man die Arten?

- ☐ der Edelkreb hat im seitlichen Kopfbereich deutliche Dornen, der Kamberkreb hat am gesamten Körper keine Dornen
- ☐ der Edelkreb hat lange schmale Scheren, der Kamberkreb hat große wuchtige Scheren
- ☒ der Kamberkreb hat dunkelrot gefärbte Querbinden auf dem Schwanzteil, der Edelkreb kräftig rot gefärbte Schergelenke, Scherunterseiten

1.841 Die dargestellte Fischart hat in Sachsen kein natürliches Vorkommen. Um welche Fischart handelt es sich?

- ☐ Bachsaibling
- ☒ Seesaibling
- ☐ Regenbogenforelle

1.766 Die Form der Rückenflosse ist charakteristisch für diesen Cypriniden, welcher ist gemeint?

- ☐ Giebel
- ☐ Schuppenkarpfen
- ☒ Karausche

1.201 Die Goldorfe ist eine Farbspielart des

- ☐ Giebel
- ☒ Aland
- ☐ Karpfen

1.857 Die hier abgebildete Fischart ist häufig in anderer Farbvariante in Gartenteichen zu finden, welche ist gemeint?

- ☐ Giebel
- ☐ Plötze
- ☒ Aland

Sachgebiet: Spezielle Fischkunde

- 1.839 Die hier abgebildete Fischart kommt als stationäre aber auch als wandernde Form mit unterschiedlicher Namensgebung vor. Um welche handelt es sich?
- ☐ Döbel, Dickkopf
 - ☒ Nordseeschnäpel, Große Maräne
 - ☐ Zährte, Rußnase

- 1.784 Die hier abgebildete Teichmuschel lebt in Symbiose mit einer Fischart. Welche Fischart ist das?
- ☐ Schneider
 - ☒ Bitterling
 - ☐ Ukelei

- 1.202 Die Unterscheidung zwischen Schmerle und Steinbeißer gelingt sicher anhand der Barteln.
- ☒ der Steinbeißer hat nur sehr kurze Barteln
 - ☐ die Barteln der Schmerle befinden sich auf dem Unterkiefer
 - ☐ der Steinbeißer hat sechs Barteln am Oberkiefer und vier am Unterkiefer

- 156 Die Urform der Karpfen ist der...
- ☐ Lederkarpfen
 - ☐ Spiegelkarpfen
 - ☒ Wildkarpfen

- 1.767 Diese Fischart zeichnet sich durch eine Besonderheit aus. Welche ist das?
- ☐ ein anadromer Wanderfisch
 - ☒ ein katadromer Wanderfisch
 - ☐ ein Standfisch

- 1.757 Diese Fischart zeichnet sich durch eine Besonderheit aus. Welche ist das?
- ☐ ein anadromer Wanderfisch
 - ☒ ein katadromer Wanderfisch
 - ☐ ein Standfisch

- 1.840 Diese Salmonidenart hat vom 1. Oktober bis 30. April Schonzeit. Welche Fischart mit zugehörigem Mindestmaß ist in der Abbildung dargestellt?
- ☐ Bachforelle, Mindestmaß 28 cm
 - ☐ Regenbogenforelle, Mindestmaß 25 cm
 - ☒ Meerforelle, Mindestmaß 60 cm

- 1.866 Dieser nichtheimische, eingeschleppte Kleinfisch tritt oft in Massen auf. Um welche Art handelt es sich?
- ☐ Moderlieschen
 - ☒ Blaubandgründling
 - ☐ Ukelei

- 1.864 Drei bevorzugt am Boden lebende Bartelträger mit ähnlichem Körperbau finden wir in Sachsen. Welche Fischart ist hier abgebildet?
- ☐ Schlammpeitzger
 - ☒ Schmerle
 - ☐ Steinbeißer

- 1.203 Ein Fisch ist durch seine weiß-schwarz abgesetzten Bauchflossen und schwarz gerandeten Afterflosse unter den Salmoniden leicht zu erkennen. Es handelt sich um:
- ☐ Meerforelle
 - ☐ Äsche
 - ☒ Bachsaibling

- 651 Ein karpfenartiger Fisch zeigt häufig einen schwarzen Fleck auf der Schwanzwurzel, welcher?
- ☒ Karausche
 - ☐ Giebel
 - ☐ Schuppenkarpfen

- 925 Ein mit Hornzähnen besetztes Maul ist typisch für?
- ☒ Neunaugen
 - ☐ Aal
 - ☐ Wels

Sachgebiet: Spezielle Fischkunde

329	Ein typischer Fisch mit pfeilförmiger Körperform wird gesucht. Es ist der...	☒ Hecht ☐ Karpfen ☐ Blei
1.855	Eine bodenorientierte Lebensweise ist für die genannten Fischarten typisch. Welche Art wird hier gezeigt?	☐ Schmerle ☐ Gründling ☒ Steinbeißer
648	Eine kleinfäulige Fischart mit Fettflosse ist durch ihre große Rückenflosse (Fahne) unverwechselbar. Diese Fahne finden wir:	☐ beim Lachs ☐ bei der Bachforelle ☒ bei der Äsche
1.847	Einen ganzjährigen Schutzstatus besitzt die abgebildete Fischart, welche ist es?	☐ Schmerle ☐ Steinbeißer ☒ Schlammpeitzger
1.204	Einen Teil ihrer Entwicklung durchläuft die Flussperlmuschel...	☐ angeheftet an bestimmte Wasserinsektenlarven ☒ angeheftet an den Kiemen von jungen Bachforellen ☐ parasitisch im Darm von Fischen
1.205	Einer der aufgeführten Fische besitzt keine Hartstrahlen in der ersten Rückenflosse:	☐ Zander ☒ Quappe ☐ Flussbarsch
1.206	Einige ausgewachsene Cypriniden verhalten sich wie Raubfische. Das beobachten wir bei:	☒ Döbel und Rapfen ☐ Karpfen und Blei ☐ Elritze und Rotfeder
649	Einige der aufgeführten Fische stellen nur geringe Sauerstoffansprüche. Es sind:	☒ Schleie, Karausche ☐ Bachforelle, Äsche ☐ Hecht, Zander
1.207	Einige der aufgeführten Fische zählen wir zu den Salmoniden:	☒ Meerforelle, Lachs, Huchen ☐ Hecht, Zander, Flussbarsch ☐ Schleie, Karausche, Karpfen
644	Fische stellen unterschiedliche Ansprüche an den Sauerstoffgehalt eines Gewässers. Den höchsten Sauerstoffbedarf haben:	☐ Schleien ☐ Barsche ☒ Forellen
1.208	Flusskrebse zählen nicht zu den Wirbeltieren. Wie sind sie richtig zu töten?	☐ Krebse werden durch Herzstich getötet ☒ Krebse dürfen nur getötet werden, indem man sie einzeln in kochendes Wasser wirft ☐ Krebse müssen vor dem Töten durch einen kräftigen Schlag auf dem Kopf betäubt werden
1.209	Für welche adulte Salmonidenart sind rote Punkte im Farbkleid typisch?	☐ Regenbogenforelle ☒ Bachforelle ☐ Lachs

Sachgebiet: Spezielle Fischkunde

584 Für welche Fischart ist ein entenschnabelförmiges Maul charakteristisch?

- ☐ Lachs
- ☐ Karpfen
- ☒ Hecht

1.210 Giebel und Karausche sind nicht einfach zu unterscheiden. Welche Bestimmungsmerkmale treffen zu?

- ☒ der Giebel hat weniger Schuppen in der Seitenlinie, die Schuppen sind größer als die der Karausche
- ☐ die Karausche hat große Schuppen und zwei Barteln
- ☐ der Giebel hat eine konvexe Rückenflosse, die Schuppen sind kleiner als die der Karausche

1.211 Hasel und Döbel bewohnen rasch fließende Gewässer. Wie kann man diese Arten sicher unterscheiden?

- ☒ die Maulstellung beim Hasel ist unterständig
- ☐ als Oberflächenfisch hat der Hasel ein oberständiges Maul
- ☐ der Döbel hat mehr Schuppen in der Seitenlinie

1.212 Häufig werden Schmerle und Schlammpeitzger verwechselt. Wie bestimmt man sie sicher?

- ☐ die Barteln der Schmerle sind nur mit der Lupe sichtbar
- ☐ der Schlammpeitzger hat acht Barteln, die Schmerle hat vier Barteln
- ☒ die Schmerle hat sechs Barteln, der Schlammpeitzger 10 Barteln

1.213 Im Maul des Zanders fallen auf den Kiefern deutlich kräftige Zähne auf. Sie dienen zum Halten der Beute. In der Fachsprache heißen sie:

- ☐ Hechelzähne
- ☒ Hunds- oder Fangzähne
- ☐ Säge- oder Haltezähne

572 In welchem Gebiet laichen die europäischen Aale?

- ☐ in der Barentssee
- ☐ in der Adria
- ☒ in der Sargassosee

1.214 Ist die Größe beim Aal vom Geschlecht abhängig?

- ☐ nein, beide Geschlechter werden gleich groß
- ☒ ja, das Weibchen wird größer
- ☐ ja, das Männchen wird größer

1.215 Lassen sich abwandernde Junglachse (Smolts) von etwa gleichgroßen Bachforellen unterscheiden?

- ☐ nein, beide sehen völlig gleich aus
- ☐ ja, nur Junglachse haben eine rot gefärbte Fettflosse
- ☒ ja, man kann die Junglachse an ihren größeren Brustflossen und an ihrer Färbung erkennen

1.837 Meerforelle, Bachforelle, und Seeforelle gehören einer Art an. Welche Form ist hier zu sehen?

- ☐ Meerforelle
- ☒ Bachforelle
- ☐ Seeforelle

1.217 Wann bildet ein Hechtweibchen in der Regel das erste Mal Rogen aus?

- ☐ nach Vollendung des ersten Lebensjahres
- ☐ nach Vollendung des zweiten Lebensjahres
- ☒ nach Vollendung des dritten Lebensjahres

1.659 Wann ist die Laichzeit des Bleis (Brassen)?

- ☐ im Spätherbst
- ☐ im Winter
- ☒ im Frühjahr/Sommer

248 Wann laichen Karpfen?

- ☐ von Oktober bis Dezember
- ☐ von Januar bis März
- ☒ von Mai bis Juli

Sachgebiet: Spezielle Fischkunde

839 Wann laichen Schleien?

- ☐ von Oktober bis Dezember
 - ☒ von Mai bis Juli
 - ☐ von Januar bis Februar
-

930 Wann laicht der Hecht?

- ☐ von Oktober bis Dezember
 - ☒ von Februar bis April
 - ☐ von Juli bis September
-

528 Wann laicht der Zander?

- ☒ April/ Mai
 - ☐ Dezember/ Januar
 - ☐ Juli/ August
-

1.218 Was bedeutet die Bezeichnung Spitzkopfaal?

- ☐ sie kennzeichnet eine besondere Aalart
 - ☒ sie verweist auf eine ernährungsbedingte Kopfform
 - ☐ sie wird für Aale verwendet, die bevorzugt nur in Bächen leben
-

1.219 Was bezeichnet man als Glasaal ?

- ☐ den ernährungsbedingten Kümmerwuchs eines Aals
 - ☒ einen Aal im Jugendstadium mit durchscheinendem Körper
 - ☐ einen hellgefärbten Aal auf sandigem Untergrund
-

1.756 Was hat diese Fischart für eine Beschuppung?

- ☒ Rundschuppen
 - ☐ keine Schuppen
 - ☐ Kammschuppen
-

1.765 Was hat diese Fischart für eine Beschuppung?

- ☒ Rundschuppen
 - ☐ keine Schuppen
 - ☐ Kammschuppen
-

1.660 Was ist ein Blankaal?

- ☐ der hellgefärbte Jungaal
 - ☒ der zum Laichen abwandernde Aal
 - ☐ Farbform des Aals in Gewässern mit hellem Untergrund
-

1.220 Was ist ein charakteristisches Merkmal der Äschen?

- ☒ große, lange Rückenflosse
 - ☐ keine Schuppen
 - ☐ große Afterflosse und eine auffällig gefärbte Fettflosse
-

838 Was ist ein Glasaal?

- ☐ die Aallarve unmittelbar nach dem Schlüpfen
 - ☒ der Jungaal nach der Umwandlung der Larve
 - ☐ der Jungaal nach der Pigmentierung
-

1.221 Was ist ein Satzaal?

- ☒ Jungaale mit einem Gewicht zwischen 15 g - max. 80 g zu Besatzzwecken
 - ☐ Aale mit einer Länge von 50 cm zu Besatzzwecken
 - ☐ eine in Europa nicht vorkommende Aalart
-

569 Was ist ein typisches Merkmal der Plötze?

- ☒ Rotfärbung des Auges
- ☐ große, lange Rückenflosse
- ☐ keine Schuppen

Sachgebiet: Spezielle Fischkunde

1.222 Was unterscheidet eine junge Bachforelle von einem gleichgroßen Lachs?

- ☐ er Lachs hat eine rötlich bis orange gefärbte Fettflosse
- ☐ die Bachforelle hat zwischen Fettflosse und Seitenlinie weniger Schuppen
- ☒ die Knochenplatten am Kiemendeckel der Bachforelle berühren sich in einem Punkt

1.661 Was versteht man unter einer Weidenblattlarve?

- ☐ Gallwespe, die in Weidenblättern nistet und deren Larven gern von Fischen gefressen werden
- ☒ Jugendstadium des Aals, das einem Weidenblatt ähnelt
- ☐ ein häufig auftretendes morphologisches Merkmal in der Entwicklung von Wasserinsekten

1.224 Welche Antwort ist richtig?

- ☐ Flussskrebse sind Bodenlaicher, die Männchen graben Vertiefungen im Uferbereich, in welche das Weibchen ihre befruchteten Eier ablegt
- ☐ das Krebsweibchen heftet ihre Eier an Wurzeln und Totholz
- ☒ das Krebsweibchen trägt die Eier unter dem Schwanz mit sich, bis die jungen Krebse schlüpfen

579 Welche Art der Körperbedeckung haben die Stichlinge?

- ☒ Knochenplatten
- ☐ Kammschuppen
- ☐ Rundschuppen

841 Welche Arten gehören zu den Rundmäulern?

- ☐ Weißfische, Barsche und Forellen
- ☒ Bach- und Flussneunauge
- ☐ Störe

1.226 Welche Aussage über das Skelett der Neunaugen ist richtig?

- ☐ sie haben kein Stützskelett
- ☐ sie haben ein Knochenskelett
- ☒ sie haben ein knorpeliges Skelett

85 Welche Besatzkombination ist in flachen, weichgründigen Standgewässern mit ausgeprägten Wasserpflanzenbeständen sinnvoll?

- ☒ Schleie und Hecht
- ☐ Bachforelle und Äsche
- ☐ Groppe und Hasel

1.823 Welche Besonderheit zeigt sich bei der hier abgebildeten Fischart?

- ☐ Kammschuppen
- ☒ keine Schuppen, dafür Knochenplatten
- ☐ Rundschuppen

1.228 Welche der aufgeführten Fische besitzen vier Barteln?

- ☒ Karpfen, Barbe
- ☐ Schleie, Gründling
- ☐ Wels, Schmerle

185 Welche der aufgeführten Fische hat acht Barteln?

- ☐ der Wels
- ☒ der Zwergwels
- ☐ die Barbe

549 Welche der aufgeführten Fische wurden bei uns eingeführt?

- ☐ Bachforelle, Barbe, Äsche
- ☒ Bachsaibling, Regenbogenforelle, Zwergwels
- ☐ Aal, Hecht, Plötze

1.845 Welche der drei Beschreibungen bezieht sich auf das dargestellte Tier?

- ☐ Aal, katadromer Wanderfisch
- ☒ Flussneunauge, anadromes Rundmaul
- ☐ Steinbeißer, stationärer Bodenbewohner

Sachgebiet: Spezielle Fischkunde

586 Welche Fischart besitzt nur eine Bartel am Maul?

- ☐ Aal
☒ Quappe
☐ Barbe
-

1.235 Welche Fischart hat bei gleicher Körpergröße außergewöhnlich große Schuppen an Schwanzstiel und Flossenansätzen?

- ☐ Schuppenkarpfen
☒ Spiegelkarpfen
☐ Blei (Brassen)
-

1.236 Welche Fischart hat bei gleicher Körperlänge die größere Maulspalte?

- ☐ Zander
☒ Hecht
☐ Flussbarsch
-

1.232 Welche Fischart hat den höchsten Sauerstoffbedarf?

- ☒ Bachsaibling
☐ Aal
☐ Schleie
-

1.237 Welche Fischart hat ein unterständiges Maul?

- ☒ Barbe
☐ Aland
☐ Karpfen
-

1.238 Welche Fischart hat keine Schwimmblase?

- ☒ Groppe
☐ Hecht
☐ Zander
-

1.233 Welche Fischart kann das Maul rüsselartig vorstrecken?

- ☒ Blei (Brassen)
☐ Hecht
☐ Stichling
-

1.239 Welche Fischart kann das Maul rüsselartig vorstülpen?

- ☐ Rapfen
☐ Döbel
☒ Karpfen
-

1.240 Welche Fischart lebt im Süßwasser und trägt ein leuchtend rotes Hochzeitskleid?

- ☐ Rotbarsch
☐ Flußbarsch
☒ Männchen des Dreistachligen Stichlings
-

1.663 Welche Fischart steht bei abnehmendem Sauerstoffgehalt in einem Gewässer zuerst an der Oberfläche und schnappt nach Luft (Notatmung)?

- ☒ Bachforelle
☐ Döbel
☐ Barbe
-

1.664 Welche Fischart wurde aus Nordamerika eingeführt?

- ☐ Äsche
☒ Regenbogenforelle
☐ Meerforelle
-

795 Welche Fischarten bewachen ihre Eier?

- ☐ Plötze und Rotfeder
☒ Zander und Wels
☐ Hecht und Barsch
-

Sachgebiet: Spezielle Fischkunde

1.227 Welche Fische bekommen Laichausschlag?

- ☐ Aale
 - ☐ Hechte
 - ☒ Bleie, (Brassen)
-

1.243 Welche Fische gehören zu den Cypriniden?

- ☒ Gründling und Elritze
 - ☐ Bachforelle und Äsche
 - ☐ Flussbarsch und Zander
-

853 Welche Fische gehören zu den Dorschartigen?

- ☒ der Kabeljau und die Quappe
 - ☐ die Plötze und der Blei
 - ☐ der Hecht und der Zander
-

1.244 Welche Fische gehören zur Familie der Schmerlen?

- ☐ Gründling und Elritze
 - ☐ Barbe und Groppe
 - ☒ Schlammpeitzger und Steinbeißer
-

1.662 Welche Fische gehört zu den Cypriniden?

- ☒ Gründling, Elritze, Moderlieschen
 - ☐ Zander, Barsch, Hecht
 - ☐ Quappe, Aal, Wels
-

1.245 Welche Fische haben Kammschuppen?

- ☐ Aal und Güster
 - ☒ Zander und Flussbarsch
 - ☐ Döbel und Karausche
-

1.246 Welche Fische haben keinen Magen?

- ☐ Zander und Hecht
 - ☒ Schleie und Karausche
 - ☐ Zwergwels und Kaulbarsch
-

1.666 Welche Fische haben Schlundzähne?

- ☐ Forelle, Hecht und Zander
 - ☒ Blei, Rotfeder und Karpfen
 - ☐ Dorsch, Streber und Flussbarsch
-

1.247 Welche Fische rauben hauptsächlich nachts, wo das Sehvermögen eine nicht so große Rolle spielt?

- ☐ Hecht und Zander
 - ☐ Saibling und Lachs
 - ☒ Wels und Aal
-

1.229 Welche Fische sind Kieslaicher?

- ☒ die Äsche, die Nase und die Barbe
 - ☐ der Hecht, der Zander, der Flussbarsch
 - ☐ der Karpfen, die Schleie, die Karausche und die Plötze
-

1.248 Welche Fische sind schuppenlos?

- ☐ Aal und Quappe
 - ☒ Wels und Zwergwels
 - ☐ Steinbeißer und Schmerle
-

253 Welche Fische sind Sommerlaicher?

- ☒ die Karpfenartigen
 - ☐ die Salmoniden
 - ☐ die Hechtartigen
-

Sachgebiet: Spezielle Fischkunde

1.249 Welche Fische sind typische Krautlaicher?

- ☒ Karpfen und Schleie
- ☐ Äsche und Forelle
- ☐ Barbe und Aal

1.250 Welche Fische wandern zum Laichen vom Meer ins Süßwasser?

- ☒ Lachs und Meerforelle
- ☐ Quappe und Hornhecht
- ☐ Aal und Flunder

1.871 Welche Fischfamilie verfügt über eine zweikammerige Schwimmblase mit Schwimmblasengang?

- ☒ Cypriniden
- ☐ Salmoniden
- ☐ Perciden

533 Welche Körperform hat die Güster?

- ☐ torpedoförmig
- ☐ pfeilförmig
- ☒ hochrückig

186 Welche Krebsart darf nicht in heimischen Gewässern ausgesetzt werden, da sie Überträger der Krebspest ist?

- ☐ Edelkrebs
- ☒ Amerikanischer Flusskrebs
- ☐ Steinkrebs

1.251 Welche Krebsart ist hierzulande im Bestand stark gefährdet und muss besonders gefördert werden?

- ☐ der Amerikanische Flusskrebs
- ☒ der Europäische Edelkrebs
- ☐ der Signalkrebs

550 Welche Maulstellung hat der Rapfen?

- ☐ endständig
- ☐ unterständig
- ☒ oberständig

1.667 Welche Merkmale können den Verdacht auf eine Infektion mit der Frühjahrsvirämie des Karpfens (SVC) begründen?

- ☐ abstehende Kiemendeckel, geschwollene Kiemen, Notatmung
- ☒ Glotzaugen, aufgetriebener Leib, Blutergüsse auf Organen und in der Muskulatur
- ☐ zahlreiche weiße Pünktchen auf Haut und Kiemen

1.253 Welche Möglichkeit der Altersbestimmung ist beim Wels gegeben?

- ☐ feststellen der Jahresringe an den Schuppen
- ☒ feststellen der Jahresringe an den Kiemendeckeln und Wirbelknochen
- ☐ feststellen der Pigmentierung der Haut

1.154 Welche Nährtiere findet die Forelle gewöhnlich in ihrer Region?

- ☐ Zuckmückenlarven, Schlammröhrenwürmer
- ☒ Eintags-, Stein- u. Köcherfliegen und deren Larven, Bachflohkrebse
- ☐ Egel, Asseln, Muscheln

1.668 Welche Reaktionen eines Fisches lässt eine Erkrankung vermuten?

- ☐ starkes Wühlen im Schlamm, ruhiges stehen im Wasser
- ☐ springen, Aufenthalt an der Wasseroberfläche, verstärkte Nahrungsaufnahme
- ☒ verminderter Fluchtrefflex, Anlehnen an Gegenstände im Wasser

1.255 Welche Tierart hat ein Maul mit Hornzähnen?

- ☒ Flussneunauge
- ☐ Steinbeißer
- ☐ Gründling

Sachgebiet: Spezielle Fischkunde

1.254 Welche Tiere haben ein knorpeliges Skelett?

- ☐ Forellen
 - ☐ Karpfen
 - ☒ Neunaugen
-

1.159 Welche Umstände versprechen die besten Fangaussichten auf Aal mit der Angel?

- ☐ kalte klare Nächte im April
 - ☒ warme Sommernächte mit bedecktem Himmel und Wind
 - ☐ stürmische Schlechtwetterlage im Winter mit Schneetreiben
-

163 Welchem Beschuppungstyp glich die Urform des Karpfens?

- ☐ dem Lederkarpfen
 - ☐ dem Spiegelkarpfen
 - ☒ dem Schuppenkarpfen
-

1.256 Welcher Aal wird größer?

- ☐ der männliche Aal
 - ☒ der weibliche Aal
 - ☐ beide können gleich groß werden
-

1.257 Welcher barschartige Fisch hat keinen Dorn am Kiemendeckel?

- ☐ Flussbarsch
 - ☒ Zander
 - ☐ Kaulbarsch
-

1.619 Welcher besondere Weißfisch hat keine Kieferbezahnung, obwohl er ein Raubfisch ist?

- ☐ Hasel
 - ☒ Rapfen
 - ☐ Aland
-

1.260 Welcher Bewohner unserer Fließgewässer hat ein rundes Saugmaul und weder Bauch- noch Brustflossen?

- ☐ Aal
 - ☒ Flussneunauge
 - ☐ Quappe
-

554 Welcher Fisch baut zur Laichablage ein Nest?

- ☐ Bitterling
 - ☐ Elritze
 - ☒ Stichling
-

571 Welcher Fisch betreibt eine besonders intensive Brutpflege?

- ☐ die Elritze
 - ☒ der Stichling
 - ☐ der Aland
-

1.259 Welcher Fisch hat die meisten Barteln?

- ☒ Wels
 - ☐ Barbe
 - ☐ Karpfen
-

943 Welcher Fisch hat ein Maul mit Hechelzähnen/Bürstenzähnen?

- ☐ Plötze
 - ☒ Wels
 - ☐ Schleie
-

523 Welcher Fisch hat eine Fettflosse?

- ☒ Äsche
 - ☐ Elritze
 - ☐ Kaulbarsch
-

Sachgebiet: Spezielle Fischkunde

1.261 Welcher Fisch hat eine Fettflosse?

- ☐ Karpfen
- ☐ Kaulbarsch
- ☒ Zwergwels

1.263 Welcher Fisch hat eine Legeröhre für die Eiablage?

- ☐ Rotaugen (Plötze)
- ☒ Bitterling
- ☐ Blei

1.264 Welcher Fisch hat eine zweikammerige Schwimmblase?

- ☒ Rotaugen (Plötze)
- ☐ Hecht
- ☐ Regenbogenforelle

1.265 Welcher Fisch hat einen seitlich abgeplatteten, hochrückigen Körper ?

- ☐ Barbe
- ☒ Brassen (Blei)
- ☐ Wels

1.266 Welcher Fisch hat glatte runde Schuppen?

- ☐ Wels
- ☒ Döbel
- ☐ Zander

525 Welcher Fisch hat Kammschuppen?

- ☐ Rapfen
- ☐ Äsche
- ☒ Zander

1.267 Welcher Fisch hat keine Bauchflossen?

- ☒ Aal
- ☐ Quappe
- ☐ Groppe

1.268 Welcher Fisch hat keine Fettflosse?

- ☐ Bachforelle
- ☐ Zwegwels
- ☒ Güster

294 Welcher Fisch hat keine Fettflosse?

- ☐ Zwergwels
- ☐ Bachforelle
- ☒ Groppe

1.269 Welcher Fisch hat Schlundzähne?

- ☐ Bachsaibling
- ☒ Karpfen
- ☐ Wels

1.262 Welcher Fisch hat zwei Rückenflossen?

- ☐ Spiegelkarpfen
- ☒ Flussbarsch
- ☐ Hecht

332 Welcher Fisch ist der größte heimische und auch europäische Raubfisch?

- ☒ Wels
- ☐ Hecht
- ☐ Zander

Sachgebiet: Spezielle Fischkunde

1.225 Welcher Fisch ist ein anadromer Wanderfischen ?

- ☐ Rotaugen (Plötze)
 - ☐ Aal
 - ☒ Lachs
-

1.234 Welcher Fisch ist hochrückig?

- ☒ Blei (Brasse)
 - ☐ Wels
 - ☐ Hecht
-

1.270 Welcher Fisch jagt besonders mit Hilfe der Augen?

- ☒ Bachforelle
 - ☐ Aal
 - ☐ Plötze (Rotaugen)
-

529 Welcher Fisch laicht im Kies?

- ☒ Äsche
 - ☐ Karausche
 - ☐ Barsch
-

531 Welcher Fisch legt seine Eier in Muscheln ab?

- ☐ Elritze
 - ☐ Stichling
 - ☒ Bitterling
-

1.271 Welcher Fisch schlägt eine Laichgrube?

- ☐ Flussbarsch
 - ☐ Brassen (Blei)
 - ☒ Bachforelle
-

1.272 Welcher Fisch unserer einheimischen Gewässer besitzt die meisten Barteln?

- ☐ Gründling
 - ☐ Wels
 - ☒ Schlammpeitzger
-

526 Welcher männliche Fisch hat in der Laichzeit einen Laichhaken?

- ☐ Schleie
 - ☐ Hecht
 - ☒ Bachforelle
-

1.231 Welches aquatische Lebewesen verbringt die ersten Entwicklungsjahre eingegraben im Gewässerboden?

- ☐ Schlammpeitzger
 - ☒ Bachneunauge
 - ☐ Quappe
-

1.273 Welches Merkmal ist typisch für Barschartige Fische?

- ☒ die erste Rückenflosse hat kräftige Hartstrahlen
 - ☐ die erste und zweite Rückenflosse hat kräftige Hartstrahlen
 - ☐ die Bauchflossen sind kehlständig und mit vier starken Dornen versehen
-

1.274 Wie äußert sich bei der Regenbogenforelle eine virale hämorrhagische Septikämie (VHS) ?

- ☒ rötlich gefärbte Flossenansätze, Glotzaugen, blasse Leber
 - ☐ dunkel gefärbte Haut, Starrwerden der Augen, erhöhte Temperatur
 - ☐ Schwarzfärbung der Flossen
-

655 Wie erklärt sich der Name "Neunauge"?

- ☐ dieses Tier hat neun Augen
- ☐ dieses Tier hat acht Kiemenöffnungen und ein Auge
- ☒ dieses Tier hat auf jeder Körperseite ein Auge, eine Nasenöffnung und sieben Kiemenspalten

Sachgebiet: Spezielle Fischkunde

1.800 Wie heißt der abgebildete Fisch der laut aktueller SächsFischVO ganzjährig geschont ist?

- ☐ Blei
- ☐ Zährte
- ☒ Zope

1.829 Wie heißt die hier abgebildete Muschel, die in Symbiose mit der Bachforelle lebt?

- ☐ Chinesische Teichmuschel
- ☐ Gemeine Teichmuschel
- ☒ Flussperlmuschel

1.276 Wie ist die Schwimmblase der Barschartiger Fische aufgebaut?

- ☐ einkammerig mit Luftgang
- ☐ zweikammerig mit Luftgang
- ☒ einkammerig ohne Luftgang

1.277 Wie kann man Bach- und Regenbogenforelle voneinander unterscheiden?

- ☒ Regenbogenforellen haben schwarze Punkte auf Rücken- und Schwanzflosse, sowie ein rosa schillerndes Band auf den Körperseiten
- ☐ Regenbogenforellen besitzen rote Punkte am Körper und auf den Flossen
- ☐ Bachforellen haben schwarze Punkte am Körper und auf den Flossen, sowie ein golden schillerndes Band auf den Körperseiten

1.297 Wie kann man einsömmrige Flussbarsche von einsömmrigen Zandern unterscheiden?

- ☐ der Flussbarsch hat dunkle Längsstreifen auf Körper und Flossen
- ☒ der Flussbarsch hat einen schwarzen Fleck am Ende der ersten Rückenflosse
- ☐ der Zander hat dunkle Längsstreifen

1.278 Wie kann man Güster und Blei unterscheiden?

- ☐ die Güster hat mehr Flossenstrahlen in der Afterflosse und die Brustflossen reichen hinter die Ansätze der Bauchflossen
- ☒ bei der Güster ist der Augendurchmesser größer als die Maullänge, die Brustflosse reicht nicht bis zur Bauchflosse
- ☐ der Blei hat ein endständiges Maul und die Flossen sind rötlich

1.279 Wie kann man Laichfische von Meerforelle und Lachs unterscheiden?

- ☒ der Lachs hat eine gegabelte Schwanzflosse, einen dünneren Schwanzstiel und die Knochennähte am Kiemendeckel stoßen nicht in einem Punkt zusammen
- ☐ die Schuppen der Meerforelle sind größer, der Oberkieferknochen reicht nur bis zum Augenansatz und die Schwanzflosse ist gegabelt
- ☐ beim Lachs treffen die Knochennähte am Kiemendeckel in einem Punkt zusammen und die Schuppenzahl zwischen Seitenlinie und Fettflosse ist höher

1.280 Wie legt der Flussbarsch seine Eier ab?

- ☐ er legt die Eier in flachen Gruben ab
- ☒ er legt die Eier in langen Bändern ab
- ☐ er klebt die Eier einzeln an Pflanzen

1.275 Wie nennt man den golden/rot gefärbter Aland?

- ☐ Goldfisch
- ☒ Goldorfe
- ☐ Goldschmerle

1.787 Wie nennt man die hier abgebildete Fischart, bei der sich sechs kurze Barteln an der Oberlippe befinden?

- ☒ Steinbeißer
- ☐ Gründling
- ☐ Schlammpeitzger

1.828 Wie nennt man die hier abgebildete Fischart, die in Sachsen als Neozoon (neue Fischart) in der Elbe vorkommt?

- ☐ Groppe
- ☒ Schwarzmundgrundel
- ☐ Zackenbarsch

Sachgebiet: Spezielle Fischkunde

1.833 Wie nennt man die hier abgebildete Fischart? Artcharakteristisch ist, dass sich die Nähte der Knochenplatten auf dem Kiemendeckel in einem Punkt verbinden.

- ☐ Atlantischer Lachs
- ☐ Äsche
- ☒ Seeforelle

1.764 Wie nennt man die hier abgebildete Fischart? Die Unterlippe ist hornig, scharfkantig und die Oberlippe wulstig.

- ☒ Nase
- ☐ Zährte
- ☐ Aland

1.763 Wie nennt man die hier abgebildete Fischart? Sie besitzt ein stark unterständiges Maul und ist ganzjährig laut SächsFischVO geschont.

- ☐ Hasel
- ☐ Nase
- ☒ Zährte

1.788 Wie nennt man die hier abgebildete Kleinfischart, deren nach unten gebogene Seitenlinie beidseitig von einer Punktreihe gesäumt wird?

- ☒ Schneider
- ☐ Moderlieschen
- ☐ Bitterling

1.791 Wie nennt sich eine Zuchtform dieses Fisches?

- ☐ Goldfisch
- ☒ Goldorfe
- ☐ Goldschleie

1.281 Wie oft laicht der Aal in seinem Leben?

- ☒ nur einmal
- ☐ jedes Jahr
- ☐ nur zwei- bis dreimal

1.282 Wie raubt der Hecht?

- ☐ er jagt seine Beutefische
- ☒ er schießt aus Lauerstellung plötzlich auf vorbeiziehende Fische los
- ☐ er sucht seine Beute im Herumschwimmen (Pirschen)

1.283 Wie unterscheiden sich Breitkopf- und Spitzkopfaale?

- ☒ der Breitkopfaal hat sich zum Raubfisch entwickelt und lebt auch von Fischen
- ☐ der Spitzkopfaal hat sich zum Räuber entwickelt und lebt auch von Fischen
- ☐ der Breitkopfaal ist laichreif und nimmt keine Nahrung mehr zu sich

1.284 Wie unterscheiden sich die Geschlechter bei den Schleien?

- ☐ bei den Rognern sind die Strahlen der Bauchflosse verdickt
- ☒ bei den Milchnern sind die Strahlen der Bauchflosse verdickt
- ☐ bei den Milchnern ist die Afterflosse verdickt

1.285 Wie unterscheiden sich Wels und Zwergwels?

- ☒ der Wels hat 6 Barteln, der Zwergwels hat 8 Barteln
- ☐ der Wels hat 4 Barteln, der Zwergwels hat 6 Barteln
- ☐ der Wels hat 2 Barteln, der Zwergwels hat 4 Barteln

1.286 Wie unterscheidet man eine einsömmrige Barbe eindeutig von einem Gründling?

- ☐ die Barbe hat zwei Barteln, der Gründling hat vier Barteln
- ☐ der Gründling hat keine Barteln
- ☒ die Barbe hat vier Barteln, der Gründling hat zwei Barteln

1.287 Wie unterscheidet man eine junge Bachforelle und einen gleichgroßen Lachs?

- ☐ der Lachs hat eine rötlich bis orange gefärbte Fettflosse und die Knochenplatten am Kiemendeckel berühren sich in einem Punkt
- ☐ die Bachforelle hat deutlich größere Brustflossen und ein kleineres Maul
- ☒ die Knochenplatten am Kiemendeckel der Bachforelle berühren sich in einem Punkt und die Fettflosse ist rötlich

Sachgebiet: Spezielle Fischkunde

1.288 Wie unterscheidet man mit Hilfe der Barteln Wels und Quappe?

- ☐ die Quappe hat 2 Barteln, der Wels hat 4 Barteln
- ☐ die Quappe hat 2 Barteln, der Wels hat 8 Barteln
- ☒ die Quappe hat 1 Bartel, der Wels hat 6 Barteln

1.289 Wie verhalten sich Stichlinge während der Laichphase?

- ☐ sie legen ihre Eier in Muscheln ab
- ☐ sie legen ihre Eier auf die Unterseite großblättriger Wasserpflanzen ab
- ☒ die Männchen bauen ein Nest, in das mehrere Weibchen ihre Eier ablegen

1.290 Wie viele Bartfäden hat der Europäische Wels?

- ☐ acht
- ☒ sechs
- ☐ vier

1.291 Wie viele Bartfäden hat die Schleie?

- ☐ vier
- ☒ zwei
- ☐ keine

1.292 Wo entwickeln sich beim Edelkrebs die Eier?

- ☒ am Hinterleib des weiblichen Krebses
- ☐ in Kiesbänken
- ☐ in einem vom Männchen bewachten Gelege

241 Wo hält sich die Barbe vorwiegend auf?

- ☐ nur in ruhiger Strömung
- ☒ auf dem Gewässerboden
- ☐ in der Nähe der Wasseroberfläche

1.293 Wo hält sich die Schleie vorzugsweise auf?

- ☐ an der Wasseroberfläche
- ☐ im Freiwasserraum
- ☒ zwischen Pflanzen am Gewässergrund

1.294 Wo laicht der Hecht?

- ☒ an flachen verkrauteten Uferstellen
- ☐ an kiesigen pflanzenfreien Uferstellen
- ☐ in tieferen Bereichen, auf sogenannten unterseeischen Wiesen

567 Wo laicht die Bachforelle?

- ☐ im Freiwasser
- ☐ an Wasserpflanzen
- ☒ im Kiesbett

1.295 Wo leben die Neunaugen im Larvenstadium?

- ☐ im Sediment in Küstennähe
- ☐ im Sediment, in tiefen Meeresbereichen
- ☒ im Sediment von Flüssen und Bächen

851 Wo legen Forellen ihre Eier ab?

- ☒ in Kiesmulden am Gewässergrund
- ☐ an untergetauchten Grashalmen
- ☐ in selbstgebauten Nestern aus Pflanzenteilen

1.296 Wo setzt die Barbe ihren Laich ab?

- ☐ an Wasserpflanzen in der Uferzone
- ☒ auf kiesigen, stark überströmten Bodenstellen
- ☐ in Eischnüren an großen Steinen

Sachgebiet: Spezielle Fischkunde

1.298 Wodurch unterscheiden sich u. a. Rotfeder und Plötze?

- ☒ durch die Stellung der Rückenflosse gegenüber dem Ansatz der Bauchflosse
☐ durch die Größe der Schuppen
☐ durch die Stellung der Brustflossen
-

1.299 Wohin legen Bitterlinge ihre Eier?

- ☐ sie legen die Eier in ein Nest aus Wasserpflanzen
☐ sie legen keine Eier, weil sie lebendgebärend sind
☒ sie legen die Eier in Großmuscheln ab
-

1.300 Wohin legt der Karpfen seine Eier ab?

- ☐ auf kiesigen Boden in Laichgruben
☐ in Nester aus Pflanzenteilen
☒ an Pflanzen
-

1.301 Woran erkennt man den Äschenmilchner?

- ☐ stärker ausgeprägte Bauchflossen
☒ wipfelartig lang ausgezogene Rückenflosse, grauer Bauch
☐ lang ausgezogene Afterflosse mit vielen schwarzen Punkten
-

1.302 Woran erkennt man die männliche Schleie?

- ☐ an den größeren Brustflossen
☒ an den größeren Bauchflossen
☐ an den deutlich längeren Barteln
-

1.303 Woran erkennt man, ob ein Fluss- oder Kaulbarsch gefangen wurde?

- ☐ der Kaulbarsch hat drei zusammengewachsene Rückenflossen, der Flussbarsch hat eine geteilte Rückenflosse
☐ der Flussbarsch hat eine ungeteilte Rückenflosse, der Kaulbarsch hat eine geteilte Rückenflosse
☒ der Flussbarsch hat dunkle Querbinden auf den Körperseiten, der Kaulbarsch Flecken
-

632 Woran ist zu erkennen, daß ein Karpfen vor dem Schlachten einwandfrei betäubt ist?

- ☐ am Abspreizen der Schuppen
☐ an der starken Dunkelfärbung der Haut
☒ am Ausbleiben des Augendrehreflexes
-

1.304 Woran kann ich u. a. die Zährte (Rußnase) von der Nase unterscheiden?

- ☐ keine Unterscheidung möglich
☒ durch die dunkle Färbung der nasenartig vorragenden Schnauze
☐ durch die Größe
-

1.669 Woran sind die Dorschartigen Fische im Allgemeinen zu erkennen?

- ☐ sie haben keine Schuppen
☒ sie haben in der Regel einen Bartfaden
☐ sie haben keine Schwimmblase
-

1.306 Woran sind die Männchen der Elritze in der Laichzeit zu erkennen?

- ☐ die Geschlechter sind nicht zu unterscheiden, da beide Laichausschlag haben
☒ Männchen haben einen deutlicheren Laichausschlag und ein intensiv gefärbtes Hochzeitskleid mit blutroter Färbung an der Bauchseite
☐ die Weibchen haben den Laichausschlag am gesamten Körper und die Männchen nur am Kopf
-

1.179 Worauf muss der Angler beim Schlachten eines Aales besonders achten?

- ☒ dass er kein Aalblut in eine offene Wunde oder in die Augen bekommt und dass die Niere bis hinter die Afteröffnung reicht
☐ dass vor dem Ausweiden Schleim und Schuppen vollständig entfernt werden müssen
☐ dass die Niere im Aal verbleibt, da sie besonders delikat schmeckt
-

1.307 Wovon ernährt sich der Breitkopfaal hauptsächlich?

- ☒ Fischen
☐ tierischem Plankton
☐ Pflanzen
-

Sachgebiet: Spezielle Fischkunde

1.308 Zähre und Nase sind eindeutig an der Afterflosse zu unterscheiden. Was trifft für die Nase zu?

- ☐ die Afterflosse hat mehr Flossenstrahlen und ist schwarz gefärbt
 - ☒ die Afterflosse hat weniger Flossenstrahlen, eine konkave Form und besitzt eine rötliche Färbung
 - ☐ die Afterflosse der Nase besitzt eine konvexe Form, besitzt keine Flossenstrahlen und ist dunkel gefärbt
-

1.309 Zope und Blei haben ein ähnliches Aussehen und bewohnen gleiche Lebensräume. Wie kann man diese Arten unterscheiden?

- ☐ der Blei hat eine längere Afterflosse als die Zope
 - ☒ die Afterflosse der Zope hat bedeutend mehr Flossenstrahlen
 - ☐ die Zope hat größere Flossen
-

1.725 Zu welcher Familie gehört die Elritze?

- ☐ Salmoniden
 - ☒ Karpfenartige
 - ☐ Coregonen
-

1.311 Zu welcher Maulform sind die richtigen Fischarten aufgeführt?

- ☐ endständiges Maul: Flussbarsch, Zander und Ukelei
 - ☒ unterständiges Maul: Nase, Barbe und Gründling
 - ☐ oberständiger Maul: Karpfen, Schleie und Zander
-

1.312 Zwei der nachfolgenden Salmoniden wurden aus Nordamerika eingeführt. Es sind:

- ☐ Meer- und Seeforelle
- ☒ Regenbogenforelle und Bachsaibling
- ☐ Lachs und Äsche