031	Vergleichsprüfung der Mischungen für den Zwischenfruchtbau "2006/2007"	Dauerversuch
2007 - 2009		Ackerfutter

1. Versuchsfrage:

Überprüfung der Leistungsfähigkeit und Bestandesentwicklung von Sommer-Zwischenfrüchten zur Futternutzung

2. Prüffaktoren:

Faktor I: Mischung
Stufen: 5

Versuchsorte

Christgrün

Landkreis

Vogtlandkreis

Prod.gebiet

V 5

Prüfglied	Menge in kg/ha
Einjähr. Weidelgras "Barsutra"	40
Einjähr. Weidelgras "Barsutra" + Welsches Weidelgras "Barmega"	15 + 30
Sommerfutterraps "Helga"	10
Einjähr. Weidelgras "Barsutra" + Winterfutterraps "Licapo"	25 + 1,5
Hafer "Aragon" + Futtererbse "Livoletta" + Winterwicke "Dr. Baumanns"	80 + 60 + 40

3. Versuchsanlage: Blockanlage mit 4 Wiederholungen

4. Auswertbarkeit/Präzision:

Die Versuchsdurchführung erfolgte nach guter fachlicher Praxis.

5. Versuchsergebnisse:

Die [Erträge](#) der Prüfglieder stellen sich sehr unterschiedlich sowohl zwischen den Prüfgliedern als auch in den einzelnen Jahren dar. Im Mittel der Prüfglieder brachte das Jahr 2009 den höchsten TM-Ertrag, 2008 den geringsten. Dabei muss berücksichtigt werden, dass Mitte September 2008 ein plötzlicher Nachtfroststeinbruch dem Wachstum der frostempfindlichen Leguminosen ein frühes Ende setzte.

Im Mittel der Jahre zeigte das Hafer-Erbсен-Wickengemenge den signifikant höchsten Masseertrag.

Bei den [Rohprotein-Gehalten](#) wies der Sommerfutterraps die höchsten Werte auf, gefolgt vom Hafer-Erbсен-Wickengemenge. Der Jahreseinfluss ist beim Rohproteingehalt sehr gut erkennbar (siehe 2008).

Die [Rohfaser-Gehalte](#) wiesen zwischen den Jahren ähnlich hohe Schwankungen wie beim Rohproteingehalt auf. Die Ursachen waren in der Bestandesetablierung zu suchen (schlechte Jugendentwicklung, ungünstige Wachstumsbedingungen in der vegetativen Phase). Niedrige Rohfasergehalte (und damit auch hohe RP-Gehalte) waren im Jahr 2008 zu verzeichnen, geschuldet der frühen Ernte durch den Kälteeinbruch.

Bei den [Energie-Gehalten](#) waren im Jahresmittel keine gesicherten Unterschiede zu verzeichnen. Es fällt aber auf, dass sich der Sommerfutterraps und sein Gemenge mit dem Einjährigen Weidelgras im oberen Drittel platzieren können.

Der oben angeführte frühe Frost (18. September 2008) spiegelt das Risikopotenzial der Nutzung von Sommerzwischenfrüchten insbesondere für Futterzwecke wieder. Frosteinbrüche wie dieser können leistungsfähige Futterbestände über Nacht zunichte machen ([Frostschäden](#)).

6. Schlussfolgerungen/Handlungsbedarf:

Die Ergebnisse bestätigen die Erfahrung, dass der Sommer-Zwischenfruchtbau mit hohem Ertragsrisiko verbunden sein kann. Die Kenntnis der regionalen Standortbedingungen und Witterungsverhältnisse spielt eine große Rolle bei der erfolgreichen Etablierung von Sommerzwischenfrüchten.

Versuchsdurchführung: LfULG	Themenverantw.:	Abt. 9 - Tierische Erzeugung	Versuchsjahr
ArGr Feldversuche	Referat:	94 Grünland, Feldfutterbau	
Ref. 76 Frau Beatrix Trapp	Bearbeiter:	Herr Edwin Steffen	2010

Datenquellen:

Trockenmasseertrag von Sommerzwischenfrüchten

Rohproteingehalt von Sommerzwischenfrüchten

[zurück](#)

Rohfasergehalt von Sommerzwischenfrüchten

Energiegehalt von Sommerzwischenfrüchten

[zurück](#)

Frostschäden im zweiten Ansaatjahr 2008

[zurück](#)