Moderner Pflanzenschutz mit biologischen Haftmitteln

Bernhard Sack, CEO amynova polymers GmbH

Pflanzenschutzmittel und Zusatzstoffe

- Pflanzenschutzmittel enthalten Wirkstoffe und Formulierungshilfsstoffe
- sorgen etwa dafür, dass:
 - Pflanzenschutzmittel leicht zu handhaben
 - gut auszubringen und
 - lagerstabil sind
- können die Sicherheit für Anwender beim Ansetzen der Spritzflüssigkeit erhöhen
- ermöglichen eine gute Verteilung der Wirkstoffe in der Spritzflüssigkeit und über die Pflanzen
- Geringe Aufwandmenge (<500ml) entspricht Netz- und Penetrationsmittel
- Größere Aufwandmenge (>1l/ha) entspricht Haftmittel -> Öle sind keine „richtigen“ Haftmittel

Pflanzenschutzmittel und Zusatzstoffe

Fungizide

- Kontaktfungizide werden sehr leicht abgewaschen
- systemische Fungizide sind nur in der Pflanze regenfest

Pflanzenschutzmittel und Zusatzstoffe

Insektizide

- **Pyrethroide** werden schnell abgebaut, verdunsten
- **Mineral- oder pflanzliche Öle** = „biologische“ Insektizide, wirken nur über den Kontakt während der Ausbringung, indem sie die Atemöffnungen der Insekten **verkleben** und **auch die Spaltöffnungen der Pflanze**
- chemischer Pflanzenschutz ist im Sommer durch die vorherrschenden hohen Temperaturen erschwert
 - schnelleres Verdampfen einiger Wirkstoffe
 - Abnahme der Dauerwirkung
 - Beschleunigung des chemischen Zerfalls
 - Verdunstung während der Ausbringung bei geringer Luftfeuchte

Haftmittel ist nicht gleich Haftmittel

Netzmittel

Alkohole, Tenside

Vorteile

- setzen Oberflächenspannung der Spritzbrühe herab
- vergrößern Oberfläche der Spritztropfen
- bessere Verteilung der Spritzbrühe auf dem Blatt
- benetzte Fläche wird vergrößert

Nachteile

- wasserlöslich
- werden schnell abgewaschen
- verursachen Spritzstress
- beeinflussen Wasserhaushalt

Haftmittel

Paraffine, Pinienöl, Mineralöl

Vorteile

- verbessern Haftung der Spritzbrühe und damit der Wirkstoffe an der Blattoberfläche

Nachteile

- schränken Gaswechsel der Pflanzen ein
- können kein Wasser aufnehmen
- kapseln Wirkstoff ein
- verdunsten sehr schnell

Penetrationsmittel

Vorteile

- fördern Eindringen der Wirkstoffe in Pflanze
- fördern kutikuläre Penetration durch strukturelle Veränderungen der Wachsschicht

Nachteile

- kein Einsatz mit systemischen Herbiziden
- begünstigen Verbrennungen

Einsatz CropCover

- CropCover CC-1000 für alle flüssigen PSM und BLattdünger
- CropCover CC-2000 für alle pulverförmigen Wirkstoffe die gespritzt werden
- FIBL-gelistet

Einsatz ErosionControl

- ErosionControl EC-1000 für alle Herbizide im Voraufauf auf humusreichen Böden
- ErosionControl EC-2000 für alle Herbizide im Voraufauf auf leichten humusarmen Böden

Erhöhung
Regenfestigkeit

Wirkstoffdepot

Reduzierung
Krankheitsbefall

Reduzierung
Blattlausbefall

Vorteile CropCover ErosionControl

- Feststoff, UV-beständig
- reversible wasserlöslich
- sehr gut nasshaftend
- **Zusatznutzen**
 - wasserbindend
 - erhöhte Wassernutzungseffizienz
 - 100 % organisch
 - fördert Bodenleben

Wirkprinzipien

Beschichtung und Filmbildung

Beim Abtrocknen des Spritzbelages auf der Blatt- oder Bodenoberfläche bildet sich ein Stärkefilm.

Reversible Wasserlöslichkeit und Gelbildung

- Pflanzenschutzmittel und/oder Blattdünger werden wie in einem Depot gespeichert [**keine Wirkstoffverkapselung**]
- Bei Regen oder Tau nimmt dieser Stärkefilm Wasser auf
- stark haftendes Gel wird gebildet [**Regenfestigkeit bis 100 mm**]
- Verdunstungsschutz für Insektizide
- Verteilt sich mit PSM und/oder Blattdüngern auf dem Blatt weiter [**Benetzung**]
- Wird länger in der oberen Bodenschicht gehalten und weniger stark ausgewaschen
- Dammflanken werden geschützt
- Erosion durch Wind oder Thermik wird stark eingedämmt
- kann so länger von der Pflanze aufgenommen werden

Wirkungsgrad Fungizide zur Bekämpfung von Phytophthora 2016

Versuchsdurchführung: Field Research Support

ohne CropCover

mit CropCover

Pflanzen sind durch die Verwendung von CropCover **wüchsiger** (schneller Reihenschluss) und **vitaler** (erhöhter Chlorophyllgehalt)

Vitalitätsuntersuchungen durch Gaswechselfmessungen

mit CropCover

nachweisbare Vitalitätssteigerung der Pflanzen
Anregung der Photosyntheseaktivität

Bestimmung des **Chlorophyllgehaltes**

PFLANZKARTOFFELN

GEP-Fungizidversuch – Pflanzkartoffeln 2015

Y-Virus - Blattlausbefall

Sorte: Charlotte

Jahr: 2015

Ort: Sanitz

Anwendungen: 6

Insektizid:

Sumicidin Alpha

GEP-Fungizidversuch – Pflanzkartoffeln 2015

Y-Virus - Blattlausbefall

Sorte: Charlotte

Jahr: 2015

Ort: Sanitz

Anwendungen: 6

Insektizid:

Sumicidin Alpha

GEP-Fungizidversuch – Pflanzkartoffeln 2015

Virusbefall nach Augenstecklingstest mit anschließendem ELISA

Behandlung	Befall	Virusbefall - Kartoffel-Y-Virus (potato-virus-Y, PVY) / %			
	%	R-1(außen)	R-2 (innen)	R-3 (innen)	R-4 (außen)
Sumicidin Alpha	0,31	0,5	0,0	0,0	0,8
Bedo + CC	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Sumicidin Alpha + CC	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0

Sorte: **Charlotte**

Jahr: **2015**

Ort: **Sanitz**

Anwendungen: **6**

Insektizid:

Sumicidin Alpha

CropCover bei **HITZESTRESS**

Hohe **Regenfestigkeit** bei extremer **Trockenheit?**

OFR-Fungizidversuch – Speisekartoffel unter **Trockenstress**

GEP-Fungizidversuch – Speisekartoffel unter **Trockenstress**

Ertrag

Sorte: Belana

Jahr: 2018

Ort: Steinkrug

Anwendungen: 6

Fungizid:

Ridomil Golz MZ

Acrobat Plus WG

Shirlan

Ranman Top

OFR-Fungizidversuch mit Beregnung

Ort:

Onstwedde [NL]

Applikationen: 13

Beregnung

Anzahl: 6

Abstand: 10 Tage

Menge: 25 mm

OFR-Fungizidversuch ohne Beregnung

Ort:

Munterdam [NL]

Anwendungen: 8

BAYERISCHE LANDESANSTALT FÜR WEINBAU UND GARTENBAU
Versuchsjahr 2010

Botrytis im Weinbau - Traubenbefall 24 DAA

Botrytis im Weinbau - Traubenbefall 41 DAA

Botrytis im Weinbau – Wirkungsgradverlauf

Verbesserte Kupferwirkung gegen Rebenperonospora durch den Zusatzstoff „CropCover CC 1000“

LWG, Rebschutz und Rebphysiologie, H. Hofmann

Erhöht „CropCover CC 1000 die Effektivität von Fungiziden ?

1. CC-1000 (BVL –Listung 6761-64, FIBL-Listung):

- hoch amylosehaltige, wenig modifizierte Stärke
- filmbildende Eigenschaft auf Blatt und Frucht
- vollständig biologisch abbaubar
- sehr gut kaltwasserlöslich
- pH- und stoffwechselfneutral

2. Versuch und Ergebnis:

Schaderreger: *Plasmopara viticola*

Rebsorte: Domina

Versuchsdesign: Blockanlage rand., 4 Wdh.

Varianten:

- Folpan
8 Behandlungen
CC 1000 4l/ha je Behandlung
- Cuprozin flüssig
9 Behandlungen mit je 200 gr. Reinkupfer
CC1000 zwischen 4 bis 8 l/ha je Behandlung

Bonitur nach Eppo

3. Fazit:

– Durch die Zugabe von CC1000 wurden in den Kupfervarianten die Befallshäufigkeit und die Befallsstärke am Blatt und besonders an der Traube deutlich reduziert.

– Die organisch behandelten Varianten reagierten ähnlich, wenn auch in abgeschwächter Form.

– Auswirkungen auf den Reifeverlauf wurden nicht beobachtet.

– Die Wirkungsverbesserung könnte auf verminderte Abwaschung oder verzögerten Abbau der Wirkstoffe zurückzuführen sein, da höhere Wirkstoffrückstände zu beobachten sind (s. Abb. unten).

– Weitere Untersuchungen zur Bestimmung der optimalen Aufwandmenge in Reben sind notwendig.

ZUSAMMENFASSUNG

Durch den Einsatz von CropCover / ErosionControl erreicht man:

- **Wirkstoffeffizienzsteigerung** bei allen **PSM/Flüssigdüngern**
- **Erhöhung** der **Vitalität** der Pflanzen
- **Ertragssicherung** und **Qualitätssteigerung**
- **Verbesserung** der **Wasserhaltefähigkeit** im **Boden**
- **Steigerung** der **Wassernutzungseffizienz** in der **Pflanze**
- **Stressreduzierung** unter extremen Witterungsbedingungen [Hitze]

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

amynova.com