

Brau- /Keksweizen Lö-/V-Standorte 2024_2026

13.08.2026

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Intensität	Sorte	2024 *			2025 **			2026 **			25/26	24-26	
		Christgrün	Nossen	Mittel	Christgrün	Nossen	Mittel	Christgrün 1)	Nossen	Mittel	Mittel	Mittel	
reduziert	Apostel (B)	104,9	82,4	93,7	94,1	79,0	86,5	77,8	73,6	75,7	81,1		Intensitätsstufe: reduziert 2024 * ... wie Stufe II im LSV aber ohne Ährenbehandlung
	KWS Keitum (B)	99,4	96,3	97,9	110,0	102,2	106,1	98,1	82,1	90,1	98,1		
	Complice	91,5	88,5	90,0	101,2	91,4	96,3						
	Chevignon	106,4	89,3	97,9	105,7	91,6	98,6						seit 2025 ** ... wie Stufe I im LSV (ohne Fungizid / ohne bzw. reduzierter Wachstumsreglereinsatz)
	Spectral (B)	114,4	87,2	100,8	102,6	88,9	95,7	91,3	72,6	81,9	88,8		
	Eriksen				105,7	94,3	100,0	89,9	72,8	81,4	90,7		
	LG Niklas				98,7	91,4	95,1	81,1	77,3	79,2	87,1		
	Pondor							89,3	80,7	85,0			
	Mittel	103,3			102,5	91,2		87,9	76,5				
	Mittel (B)	106,2	88,6	97,4	102,2	90,0	96,1	89,0	76,1	82,6	89,3		
	Grenzdif.	11,0	4,7		7,5	5,3		5,7	9,8				
	Anzahl Orte			1			2			2	4		
optimal, mit Ährenbehandlung	Apostel (B)	111,6	91,4	101,5	114,6	75,9	95,2	72,2	83,8	78,0	86,6	91,6	Intensitätsstufe: optimal 2024 bis 2026: ... wie Stufe II im LSV mit Ährenbehandlung
	KWS Keitum (B)	113,8	103,3	108,6	129,9	101,3	115,6	83,1	87,6	85,3	100,5	103,2	
	Complice	102,4	100,6	101,5	112,8	90,7	101,7						
	Chevignon	109,2	95,2	102,2	121,4	90,2	105,8						Standort Christgrün 1) 2026: Blockeffekte überlagern Fungizideffekte
	Spectral (B)	116,7	98,7	107,7	124,0	86,0	105,0	84,9	75,5	80,2	92,6	97,6	
	Eriksen				124,7	95,0	109,9	83,6	76,6	80,1	95,0		
	LG Niklas				120,0	93,6	106,8	75,6	84,8	80,2	93,5		
	Pondor							77,3	89,9	83,6			
	Mittel	110,7	97,8		121,0	90,4		79,4	83,0				
	Mittel (B)	114,0	97,8	105,9	122,8	87,7	105,3	80,1	82,3	81,2	93,2	97,5	
	Grenzdif.	11,0	4,7		7,5	5,3		5,7	9,8				
	Anzahl Orte			2			2			2	4	6	

Brau- /Keksweizen Lö-/V-Standorte 2024_2026

13.08.2026

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

relativ

Intensität	Sorte	2024 *			2025 **			2026 **			25/26	24-26	
		Christgrün	Nossen	Mittel	Christgrün	Nossen	Mittel	Christgrün 1)	Nossen	Mittel	Mittel	Mittel	
reduziert	Apostel (B)	99	93	96	92	88	90	87	97	92	91		Intensitätsstufe: reduziert 2024 * ... wie Stufe II im LSV aber ohne Ährenbehandlung
	KWS Keitum (B)	94	109	100	108	114	110	110	108	109	110		
	Complice	86	100	92	99	102	100						
	Chevignon	100	101	100	103	102	103						seit 2025 ** ... wie Stufe I im LSV (ohne Fungizid / ohne bzw. reduzierter Wachstumsreglereinsatz)
	Spectral (B)	108	98	103	100	99	100	103	95	99	99		
	Eriksen				103	105	104	101	96	99	101		
	LG Niklas				97	102	99	91	102	96	98		
	Pondor							100	106	103			
	Mittel	103,3			102,5	91,2		87,9	76,5				
	Mittel (B)	106,2		97,4	102,2	90,0	96,1	89,0	76,1	82,6	89,3		
	Grenzdif.	10,3	5,3		7,3	5,8		6,4	12,9				
	Anzahl Orte			2			2			2	4		
optimal, mit Ährenbehandlung	Apostel (B)	98	93	96	93	87	90	90	102	96	93	94	Intensitätsstufe: optimal 2024 bis 2026: ... wie Stufe II im LSV mit Ährenbehandlung
	KWS Keitum (B)	100	106	102	106	115	110	104	106	105	108	106	
	Complice	90	103	96	92	103	97						
	Chevignon	96	97	96	99	103	100						Standort Christgrün 1) 2026: Blockeffekte überlagern Fungizideffekte
	Spectral (B)	102	101	102	101	98	100	106	92	99	99	100	
	Eriksen				102	108	104	104	93	99	102		
	LG Niklas				98	107	101	94	103	99	100		
	Pondor							96	109	103			
	Mittel (dt/ha)	110,7	97,8		121,0	90,4		79,4	83,0				
	Mittel (B) dt/ha	114,0	97,8	105,9	122,8	87,7	105,3	80,1	82,3	81,2	93,2	97,5	
	Grenzdif.	9,6	4,8		6,1	6,0		7,1	12,0				
	Anzahl Orte			2			2			2	4	6	