# LSV Winterfuttererbse 2023 Löss-/Verwitterungsstandorte Ost

## Kornertrag bei 86% TS dt/ha

| Faktor1: Sorte | Ort | | | mit Kirch-engel | ohne Kirch-engel |
|---|---|---|---|---|---|
| | Hayn | Kirchengel | Pommritz | **2023** | **2023** |
| Dexter(B) | 30,6 | 26,7 | 58,1 | **38,5** | **44,4** |
| Fresnel(B) | 30,5 | 29,6 | 54,5 | **38,2** | **42,5** |
| Casini(B) | 38,0 | 33,8 | 55,4 | **42,4** | **46,7** |
| Asteroid | 47,4 | | 58,3 | | **52,9** |
| Feroe | 32,1 | | 71,7 | | **51,9** |
| Lapony | | 28,3 | | | |
| **Mittelwert** | **35,7** | **24,5** | **59,6** | **39,9** | **47,7** |
| **BB** | **33,0** | **30,0** | **56,0** | **39,7** | **44,5** |
| **Anz. Orte** | | | | **3** | **2** |
| **GD 5 %** | **6,0** | **2,7** | **7,2** | | |

## Kornertrag relativ

| Faktor1: Sorte | Ort | | | mit Kirch-engel | ohne Kirch-engel |
|---|---|---|---|---|---|
| | Hayn | Kirchengel | Pommritz | **2023** | **2023** |
| Dexter(B) | 93 | 89 | 104 | **97** | **100** |
| Fresnel(B) | 92 | 99 | 97 | **96** | **95** |
| Casini(B) | 115 | 112 | 99 | **107** | **105** |
| Asteroid | 144 | | 104 | | **119** |
| Feroe | 97 | | 128 | | **117** |
| Lapony | | 94 | | | |
| **Mittelwert** | **108** | **82** | **106** | **101** | **107** |
| **BB** | **33,0** | **30,0** | **56,0** | **39,7** | **44,5** |
| **Anz. Orte** | | | | **3** | **2** |
| **GD 5 %** | **17** | **9** | **13** | | |

Stufengerechte Bezugsbasis
Ort=@: Sorte (Dexter, Fresnel, Casini)

Prüforte: Hayn (ST, V), Kirchengel (TH, Lö), Nossen, Pommritz (SN, beide Lö)
die länderübergreifende Auswertung erfolgte in Thüringen