

LSV Wintertriticale 2024 Sachsen Löß-Standorte

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Intensität	Sorte	Typ	Kornerträge			
			2022	2023	Versuchsjahr 2024	
			n = 4	n = 4	Pommritz	Salbitz
Stufe I	Lombardo (B)	k	103,3	98,7	88,4	49,7
	Presley (B)	k	99,1	98,1	82,9	86,8
	Rivolt (B)	k	106,3	98,8	90,3	81,1
	Trias	k		102,2	83,4	73,3
	Tributo	k		101,8	100,6	89,9
	Fantastico	k			87,7	72,4
	Mittel				88,9	75,5
	Mittel (B)		102,9	98,5	87,2	72,5
	GD 5 %				7,8	11,3
Stufe II	Lombardo (B)	k	113,6	109,7	104,1	94,7
	Presley (B)	k	110,2	104,7	95,2	105,0
	Rivolt (B)	k	118,5	109,5	98,4	115,4
	Trias	k		115,8	101,6	106,3
	Tributo	k		108,4	101,6	105,1
	Fantastico	k			103,3	95,6
	Mittel				100,7	103,7
	Mittel (B)		114,1	107,9	99,2	105,0
	GD 5 %				7,8	11,3

B = Sorten der Bezugsbasis

Typ: k = Sorte mit kurzem Stroh

LSV Wintertriticale 2024 Sachsen Löß-Standorte

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - relativ zur Bezugsbasis

Intensität	Sorte	Typ	Kornerträge			
			2022	2023	Versuchsjahr 2024	
			n = 4	n = 4	Pommritz	Salbitz
Stufe I	Lombardo (B)	k	100	100	101	68
	Presley (B)	k	96	100	95	120
	Rivolt (B)	k	103	100	104	112
	Trias	k		104	96	101
	Tributo	k		103	115	124
	Fantastico	k			101	100
	Mittel (B)		102,9	98,5	87,2	72,5
	GD 5 %				8,9	15,6
	Stufe II	Lombardo (B)	k	100	102	105
Presley (B)		k	97	97	96	100
Rivolt (B)		k	104	101	99	110
Trias		k		107	102	101
Tributo		k		100	102	100
Fantastico		k			104	91
Mittel (B)			114,1	107,9	99,2	105,0
GD 5 %					7,8	10,7

B = Sorten der Bezugsbasis

Typ: k = Sorte mit kurzem Stroh